






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4440/A/2






Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4440/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4440/A/2



Early European Books, Copyright © 2012 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
4440/A/2

off
all

4440 (2)


JA/2


A XXIX Mon

Marco antonio

petit
et amicus —

off





Vir sapiens Luceo R s
Bonus Esculapii re R s

46693

ANASCEVES
MORBORVM

*

TOMVS PRIMVS.



*Authore Hieronymo Montuo Mire-
belli Domino, art. & med. Doctore
Christianiſſ. Galliarum Regis Con-
ſiliario & Medico.*

LVGDVNI
APVD IOAN. TORNÆSIVM
TYPOGR. REGIVM.

M. D. LX.

Cum Priuilegio.

*Non intellecti nulla est Curatio Morbi:
Si quis conualeat, forte, non arte, valet.
Est intellecti facilis curatio morbi:
Depulſa cauſa tollitur omne malum.*

Christianissimo Galliarum
SCOTIÆQUE REGI

Francisco eius nominis secundo

Hieronymus Montanus

S. P. D.

*

SI iuxta veterem Stoicorum
sententiam homines homi-
num causa sint geniti (Rex
potentissime) quicunque de
communi hominum salute
magis in dies commerentur, hi proculdu-
bio omnium maximi simul & optimi sunt
habendi. Verum nulla arte, nullaque disci-
plina id plenius præstare possunt, quàm
medendi ratione. Huius nanque tanta uti-
litas est, tamq; necessarius usus, ut nulla
oratione consequi posse videatur. Haud
a 2 tamen

tamen ab officio nostro omnino fuerit alienum, hîc pauca de illius exortu, antiquitate & præstantia, de illius autoritate ac necessitate breuiter attingere, sed Rhetorum fucis omnibus procul abiectis. nam res per se, vereq; præclara sua nuditate contenta, nullis amplificationum eget præstigiis. Igitur Medicinæ origo siue Hebræos, siue Arabes sequamur, siue Græcos, Ægyptiósque Theologos, ab ipsa diuinitate manauit. Hæc etiam antiquitate cæteris omnibus antecellere, vel ex eo constat argumento, quòd magicarum artium quæ inde doctorum omnium consensu fluxerunt Author fuerit Zoroastres, qui bellum Troianum quinque millibus annorum fertur antecessisse. Huius autem tam iocunda fuit inuentio, & tam grata cunctis mortalibus vtilitas, vt illius non modò inuentores, sed illustratores quoq; Deorum nominibus decorare gratissima semper acceptorumq; beneficiorum memor antiquitas

quitas non dubitarit. Etenim Apim Aegyptiorum Regem, quem primum tanti boni inuentorem fuisse ferunt, ob præclarissimum istud inuentum tantis honoribus accumularunt, ut eum pro Deo & habuerint, & coluerint antiqui. Osirimq; quasi multoculum nuncuparint. Ex eo summam viri prudentiam ingeniiq; solertiam admirabilem significare volentes. Eundem fuisse Bacchum falso putauit Herodotus. fuisse tamen Bacchum clarissimum medicum, & regia dignitate simul, & Dei nomine insignitum testatur Xenophon. lib. de venatione. Mercurio veteres Hygieam coniungunt. forsan ob id quòd salubres plurimas herbas (quarum meminit Homerus) inuenit, uti sunt moly, linozostis, verbascum. Sed medicinæ inuentio ipsimet Apollini assignant plerique omnes. vnde apud Naesonem sic gloriatur:

*Inuentum medicina meū est. opifexq; per orbem
Dicor. & herbarum subiecta potentia nobis:*

a

3

In

In faturnalibus apud Macrobiū medicinæ inuentio Apollini tribuitur. quia temperatus solis calor morborum omnium fuga est. sed aliter Apollonius Thianeus & Iamblicus Apollinem medicinæ inuentorem existimatum fuisse arbitrati sunt. quoniam tota medicinæ scientia à vaticiniis quorum antistes est Apollo, exordium habuit. Etenim medicinæ & vaticinationis disciplinæ sunt teste Macrobio consociatæ. Cui astipulatur Ficinus lib. de vita sana. Medici enim munus est cōmoda incommodaq; in corpore futura prænoscere & præfagire. Apollo etiam ἀκέσιος & ἀλεξίκακος dictus est. quòd medeatur & mala arceat, vt Pausanias tradit. Aesculapius Apollinis filius archiatros, medicorumq; deus appellatus, non solū morbos persanauit, verū etiam mortuos ad vitam (vt veteres perhibent) reuocauit, Hippolytum, Glaucum, & Androgeon. Id verū esse testis etiā est Samonicus. cuius versus subnectā.

Tuq;

*Tuq̃ potens artis, reduces qui tradere vitas
Nosti, atq̃ in cælum manes reuocare sepultos
Qui colis Aegeas, qui Pergama, quiq̃ Epidauriũ
Huc ades.*

Apud Homerum Aesculapius ἀμύμων dicitur, id est, irreprehensibilis. Huic duo fuerunt liberi Podalirius atque Machaon, ex ducum numero qui ex Græcis ad euertendum Troiam profecti sunt. Qui insignes medici non mediocrem opem Græcorum exercitui attulerunt, maximã ob id adepti gloriam, vt testatur Homerus. de Podalirio sic canit Ouidius.

*Quẽ semel excepit, nunquam Podalirius agro
Promissam medicæ non tulit artis opem.*

Machaonẽ verò Homerus 4. Iliados æqualem Deo dicit. Pausanias quoque asserit Glaucum Messiniorum Regem Machaoni sacra in Gerenia primũ fecisse, Machaonisq̃ filios regnasse apud Pharealas, quos etiam venerabilis medicinæ sapientia diis assignauit. Hos longo interuallo secuti sunt

a

4

Pythag

Pythagoras, Democritus, Plato, Aristoteles. Empedocles vero Philosophus & Medicus celeberrimus maximam ex eo gloriā consecutus est, quòd mulierem defunctam viuum dimiserit, vt est testis Diog. Laertius. Asclepiades quoq; inter medicos famigerabilis, hominem exanimatū, elatum, comportatumq; ab rogo domi viuum reduxit. vti refertur apud Pliniū & Apuleiū lib. Floridorum. Hippocrates autem medicinæ sciētiam è tenebris in lucē reuocauit. à quo etiam grauis pestilentia depulsa est. cuius laudes sunt insignes apud Platonem, Socratem, Aristotelem, Galenū, Plinium, Macrobiū & alios nobiles Philosophos. de quo extat distichum Græcum, quod ad verbum sic sonat:

*Hippocrates lumen fuit hominum, & saluauit
populorum*

Gentes, & mortuorum fuit raritas in inferno.
de medicis quoque elegans extat Erasistrati apud Theodoretum epigramma,
quod

quod subiiciam:

Hymnidici vates, artis medicæq; periti

Mortales cunctos primi post terga relinquunt.

Sunt ubi Dij superi magnis in honoribus aucti.

Authoritatis item nomine commendationem huic arti non mediocrē affert Moses Israëlitarum Dux, qui non alia ratione cibos suis distinxisse videtur, vt sentit Tertulianus, quā medicinæ beneficio. Orpheus vatū vetustissimus de Aesculapio in hymnis sic cecinit:

Medice omnium Aesculapie domine Paan

Veni beate saluator vitæ finem bonū præbens.

Homerus vnicus ingeniorū fons, reliquiq; præsignes poëtæ atq; Philosophi omnes, medicinam suis in negotiis & studiis admiscuerunt. Illud etiam non parum ad medicinæ facit authoritatem quod reges, nō pauci duces, principes & imperatores in ea sic excelluerunt, vt nominis quoq; sui immortalitatem sibi apud posteros compararint. In eorum albo fuit Alexander ma-

a s gnus.

gnus, Adrianus Romanorum Imperator, Hermes Aegyptiorum monarcha, Euax Rex Arabum, Sabor medorum, Bithyniæ Auicennas, vt reliquos innumeros reges præteream. non omiserim tamen Mithridatem Ponti regem, qui non tam regni gloria, nō tam vnius & viginti linguarum cognitione (tot enim calluit linguas, quot prouinciis imperauit) quàm medicinę peritia fuit illustris. Et apud Aelianum Achilles Patroclum medicinā docet. Achillem Chiron Saturni & Philiræ filius teste Pindaro, sophos & præcellens medicus erudit. disciplinas nimirum heroës tantū & deorum filij exercebant, vt idē affirmat Aelianus. Sed id longe maiorem & medicinæ & medicis affert authoritatē, quod nimirū sacræ literæ honorem illis ferendum esse iubent. Honora medicum, inquit Sapiens. Quinimo Christus Optimus Maximus ore suo medicinā approbavit, dum ægrotantibus opus esse medico asserit. Nec veretur

retur se palam medicum profiteri, dum cæcos, mutos, claudos, leprosos, & id generis morbos omnes perfectè curat, dum mortuos suscitatur. Nec id solū facit, sed & Apostolis suis faciendum mādat. Quod autem Christus facit nutu, quod Dei verbo Apostoli, id ipsum medicus arte sua saluberrima pro virili conatur imitari. O artem sacram & vere diuinam? à qua medici nomen non exhorruerit verus Dei filius. O præclaram scientiam? in qua qui excelsunt aut deos esse aut deorum filios est necesse.

Cæterum quod à nobis paulo ante dictum fuit Aesculapium, Empedoclem, & Asclepiadem multos ab inferis reuocasse, id nemini fabulosum videri debet, præsertim quum nihil intersit utrū anima in corpus derelictū rursus introducatur. An eadem prorsus in corpore sepulta, & mox exitura artis huius adminiculo retineatur, serueturq; . An non paria sunt iam mortuū suscit

fufcitare, & mox moriturum à morte vindicare. Id autem non tantum facit peritus medicus, fed etiã quid multo magis. Quando videlicet arte fua efficit vt generentur quàm plurimi, vt fani cõferuētur in vtero, vt rectè nafcantur, qui nunquam effent nafcitur. Quot enim hominum millia etiam hodie fani viuūt, qui ne equidẽ nati effent, abfque probi medici opera. dum mille nafcendi periculis occurrit, dum obtefticandi rationem docet, dum conceptionis tollit impedimenta. Quod quàm fit verum Rex auguftiffime, & nos cū aliàs frequenter, tum anno fupiore, & maximè in tuo Delphinatium ducatu (abfit verbo inuidia) tam foeliciter quàm fæpe fumus experti. Vnde vitam nec immerito huic arti acceptam ferre debent, & viuentiũ non pauci, & eorum qui nondum vitam acceperunt quàm plurimi. Quare & hi vita funt indigniffimi, qui medicinam poft Deum vt alterã vitę parentem, feruatricemq; non fufp

suspiciunt, non venerantur, non colunt.

Neque verò solius corporis, sed animi quoq; curā suscipit medicina. qua quidem in re non solū non cedit theologo Medicus peritus, sed & ipsum longissimo intervallo superat. Quid cum furioso faciet theologus? quid cum phrenitico aut apoplectico? quid cum sexcentis aliis morborum generibus? nisi prius medici releventur opera. In summa quicquid est in homine bonum & laudabile, ^{*}semitas, ^{*}doctrina, ^{*}virtus, cæteræq; animi & corporis doctes, id omne medicorum arti acceptū ferre debemus. Si autem mens bene composita, & imperans ratio cum corporis sanitate sit in priuatis hominibus maximum bonum. quanto quæso maius esse debet in Regibus, quibus omnia subiiciuntur, quorum legibus reguntur omnia? Ea sanè præcipua (mea quidem sententia) causa fuit, cur veteri consuetudine apud omnes nationes receptum sit, ne magni nominis princeps absq;

absque peritis & fidelibus essent medicis. Vnde qui ex ipsis fuerunt magnificentiores, suos medicos summis affecerunt honoribus, summisq; opibus ditarunt. Etenim Cæsar Augustus suum Antonium Musam cuius beneficio à graui morbo fuit liberatus, præter ingentem auri copiam annulo quoq; aureo, id est, equestri dignitate donauit. Nec solum Musam, sed & alios peritos, qui medicinam Romæ profiterentur, eadē dignitate cohonestauit, vt memoria prodidit Niceus. Erasistratus Aristotelis è filia nepos centum talentis, seu sexaginta aureorum milibus pro Antiocho rege fanitati restituto à Ptolemæo filio donatus est. Plinius etiam cōmemorat multos medicos Romæ percelebres annua mercede à principibus Romanis habuisse ducenta & quinquaginta sestertia. Quæ quidem summa sex millibus ducentis quinquaginta aureis nummis respondet. Thadeus Florentinus clarissimus medicus ab Honorio
papa.

papa quem à letali morbo liberauerat, decem millibus aureis donatus est, præter diurnam mercedem, quæ ex pacto centum erat coronatorum, vt asserit cum Mantuano Volaterranus. De nostris Cauterius galus Lodouici Frâcorum Regis eius nominis vndecimi medicus primarius mēstrua mercede coronatorum aureorum millia decem accipiebat, teste Argentonio. Nec id mirū videri debet, quum docto fidoq; medico præmium meritis dignū persolui nullum possit. Nam emis à medico rem inæstimabilem, vitam & valetudinem bonam, cui non rei pretium sed operæ soluitur, vt scribit Seneca. Eiusdem sententiæ est Soranus antiquissimus medicus. Merces, inquit, medico si detur accipiatur, sed non exigatur. quia quantū quisq; dederit, nulla poterit mercede exæquare beneficia medicinæ. Certè Hippocrates gratis medicinam exercuit, similiter & Menecrates Philippi Macedonū Regis Medicus. Id ipsum etiam

etiam factitasse Aufonium patescit ex sequenti disticho:

Obruli opem cunctis poscentibus artis inemptæ:

Officiūq; meum cum pietate fuit.

Itaq; prudens medicus laboris sui fructum non in lucro, non in honoribus, non in fama (quam multi licet merito acquirunt) sed in cōscientia ponit. Homerus 2. Iliados medici dignitatem exprimens ait,

ἰατρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν ἀντάξιός ἄλλων, hoc est,

Medicus enim vir multis æquabilis alijs.

Et 4. Odysseæ,

ἰατρὸς δὲ ἕκαστος ἐπιστάμενος περὶ πάντων ἀνθρώπων, id est,

Medicus autem quilibet sciens supra omnes homines.

Nec omiserim quòd medicinæ gloriam minus auget incrementis. Nam si quæ difficilia, pulchra vt est in Prouerbio Medicina artium disciplinarumq; omnium pulcherrima sit oportet, si quidem Æsculapij
simula

simulacro baculum nodosum apponebāt
veteres, artis difficultatē designare volen-
tes, vt tradit Festus Pompeius. hinc est illud
Satyrici poëtæ:

*Morborum omne genus, quorum si nomina
queris,*

*Promptius expediam, quot amauerit Hippia
mæchos,*

Quot Themison agros autumnno occiderit vno.

Quod autem medica facultas alias omnes
disciplinas ipsa difficultate, rerumq; varia-
rum inquisitione longissimis citra vllam
cōtrouersiam vincat spatiis, probare haud
difficile. Quandoquidē præter naturalem
ingenij bonitatem, præter diligentiam ac
probitatem, præter insignem prudentiam
quibus præditus esse debet Medicus, ipsam
omnino ex elementis compositionem &
admirabilem hominis fabricam, reliquo-
rumq; animalium naturā & proprietates,
alimentorū facultates, stirpium, terrarum,
metallorum, gemmarum, & medicamen-
torum

b

torum

torum omnium cū simpliciū tum com-
 positorum vires memoria teneat oportet,
 vt mittam tot pulsum differentias mor-
 borum & symptomatum discrimina, re-
 giones salubres, insalubresq; syderum or-
 tus & occasus ex quibus ambientis nos
 aëris fit mutatio, perturbatioq; & conse-
 quēter viuentiū alteratio, videlicet in æqui-
 noctio verno, in solsticio æstiuo, in æqui-
 noctio autumnali, in solsticio hyberno, in
 quibus contingunt ortus & occasus Equi,
 Pleiadum, Orionis, hyadum, lyræ, capræ,
 aquilæ, arcturi delphinis, procyonis, canis,
 vindemiatoris, mali, naui, spicæ, coronæ,
 hædi, & stellæ in Leone illustris. Est ergo
 medico etiam cognitio astrorum opus, vt
 docet Hipp. i. epi. imo & planetarum mo-
 tus. Et vt semel finian, orbem illum doctri-
 nam (quam ἐγκυκλοπαιδίαν vocant) absol-
 uerit oportet is, qui boni medici nomen
 cupit demereri. Si quidem non vna nec al-
 tera, sed omnium penè consortio doctri-
 narum

narum ac innumerabilium rerum noticia
medicinæ scientia consumatur. Ergo ope-
rosissima. Itaq; nec illa cōtinetur inter cæ-
teras liberales disciplinas, vt Isidoro placet,
propterea quia illæ singulares continent
causas, ista vero omnium, hæc ars est in-
quit Porphyrius cui sese omnis pariter
sapientia debet.

Equidem à primis annis huic præstan-
tissimæ facultati me deuoui, ætatē meam
in ea legendo scribendoq; cōsumpsi, ean-
dem annos multos nec infeliciter exercui,
lucubrationum mearum aliquot edidi an-
nis superioribus. Nunc cæteras è manibus
nostris extorquent amici rei medicæ stu-
diosi. Et imprimis Anasceuen morbo-
rum, opus quidem quatuor tomis distin-
ctum. In quo non solum morborum om-
nium profligandorum rationem trado, &
methodum, sed etiam quibus id fiat me-
dicamentis, & illis quidem vnicuiq; mor-
bo infirmando maximè idoneis, longo re-
rum

b

2

rum

rum vſu comparatis, & qua potui facilitate expono. Id autem quàm rectè, viderint alij. Ipſe meam nec probare, nec magnificare ſoleo: ſperamus tamen nos his noſtris vigiliis apud viros probos non omnino ingratham inituros gratiam. Et ſi quis velit meliora dare, ſauebo etiam vtroque pollice, tantum abeſt vt reprobem. Hoc autem meum opusculum ſereniſſimæ M. T. dedico ac conſecro. Grauiſſimè enim reprehendendus eſſem, ſi alio quàm tuo auſpicio paterer illud in publicum exire, præfertim quum auo, parentiſq; tuo Regum maximis & inuiſtis triginta annis inſeruiui. Meſq; cohonestare ſic dignati ſunt, vt ſtatim ab ortu tuo fœlici valetudinis tuæ curam mihi ſoli commiſerint, ſicq; factus ſum conſiliarius tuus, primariuſq; medicus, etiam ſi omnium ſim minimus. Quamobrem iſtud noſtræ erga M. T. obſeruatiæ velut *μνημόσυνον* quoddam hilari & exporrecta fronte accipias
roga

rogamus, obsecramusq; M. T. nobis in-
columnem ac fœliciter regnantem quàm
diutissimè conseruet Deus Opti-
mus Maximus, ex Castro no-
stro Mirebelli Idibus
Octobris.





ANASCEVES MORBORVM

LIBER I.



De tactus symptomatis.

CAP. I.



TACTVS est potentia animæ sensibilis apprehensiva, tangibilis qualitatis neruo extenso per omnes sensibiles partes instar retis, mediante carne. Vnde obiectum est sensibilis qualitas, medium caro, sensorium neruus. Plures autem sensus tactus sunt. Nam omnis sensus est vnus contrarietatis, tactus verò plurium æque principalium, & quarum vna ad aliam non reducitur. Eoq; plures rerum differentias demonstrat, quàm visus & auditus, vt sentiunt cum Aristotele, Themistius & Auerrhois, his accedit quòd tactus omnium sensuum instrumentis communis est.

Homo certissimū habet tactum, & in hoc vno.

To. I. Lib. I. b 4 omn

omnia euincit animalia. Illa quoque superat in
omniū sensuum acuitate & iudicio, propter orga-
ni contemperamentum quo præcellit, non item
in sentiendi longinquitate, iuxta illud:

*Nos aper auditu, Lynx visu, Simia gustu,
Vultur adoratu, præcellit Aranea tactu.*

Verum acumen sentiendi bifariā dicitur, aut quod
procul, aut quod differentias eorum quæ sentiun-
tur, maximè sentiat: vtrunque simul nullis contin-
git, ut scribit Aristot. A tactu mentis aptitudo aut
ineptitudo depræhenditur. Duros enim carne
mentis hebetes, & ineptos esse dicimus. Hinc fit
vt homo, qui tactu superat omnia bruta, animalium
prudentissimus sit. Ad id quoque tactus & gustus
(qui & ipse quidam tactus est) constitui videntur,
non vt tantum bene animantibus sit, vt reliqui
sensus, sed vt sint.

Obiectum est qualitas tangibilis, commune
quoddā ad primas qualitates, ad quas secundæ re-
ducuntur. Tactus cadidi & frigidi solus iudex est,
humidi autem & sicci vnā cum tactu ratio. Sensi-
bile etiam duplex, proprium & commune. O-
mnisq; sensibilis super excellētia sensum corrūpit.

Medium caro, nam sensibile omne, medioquo-
dam sentitur, carni namque supra positum tangi-
bile sentitur. Item sensibile sensui supra positum
nunquam sentitur, at carni supra positum tangibi-
le sen

le sentitur. Istis refragari videtur Auicen. sentiens inquit, id quod sentitur non potest sentire, nisi obuiando ei sensu tactus, qua de re doctores glossomatarij disputant.

Sensorium tangēdi crassum est, nempe neruus, non tamen omnis, si neruorum sint tria genera, videlicet è crebro, dorsi que medulla voluntarij. Ex musculis tendones, ex ossibus ligamētales, qui insensibiles sunt. Sed Gale. tactus organum cutim facere videtur, nā 1. de motu musc. & 1. de tem. ait. Cutis manus omnium sensibilibum veluti norma futura erat prudentissimo animantium tactus instrumentum ab ipsa natura præparata. Est autem cutis duplex, externa sensu carens, cuius extima superficies ἐπιδερμὶς dicitur, & interna mēbrano-
sa, ac tenuis, quæ singulis internarū est circumdata, quam autumant temperatissimam. Porro tactus functionis noxa triplex est, vt pote tactus perditus, debilis, deprauatus. In toto, vel in partibus per se, vel per consensum accidens. Rursus dolor & pruritus ad tactum deprauatum referuntur, proinde inepta videri potest quæstio An dolor sit morbus.

De dolore.

CAP. II.

Sensus mediocritas quædam est, ἄλγος autem excessus. Et secundum Gal. dolor tristis sensus est, & voluptas blandus, for-

b

s

tass

taisis est affectus qui sequitur tristem sensum, vt autumat Gentilis, illud tamen quod in dolore sentitur, haecenus incognitum fuisse astruit Bentius. At Scaliger retur quod dolor non sentitur, neque voluptas, sed species faciens dolorem. Trufiano Angestoq; dolor dispositio naturalis est. Nempe vt noxia vitaremus, & sensus dati sunt, & sensibus adiunctus motus est. Accedit quod dolor operationibus coniungitur, quæ à natura fiunt. Quod patet in partu, & in puerorū denticione. Galenus dolorem refert ad tactus symptom. Fierra verò ad accidens qualitatis mutatæ. Insuper disputant num dolor sit passio tactus, sensus ve communis? an imaginatiuæ imperfectæ sensui exteriori coniunctæ, qua de re cōsule Concil. Forliuium, Bentium, Sermonetam.

Certè dolor in appetitu est, quoniam principium motus est, dolor igitur nō est sensus, sed contractio quædam animæ, vt voluptas, effusio, vt vult Alex. Aphro. 4. nat. quæst. 6. Itaque dolor est affectus siue passio in appetitu ex sensu orta, nā quum sentimus continuò sequitur in appetitu affectus, quod innuens Aristot. 7. ethic. Animal, inquit, in sentiendo laborare, sentire enim pati est, vt ait Auerr. 2. de anima. Et decimo ethico. colligitur quod actus sentiendi & affectus non idē est. Dolor igitur est passio in appetitu. sequens cognitionem
&

& iudicium sensus, scilicet partis læsæ, & imaginatiuæ illius iunctæ, vel sensus communis, à quo secundum Aristotel. sensatio percipitur & læsio, si patiens continui solutionem alicui rei intentus animum læsioni non applicuerit, sensus dolorem nō sentiet. Item si intellectus læsionem apprehenderit, non doleremus.

Diffinitur etiam dolor passio animalis à distantia partium cohærentium facta, cum violentia. 6. topic. ergo perceptio læsionis est proxima doloris causa, sed prima doloris causa, est qualitas lædens alterando & soluendo continuum. Secunda est perceptio sensus, nam si intellectus læsionem apprehenderet, vt dictum est, non doleremus: læsionis igitur cognitio siue fiat à sensu partis læsæ, siue à sensu communi, est proxima doloris causa.

Nec est læsionis causa, vt scitè retur Portius, dyscrasia inæqualis, quia omnis alteratio temporis successione fit, cum sit motus. 3. physi. Igitur dyscrasia quum sensim generetur, & non tota simul, non poterit creare dolorem, qui confertim fiat. Itaq; Gal. pluribus in locis testatur, nihil posse dolore inferre, nisi idē soluere continuum valeat. At solutio cōtinui vt in tactu à qualitate tangibili, ita in visu, & cæteris sensibus à suis obiectis emanat, quod idē innuit, id est, de causis symp. quod Auerrhois intellexisse non videtur. Diuisio igitur continui

tinui læsio est, quam diuidens facit, non autem est læsionis causa. At perceptio læsionis, quæ sicut ipsæ sensationes, à sensu communi percipitur, 3. de anima, proxima doloris causa existit.

Dolor igitur est passio appetitus. Causa immediata perceptio læsionis, quæ est solutio continui, huius causa externa vel interna, qualitas tangibilis diuidens, non tamen dyscrasia. Nam sensibilia communia re ipsa afficiunt sensum, ex sententia Simplicij & Alexandri, sentire non est recipere ut vterque existimat, imo actio dicenda est. Itaque Gal. 7. de plac. sensum non esse alterationem, sed alterationis dignotionem autumat.

An ex mentis dolore, in corpore excitetur dolor? Animi perturbationes corpus alterant 3. ar. p. Ex cogitatione cor alteratur, ut ait Aristote. lib. de motu animalium. Igitur & totum corpus, simul enim cum corde affecto, omnes afficiuntur partes 5. de loc. aff. Quod etiam in Erotis patescit. In his quoque qui dolorem imminetem expectant, plus mali adfert tormenti formido, quam ipsum tormentum, ut fusè explicat Xenophon 3. Cyropædiæ. Vult etiam Alexander 1. natur. quæstionum quod dolor & voluptas simul eadem parte, eodemque tempore sentiatur. Nempe in scabie, siti, esurie, & coitu, huc pertinet dulcis dolor Archigenis, & Catulli distichon, quod subnectam.

Odi

*Odi & amo, quare id faciam fortasse requiris:
Nescio, sed fieri sentio, & excrucior.*

Ad summam, vt excitetur dolor, quatuor sunt necessaria, vt corpus sit passibile, vt sentiat, vt subito & violenter mutetur, vt alteratio præter naturã sit, ac sensui inimica. Insuper in dolore tria sunt, qualitas tangibilis, quæ alterat & diuidit continuum, alteratio ipsa vel diuisio, quæ est læsio & perceptio læsionis, quæ dicitur sensus & sensatio. Ex his tribus sequitur passio in appetitu, quæ dicitur dolor.

Doloris species si ducantur à potentia, geminæ sunt. nempe dolor ex proprio sensili, & cum tactu cõmunis. A sedis affectæ proprietate sunt variæ, dolor punctorius, pulsatorius, grauis, tensiuus. Ab accidente, dolor profundus, sublimis, latus, angustus, æqualis, inæqualis, fixus, turgidus, stupidus, vt in hæmodia, vehemens, mitis, continuus, intermittens. A causa, vlcerofus tensiuus, inflammatiuus iuxta lassitudinis species. Est etiam vbi ipsa dispositio dolorem faciens, dolor dicitur, vt 2. aphorif. Qui dolorem non sentiunt, mente ægrotant.

Dignostica. Dolor quencũque obsederit locum aut continuitatis solutionem, aut subitam alterationẽ ostendit. 2. art. p. fomẽta doloris causam explanant. 6. apho. com. 3. 1. & 2. r. a. Ex doloris proprietate causa deprehẽditur. 3. de loc. aff. Nam do-
lor

lor cum grauitate, plenitudinem testatur. Cum
 erosione, vel humorum vel vaporū acrimoniam:
 Cum pulsu, inflammationem: Cum tensione sine
 pulsu & grauitate, copiam inter membranas con-
 tineri significat. Vlcerosus tenuium acriumq; hu-
 morum vitium arguit. Tensiuus multitudinem,
 inflammatiuus vtrunque. 2. apho. com. 5. stupidus
 fit à frigida diathesi. Vetussti dolores frigidi, noui ve-
 rò calidi, plurimiq; horum à sanguine. 6. epi. Pun-
 ctorius affectam membranam indicat. Infixus in-
 testina affecta. Pulsatorius arteriam læsam, hæmo-
 dia dentes. Membranarum quæ ossibus adherent,
 dolores profundi sunt, & ossium veluti dolentium
 inducunt imaginem 2. de loc. aff. In omni dolore
 magnitudinem perdiscere oportet, nam confert
 ad loci patientis dignotionē, ad præsagationem,
 & ad curationis inuentionem. 6. apho. com. 5. Do-
 lor qui pulsum variat, aut per se magnus est, aut in
 partibus principalibus consistit. lib. introd. pul.

Præfagio. Dolor vehemens fit in ore ventriculi,
 in renibus & dorso, in colo, in oculis & dentibus,
 Dolor animi deliquium & mortem inferre potest.
 2. de ca. fy. febrem. lib. de nat. hum. Inflammatio-
 nem & sanguinis fluxum. 5. ther. fluxionem irritat
 3. ar. p. vnde resurgentibus à morbo si quid labo-
 rauerit, hic fiunt abscessus. 4. apho. 22. Dolor vires
 dissoluit. 3. r. a. com. 35. Doloribus commune est
 proh

prohibere membra à suis operationibus 2. prog.
com. 71. Nullum symptoma ita ægrum molestat,
sicut dolor vehemens 4. *ἢ τόπ.* Dolor inter-
dum adeo vehementer discruciat, vt laborantes
doloris grauitate victi, seipsos interimere co-
gantur lib. de diff. sympto. Contra dolorem forti-
ter reniti periculosum. Satiùs est quod dolorẽ le-
niret quicquam capere, quàm in asperis affectum
destruentibus auxiliis perseuerare. 12. ther. Om-
nia non possunt simul dolere. 2. epi. Dolor vehe-
mentior alterum obscurat. 2. aphor. 46. A calore
& frigore dolor vehemens: à siccitate mediocris,
ab humiditate prope nullus vel stupidus excitari
solet. Recursus doloris à loco minus nobili ad ma-
gis nobilem malum. 6. epi. Dolor si fuerit in aliqua
parte ante morbum, hic morbus firmatur. 4. aph.
33. figuræ omnes præter mediam simpliciter, par-
tim minus, partim verò magis cum dolore. 2. de
motu muscul. Doloris in febribus prænotiones
explicantur. 3. progn. Dolor cum syncopi lethalis,
teste Razio.

Metho. m. Illud quod sedat dolores, aut dyscra-
siam mutat, aut materiam resoluit, aut stupefacit.
4. fen primi. Dolor dolorem curat. 6. epi. quod di-
ctum non probat Gal. nam quod curat, inquit, est
remediũ, quod cū dolore affectuũ doloris autoreẽ
delet. Nulli nanq; symptomati primario, sed ipsum
curati

curanti affectum curatio semper debetur, inibi, com. 2. & 12. ther. Vere anodynus resoluendi facultatem Galenus tribuere videtur 4. simplic. his verbis, quæ temperata sunt, grata sunt, funditur enim quod in nobis concretum fuerat, quo maximè affectu voluptas animalibus constat. at si moram etiam trahant, sensui quoque & ipsa molesta euadunt: ad tantam enim fusionis immoderationem sic recidunt, ut substantiam nostram digerant, & animi afferunt deliquium, ut mors tandem sequatur.

Remedia, Anodyna & paregorica hoc est dolorem sedantia, mitigantiaq; quædam re vera sunt huiusmodi, alia verò nomine duntaxat. Priora sunt tenui substantia primo gradu calida, vel ita temperata ut familiaritate elementorum naturæ partium consentiant. Huc refer quæ qualitate contraria causam oppugnāt, & quæ sublata copia vel cacochymia dolorem tollunt, ut sunt phlebotomia, sicca, cathartica, clysmi & similia, sic in vehementissimis doloribus laudatur sanguinis missio usque ad animi deliquium 1. apho. com. 2 1. Posteriora sunt narcotica & hypnotica, id est, stupefactiua & somnifera, qualia sunt refrigerantia, non tamen sunt verè somnifera, quia pro somno veternum stuporemque inducunt. Minus tuta sunt fortiora quàm leniora; simplicia quàm composita; recentia quàm

quàm annua vel semestria; sumpta quàm admota, nisi in oculi dolore, vbi stupefactiuum minus officit propinatum quàm illitum, quod adnotauit Auicen. 4. pri. In vniuersum cauendus est quoad fieri potest eorum vsus, potissimum vbi ex frigida causa dolor est excitatus. Miscentur tamen salubriter medicamentis purgantibus veluti in dolore ventriculi & colico, ex Rasis consilio & Arculani. Anodynum non verū vocat Ruellius quod eximio frigore sensum sopit, vel quod affectū doloris authorem sanat. Item quod doloris acrimoniam demulcēs hebetat, vt lac, oleum & alia dulcia. Preter hæc dolor sedatur leui deambulatione, & diuturna, propterea quod emollit, suauiq; melodia, atque his quæ lætitiā afferunt. 4. pri. Dolorem etiam soluunt fomenta humida vel arida tepida admota. 2. r. a. Balneum. 6. aph. 3 r. Embrocha noxium humorē à partibus dissoluere, & dyscrasiam permutare potest, quare dolorem mitigat. 4. pri. Calefactio, inquit Rasis, mitigat dolorem quia rarefaciens membrum dissoluit humorem, inquit, insuper si calefactio dolorem auget, materiam esse crassam indicat.

*Observatio
practica.*

Ad dolores à caliditate factos cōmendant spinachiam, rosas, violas, nympheam, lupulos, plantaginem, solatrum, fantalos, seriolam, lactucam, portulacam, semen vel folia papaueris albi, ordeum,

To. i. Lib. i. c mil

miliū, panicum, muccago psylli, oui aquatum, oleum rosaceum, myrtinum, de nenufare, de lactuca, papauere, de mandragora, & altercho. lithargyrum, magnetē. De aluum soluentibus cassia nigra, manna, rhabarbarum, conserua prunorum, sy. rosatus catharticus.

Ad dolores frigidos conueniunt pilulę dendem Auic. pil. fœtidæ maiores, & minores. M. Theodoricum magnum Ali. Oleum de lilio, irinum, sinapismum. M. oleum è nuce myrepfia, è cinamomo, è caryophyllis, è calamo aromatico, ex hyperico, styracinum, galbanarium, sulfurinum, terebenthinum, petreleon & similia, huc pertinent verè anodyna. sunt autem anthemis, melilotum, anethum, malua, althea, calendula, semen lini, fœnugræci, maluæ & altheæ semina, cytoniorum & linnoxyli. De oleis chamemelinum, anethinū, è meliloto, ex amygdalis, è croco, butyrū, lana succida, œsypus, adeps suillus, vitellinus, vulpinus, asininus, gallinaceus, anserinus, & anatis. Ingressus in balneum olei tepidi, sanat omnes totius corporis dolores. Zoar. pinguedo anatis calida vel frigida illita confert doloribus. Idem. Animalia omnia è putri materia genita vt blate, intestina terræ, onisci, dolores vbique natos finiunt, quia ex calidissima, humidissimaq; materia orta sunt.

Dolor flatulentus curatur per embrochas ex aqua

aqua calida, per euaporationes ex milio, furfure, orobo & sale, sed leuior est euaporatio in vesica posita. 2. r. a. Sicya cum flamma copiosa subinde admota, illos qui spiritu flatuoso cruciantur, illico à dolore liberat, in quauis particula excitato. 12. ther.

Ad omnem dolorem ꝛ. anthemidis, meliloti, seminis anethi añ. ꝛ. j. friata misceantur cum mucaginibus seminis lini, fænugr. & sem. althææ, & cum oleo anthemidis, anethi & momento aceti fiat epithema. Aliud. ꝛ. cribraturæ radicum althææ elixatarum lib. i. pulueris florum chamomilæ, anethi, seminis lini & fænugr. añ. ꝛ. j. farinæ ordeï ꝛ. iiij. cōcorporatis adiunge rosaceum, oleum anethi & anthemidis. Aliud. ꝛ. olei cherini ꝛ. ij. oleū amygdalarum dulc. & sisamini añ. ꝛ. j. ꝑ. butyri recentis ꝛ. j. adipis anatis ꝛ. ꝑ. florum anethi & anthemidis friatorum añ. ꝛ. ꝑ. ceræ albæ 3. j. ꝑ. lutea ouorum tria. fiat linimentum. Emplastrum ex furfure cum sapa & momento salis leui ebullitione confectum, non habet compar in sedādo dolores. Aliud. ꝛ. olei omphacini lib. ꝑ. lutea ouorum sex, rosacei 3. iiij. coquantur super cineres pauci caloris aliquandiu, dein addantur farine ordeï amyli añ. ꝛ. iiij. croci 3. ij. fiat emplastrum. Erit magis anodynum si addatur sapæ ꝛ. iiij. butyri recentis ꝛ. j. ꝑ. bdellij mollis & subalbidi 3. ij. recoque lento igne ad sapæ

consumptionem. Cataplasma ex mica panis soluta in lacte, vel incoacta, cū 3. s. croci & tribus ouorum vitellis & sesquiuncia rosacei, anodynum est.

Succus bethonica potus ad omnes corporis dolores remedio est. Cibo amygdalæ amaræ, doloris sensus mulcetur. Rhaponticum omne genus dolores emendat. Polium tractare facit ad dignitatem & gloriam, & dolores corporis finit. Lepidiū quod officinæ sataragi vocant, ad alligatum brachio qua dolet, compescit dolorem, testibus Dio. & Ruellio.

Observatio.

Dolores ne sentiant, qui vrendi secandiq; sunt. Eruce semen, verbera subituris, potum ex vino duriciem quandam contra sensum inducit. Idem præstat ocymum sylvestre potum ex vino, Plin. Ad idem valet vinum in quo elixa sit momordica potum. Sarac. Ad idem, vinum in quo elixatæ sint radices mandragoræ masculi, ad tertias, colatum & mensura cyathi potum confert, Dio. Vt corpus nō sentiat cruciatum illinatur marmore tiberino ex aceto. Plinius. Trito & illito lapide memphite, quæ vrenda aut secanda sunt, sine periculo obstupescere aiunt, ita vt non sentiant cruciatum. Dio. Idem præstare affirmat Chiranius rex adipem Crocodili illitum, & Rasis ad hoc laudat cinerem corij laceratæ cum amurca seu fæce olei mixtū & inunctum. Oleum in quo viua torpedo coxerit, narcoticum est. Itaque quæ secanda sunt obstupescunt,
torped

torpedine nigra viua imposita eo loco. Scribonius. Acus creagomagnete illita, carnem totam absque dolore penetrat, & sæpe illita dolorem penetrando non excitat, aut leuem. Card.

Cur caro & cutis post attritionem absque dolore perforatur? An est quia pars attrita fit rarior, ideo acus facilius præterlabitur, & caliditas dolorem non permittit sentire, & dolor ab attritione, dolorem punitionis leuat, maior enim dolor minorem obscurat, & nerui attritione, spiritus animalis excluditur.

Oleum ex vitriolo est adeò vrens, vt pro igne potentiāli vtamur, & cum pauco dolore incidit membra, si ex olea cultro inuncto tangatur. Brauaola. Modum à vitreolo extrahendi oleum docet Massa. Causticum quod citra dolorem aperit vomitam. ℞. aquæ primæ saponis lib. i. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, mox adde calcis viuæ ℥. s. opij 3. ij. coque iterum, postea adiunge auripigmenti 3. ij. fiat massa. Aliud. ℞. aquæ primæ ex qua fit sapo, lib. j. s. vitrioli Romani, nitri, salis ammoniaci añ. ℥. s. dissoluta coquantur in testa ad fordium crassitudinem. tunc adde opij 3. vj. recoque tandiu vt lapidescant, effracta olla lapillos serua in vitreo vase bene obturato, quia ex aëre tacti, lapilli, in aquam soluuntur, quatuor aut quinque horarum spatio, operantur. Ad vrendos aut secandos

observatio.

c 3

benefa

benefacit spongia somnifera Nicolai olfacta. Lini-
Narcoticum facillimū & optim.
- i. apū grāde?
 mentum Arnaldi ad idem quod recipit, opij, cor-
 ticum mandragoræ, radicū alterci leuistici añ. 3. j.
 puluerata aquæ mixta agitentur: dein sine vt fex
 resideat, hoc liquore linteo imbuto alline frontem
 ab vna aure vsque ad alteram, & nares, ita profun-
 dè dormiet, vt non sentiat cruciatum. postea exci-
 tabitur odore acerrimi aceti.

Escharoticum absque dolore constat ex molli
 sapone, calce viua, & opio. An etiam ex sarcopha-
 go? Præter hæc castrandi ratio citra dolorem fieri
 potest, ad hunc modum. Vt in balneo venas ho-
 mini supino quæ circa guttur sunt comprehēdas,
 & statim sensus & motus protinus stupet, vt in
 apoplexia.

De cephalea.

CAP. III.

Capitis dolor extra caluam pericranei
 affectus est, qui verò intra caluariam fit,
 menyngum passio existit, si cerebrum
 insensile sit, vt retur Aristoteles, 2. de
 part. animalium, & Galen. lib. de facult. corpus no-
 strum dispensantibus. Et primo de ca. sy. cerebrum
 ait non vt sit sentiendi instrumentum, sed vt sen-
 suum instrumentis vim sentiendi præstet, à natura
 institutum est. Quærit Macrobius 7. saturnal. cur
 cerebrum cū sensum non habeat, sensus guber-
 net.

net. Respondeo, quòd omnium animalium functionum efficiens est cerebrum suis menyngibus conuestitum. Nam prior cerebri pars sensus, posterior verò motus principium est. Membranæ autem tactus sunt origo. Itaque cerebrum & spinalis medulla quibusdam authoribus sensu fruuntur, vt ait Gal. lib. de plenit. Est autem cephalea dolor inueteratus, & cephalalgia recens, apud Oribasium & Genuensem, vel prior morbus est. posterior verò symptoma, vt placet Tralliano. Galenus quoq; κεφαλαία, inquit, cerebri morbus est. 3. de loc. aff. Attamen omnis dolor actionis offensa est. 1. de ta. sy. igitur symptoma & non morbus, qua de re fusè differit Concil. differentia 73. Insuper cerebrum insensibile est. Ergo cephalea cerebri morbus non est, sed est capitis dolor diuturnus difficulterque solubilis, per quem affectæ partes multo redduntur quam in κεφαλαλγία debiliores. Heterocrania seu hemicrania dicitur, quum media capitis pars dolore infestatur. Monopathia dolor est in vnica capitis parte, vt definit Passionarius. Vel, vt alij volunt, dolor est quo quarta capitis pars laborat. Inde monopathicus dolor, apud N. Alex. κερυβαεία est capitis grauitas ex multa repletione, maximè austro flante accidens. 3. aph. com. 19. Grauedines in solo capite oriuntur. Capitis tamen grauedo illa dicitur quæ fit non à causâ externa,

c 4 sed

sed ob naturalem capitis infirmitatem, & grauedi-
nosi ab ea dicuntur. 6. epi. com. 3. Helucus, id est,
languidus & semisomnis hesternóq; vino madens
vsurpatur etiam pro cariuaria, qua procliues in
somnia reddimur, vt ait B. Renanus in suis in
Tertulianū annotationibus. *κρόταφος* est dolor ve-
hemens temporum. Aureliano 1. chronion. Cere-
brum sphacelatum. 7. apho. 51. De galea memi-
nit etiam Alex. 6. Denique omnis capitis dolor ef-
ficitur vel per idiopathiam, id est, proprium affe-
ctum, vel per consensum.

Causa externa æstus à sole. Inde cephalalgia sol-
stitialis, frigus, meraca potio, temulentia, ictus, ca-
sus, suffitus aromatum, carbonum fumus, & sulfu-
ris odor. Auster caput grauatur, & cutis meatus clau-
dit. Somnus statim à cibo in plethoricis dispositio-
nibus caput & cerebrum aggrauat. Ad internam
causam pertinent vitia reliquarum partium, vt po-
te, stomachi, vteri, & viscerum, sensus exuperan-
tia, suturarum capitis apertio, dyscrasia inæqualis
simplex, vel composita cum vel sine materia, con-
tinui solutio.

Dignostica. Quibus intra caluam dispositio est,
his ad oculorum vsque radices dolor extenditur.
difficillimum tamen est locum affectum dignosce-
re vnus ne sit, an plures vno. Tunc affectus pro-
prius putandus est quum permanere in parte qua-
piam

piam conspicitur. Quum pars aliqua simul cum alia sic afficitur, vt irritata vna, altera vehementius molestatetur, & remissa irritatione quiescat, eam per consensum affici putandum est. Dolor continuus fit in affectu qui parti est proprius. Intermittens contra in parte per consensum affecta. Dolor ob vteri vitium synciput præcipuè afficit. Ex doloris proprietate & partem affectã & causam internam venatur Galen. sic sphacelus innotescit ex vehementissimo dolore, vt scribit Brasauola, quod mirum videri potest quum cerebrum insensibile sit, & præcipuè gangrenâ, sphacelismo ve affectũ, Insomnia humorum in capite peccantium essentiam & qualitatem indicare testatur post Hippocratem Aristoteles. Ventriculo cerebrum, cerebroq; ventriculus suas affectiones transmittunt. Proinde capitis dolores quomodocunque fiant, nausea, stomachiq; morsus consequitur. Materiæ etiam indicia à lotio, præcipueque ex corona & bullis sumuntur.

Præfagia. vrina turbulenta capitis dolorem adesse, vel futurum significat. Caput firmissimum, & à dolore tutissimum est, quo future pauciores sunt, maximè ab extrinsecis imminentibus malis. Craneum solibus expositum & tempestati, breui pro osseo fit ferreũ, & omni morbo inaccessum, vt ait Synesius. Minus laborant corũ capita, quibus pe-

diculus in capillo est. A capite tanquam ab arce dependent funes morborum vsque ad reliquum corpus. Omnis ægritudo partis alicuius inferioris sub capitis præiudicio commouetur, nam huic singula membra nexu naturali coniuncta sunt. 3. Passionarij. Corpora natura idonea sunt, vt in ipsis caput repleatur, in quibus vaporosus calidusq; spiritus generatur, aut quibus biliosa excrementa cumulantur in ore ventriculi. Vētriculi cum cerebro consensus fit, propter neruorum à cerebro ad stomachum descendentium magnitudinem. Cephalæa vehementius fœminas tenet: ob diligentiam capillorum. Cephalæa grauis in repletis apoplexiā prænuntiat. Capitis dolor quantuncunque fortis non interficit. 2. *ἢ τόν.* In febre tamē vehemētes perpetuiq; dolores, accedente letalium notarum aliqua valde sunt periculosi. 3. progn.

Meth. m. symptomata curantur sublatione causarum à quibus dependent. Causa externa nullam præstat curationis indicationem. Capitis in dolore sanguinem venā detrahit, vel perure venas. Hipp. lib. de loc. in homine. Dolenti partem capitis posteriorem in fronte recta vena incisa prodest. Sunt qui in omni capitis dolore auersuam sanguinis missionem laudant, in quorum albo est Salycetus, & Nicolus. Reuulsionis etiam causa imponenda sicca fientibus affectibus non in parte affecta, sed vicina.

icina. Dolor si non cedat remediis, sed intendi-
 tur, metus fit cæcitat^{is}, ob fluxum materiæ in ocu-
 los. Arteriarum tunc quæ per tempora repunt se-
 ctio, erit necessaria, ex consilio Pauli & Mansoris.
 Clyster validus ea quæ ad caput ascendunt, reuel-
 lit. In omni cephalea quotidiana fæcum expulsio
 confert. Quæ apparant materiam serapia, à cœna
 concoctione facta, sumenda sunt, in capitis passio-
 nibus, vt sentiunt Rasis, Auic. Legius. Ad caput
 purgandum pilulæ magnæ & post cœnam dantur.
 Dama. & Moses. In fine morborum quos vitiosus
 succus creat, calefaciētibus & siccantibus est vten-
 dum. nam quod reliquum est humoris absumunt.
 Eorum quæ in capite continentur, purgatio pro-
 pria fit per palatum, vel nares, vel per vtrunque,
 videlicet apophlegmatismis, gargarismo, ptarmi-
 cis, aut ἐγξινοῖς. Caput sanare ante totum corpus
 non licet, vt ait Plato. Ideo communis euacuatio
 propriam præcedere debet. Nisi in aliquot casibus,
 quorum meminit Mesueus & Gentilis. Totum
 corpus ab excrementis vacuum est reddendum,
 quàm vlla pars valentibus remediis sit subiicien-
 da. Topica remedia coronariæ sunt imponenda
 cum infriictione tunsis capillis aut abrasis, per syn-
 ciput & non per aliam capitis partem medica-
 menti vis intro peruenire potest, vt ait Galen. ta-
 men nares vnguentis illinuntur, vt caput odore
 ipso

Annotatio.

observatio.

ipforum incalescat. In hoc etiam excogitati sunt pastilli odorati. Embrochæ de topicis præstantissima remedia sunt. 4. pri. & si emplastra sint his efficaciora, prima tertij.

An capitis tonsura in dolore utilis? non convenit inter doctores. Scribonius enim compositione 10. prodest, inquit, quum diu caput dolet, ad cutem tonderi. At Celsus lib. 1. cap. 4. caput ait infirmum nunquam ad cutem tonderi debet. Certè capitis tonsura cutis poros aperit, ob id salubris existit: è diuerso capitis rasura densam reddit cutem, sicq; retinet vapores, prima quarti.

In victus ratione vitare oportet vehementes motiones: motu enim forti qualis est sternutatio & coitus, augetur capitis repletio, vt ait Moses 9. aphor. Insalubria sunt omnia euaporantia, vt lac. omnia bellaria caput dolore infestant, præter palmulas, ficus, & vuas, vt sentit Areteus. Palmulæ tamen infestæ sunt, testibus Galeno & Ætio. Amygdalæ amaræ videntur ex vsu, quoniam arcent ebrietatem sumptæ, vt asserunt Dio. & Plutarchus, Vinum in omni capitis morbo nocet prima tertij.

nota. — Galenus concedit aquosum vbi dolor per consensum ventriculi infestat, lib. de euchy. & merum in forti hemicrania, quæ à frigore vel à sanguinis crassitie fit. 6. epi. com. 2. & 2. $\eta\epsilon\lambda\ \tau\omicron\pi$. Trallianus concedit porra cocta & allia, sed satiari vel vtilibus malum,

nalum, vt ait Areteus. Nihil tam conueniens cephaleæ quàm animi tranquillitas, vt ait Rasis.

De cephalalgia sanguinea. CAP. IIII.

AD capitis dolores à sanguinis copia, hoc ordine conueniunt præsidia. Aluo astrictæ clysmus mollis, sanguinis missio ex cephalica, vel è vena quæsita est inter policem & indicem. De repellentibus est oxyrhodinum fronti illitum. Sanguinem autem alterant syrupus acetatus simplex, oxyfachar simplex, syrupus de limonibus, de acore citri, de omphace, de succo oxalidis, syrupus nympheæ, serapia miscentur aquis extillatis ex cichoreo, buglossò, intubo, cum victus ratione refrigerante, & siccante: & nihil magis salubre quàm animi tranquillitas, cibus exiguus, somnusq; multus, vt ait Rases. De purgantibus catharticis vtilia sunt, manna, atramentum calami dulcis, diaprunum, decoctum myrobolanorum citrinarum, cum prunis tamarindis & iuiubis. Aqua fructuum Mesues, decoctum adianti eiusdem, & decoctum fumarie: huc etiam pertinet syrupus rosatus ex nouem infusionibus. Valet etiam dilutum rhabarbari cum diacatholico, vel electario rosato, aut de psyllio. M. Benefacit etiã in linteo capiti adposita muccago seminis altheæ, vel seminis psylli, in aceto macerati, frigidaq; odorari &

ri & olfacere, veluti sunt rosæ, myrtus, salices, py-
ra, poma, acetum rosatum, aqua rosacea, cui ad-
iuncta sit camphora, vel puluis fantalorum, salu-
bria quoque sunt ferva ex verbena, aut ex ramis
polygoniæ.

De cephalalgia biliosa.

CAP. V.

AD biliosam cephalalgiam ratio victus
frigida & humida ex usu erit. Inedia &
vigiliæ nocuæ, immoderati animi affe-
ctus, & præcipuè ira nocentissimi sunt.
Statim inter initia bilis purganda est cholagogis
commemoratis, vel ex syrupo acetoso solutione
ducente bilem. M. vel ex serapio rosato cathartico
cum rhabbaro, & decocto prunorū tamarindo-
rum & florum cord. vel pilulis aureis Nicolai, vel
assaieret Auicen. Deinde localia auxilia raso capiti
imponenda, vt epithema ex oleo rosato, violato,
vel nymphææ cum modico aceto. Et in caliditate
multa licebit addere succum solatri & semperuiui.
Embrocha vtilissima fit, ex decocto rosarum vio-
larum nenufaris, foliorum lactuce, & corticum pa-
paueris albi, cum floribus anthemidis, & meliloti.
Naribus infundatur oleum violarum aut cucurbi-
tæ satiuæ, vel nymphææ. Olfaciat pastillum ex flo-
ribus nenufaris, rosarum, violarum, seminis endi-
uiæ, portulacæ, acetosæ, papaueris albi, cum santa-
lis &

lis & camphora. Si hederæ folia mollia cum oxy-
 rhodino torreantur, & fronti temporibusq; impo-
 nantur, miraberis. Hoc idem terrestris hederæ suc-
 cus cum rosaceo mixtus, & fronti illitus præstat, vt
 testatur N. Alex. Ad phlegmonē & cephalalgiam
 calidam optimum est vnguentum rosatum N. fo-
 lia hederæ menyngarum cerebri dolorem sedant,
 si mollia imponantur, aceto exiguo & cum rosa-
 ceo trita & decocta. Alex. B. Hedera, inquit, Loni-
 cerus ex contrariis facultatibus est composita, par-
 tim enim adstringentem, terrenam frigidamq; sub-
 stantiā, partim acrem quæ calida est, partim etiam
 aqueam tepidam nimirum substantiam obtinet.
 Theophrastus calidam siccamq; dicit, sed in sym-
 posijs Plutarchi hedera suo frigore temulētiam re-
 stinguit.

nota vtere
miraberis.

heder. terrest. succ.
cū rosaceo mixtus.

Hedera.

De cephalalgia pituitosa.

CAP VI.

Dolor capitis à pituita exigit rationem
 victus calidam & siccam, alimenta pau-
 ca, & rara, & inediam. nam habentibus
 humidis carnes fames conuenit. 7. aph.
 Apparatur pituita potu hydromellis, mellis rosati,
 oxymellis simplicis, serapio de duabus radicibus
 syrupo de stecade, purgatur verò primū clemētio-
 ribus, veluti hiera simplici cū agarico, pilulę masti-
 chinę Cōcil. vel ꝑ. pil. assaieret. 3. ij. agarici tro. ʒ. j.
 vel

vel. 3. §. formentur pil. v. quas sumat post primum somnum. Ab his rursus apparatus materia pituitosa fortioribus, vti sunt hydromel, mel rosatum colatum, acetum passulatum, oxymeli simplex & compositum, oxymel scilliticum, cum aquis saluiæ, betonicæ, feniculi, maioranæ. Porro materia cōcocta deturbatur electario Indo, diaphenico, blāca, & benedicta Nicol. & cathartici imperialis 3. iiij. cū melicrato sumptæ caput suauiter purgant, pilulis cocciiis, pil. arabicis, & sine quibus. Die sequenti operationem cathartici sex horis ante prandium Ægro- tans sumere debet 3. j. theriaces, mithridatij vel aureæ alexandrinæ. Itaque agioxyli decoctum frigidus capitis dolores potum sanat. Balani acres & clysteres, frictiones valide ac diuturnæ, vinculaque dolorifica, pituitæ sursum ruentis impetum auer- tunt, sed vitare oportet oleum in enemate, vbi ca-
 pitis grauitas fuerit, aut stomachi læsio, vt ait Æ-
 tius. Salutares etiam sunt cucurbitulæ interscapu-
 lio & ceruicibus affixæ. Errhynum ad dyscrasiam
 cerebri frigidam & humidam. & maioranæ, blitis
 albæ añ. m. j. roris marini, matricariæ añ. p. j. glycy. 3.
 vj. passularum. 3. §. mellis. 3. x. zinziberis pyrethri
 añ. 3. j. in aqua sufficiēti fiat decoctio ad dimidias.
 Mastiche commanducata cum pipere, aut staphi-
 sagria humiditatem cum pituita ex ore trahit, for-
 tior est agaricus instar ciceris commansus. Item vt
 ait Sere

*Quando vitandū
 cum in enemate*

ait Serenus, purgatur cerebrum mansa radice pyrethri. Reliquam pituitam à capite dissipant conditum de acoro mastichatum, aromaticum rosatū, diamoschus dul. diambra. hæc enim olfactu caput roborat. Ad idem pollet pastillus è ladano, vel qui fit ex caryoph. cinamomo, maiorana, ambaro.

De topicis. ℞. radicum cucumeris syl. foliorum ab-^{cataplasma et} sinthij añ. m. j. bulliant in hydrelæo ad tertias. Ex^{embrocha} fæce pista fiat cataplasma, sed ex iusculo fiat embrocha. Aliud. ℞. radicum bryoniæ recentium elixatarum & cribelatarum lib. j. absinthij. calamenti, origani recentium añ. m. j. §. elixentur & cribrentur, postea adde farinæ ordeï. ℥. ij. croci. 3. j. olei liliorum alborum. ℥. iij. misceantur omnia simul & fiat emplastrum. Vnguentum Fauētini ad omnem capitis dolorem. ℞. succi anthemidis. ℥. iij. succi ros. ℥. ij. succi rutæ, & betonicæ recentiu añ. ℥. j. §. succi radicum althææ. ℥. ij. olei rosati omphacini lib. j. alabastrî purissimi puluerati. ℥. iij. alabastrum per diem & noctem infundatur in oleo, & cum cera alba fiat vnguentū. In acerrimo dolore ℞. huius vnguenti ℥. §. opij grana. iij. misce, & illine pulsus temporum & partem dolentem.

De cephalalgia ab atro humore.

CAP. VII.

To. i. Lib. i.

d

Ad



AD capitis dolorem ab atro humore hiera Pacchij est mirabilis. Apozema seu feruefactum ad idem. ℞. corticum myrobolanorum citrinarum ʒ. xvij. chebularum ʒ. ix. indarum ʒ. xxvij. spicæ, squinati, cinamomi, epithymi boni, agarici, florum violarum añ. ʒ. ʒ. polypodij ʒ. ij. aque. q. s. infusa simul & macerata ad lentas prunas coque ad cōsumptionem medietatis, sumat Aegrotans de colatura mane ʒ. iij. plus minus cum syrupo violato. Cōfert ad idem infusionis de hiera M. ʒ. j. potui data singulo mane, fluor hæmorrhoidum hanc ægritudinem amolitur. Insuper salubria sunt dianthos, confectio de moscho dulcis, electarium pliris arcotici, Nicol. ℞. diaprassij ʒ. ij. cū vino calido, in quo cocta sit hyssopus & tragachanta fiat potio, sumat in sero, cuncta capitis vitia emendat. A pastu conuenit coto-neati saccharacei esus. Vnguentum optimum recipit bryoniæ ʒ. viij. olei lib. j. ʒ. ceræ lib. ʒ. coque, & fiat illitio ad locum dolentem.

Ad pituitosas cerebri materias. Apparantia sunt sy. de cortice citri, mel rosatum, oxymel simplex, oxymel scillinum, hydromel, sy. de hyssopo, de prassio, de calamento, de stæcade. De catharticiis sunt hiera, s. cum agarico, hiera diacolocynthidos, infusio de hiera, M. pilulæ stomachicæ, aggregatiue minores, pil. de sarcocolla, alādahal, pil. lucis, pil.
fine

sine quibus, pil. de euphorbio. Sotira magna Auic.
cū aqua roris marini & catapucie puluerate ꝓ.ij. vel *nota.*
3.j. cinamomi. ꝓ. j. cū ouo sorbili, vel iusculo carnis,
sumat ieiunus, crassam pituitā purgat sine molestia.

A purgatione conueniunt sequentia remedia,
theriaca diatefferon, confectio anacardina, electa-
rium de gemmis, & de aromatibus, confectio de
moscho, aromaticum rosatum Grab. Aromaticū
moschatum, acorus conditus diambra. & spicæ
nardi ꝓ. j. cum theriaca. f. pil. ij. quas sumat à cœna
duabus horis. & ambari gra. iij. sy. de calamento 3.
ij. cum aqua maioranæ sumat in aurora. & pul. mo-
schi gra. ij. aquæ maio. 3. iij. fiat erihinum, fit etiam
apophlegmatismus, ex globulo agarici comman-
so. Aliud. agarici 3. s. pul. diambrae ꝓ. s. cubeba-
rum xyloaloes añ. ꝓ. j. cum aqua iridis f. tro. siccati
in sole. Commansi purgant caput, illudq; roborāt.
& ambari. ꝓ. j. xyloal. gra. v. fiant pil. cum vino aro-
matico, octo pro drach. sumat ij. omni sero, per ij.
horas ante cœnam, vigorosos sensus, robustumq;
cerebrum faciunt. Ad idem, ladani puri 3. j. nigellæ
romanæ 3. j. s. ambari moschi añ. gra. iij. torrefiāt
omnia super patella ferrea, ligata in serico, sæpe o-
dorentur, arcet fluxū materiæ à cerebro. & libani
3. s. sandaracæ 3. s. macis 3. j. fiat puluis pro ver-
tice. Aliud. macis 3. j. s. sanda. ꝓ. ij. xyloal. spodij
añ. ꝓ. j. mastichæ 3. s. Item ex puluere caryo-
phylli

phylli asperge coronalē, visum etiam corroborat. Aliud maio. betonicæ, stæcadis, anthos, galangæ añ. 3. S. sand. 3. ij. R. ladani puri 3. S. styracis calam. 3. ij. sandaracæ 3. j. ambari. 3. j. conus cupressi, mastichæ, corallorum amborum spodij añ. 3. ij. resinæ 3. vj. dissolue ladanum cum resina & vino veteri, & coquantur ad viscositatem. f. emplastrum pro vertice, antiquos rheumatismos discutit. Augmentum in cerebro faciunt auellanæ tostæ sumptæ à pastu. 2. cano.

De hemicrania.

CAP. VIII.

*
benzoinum.

AD hunc dolorem lasar cum betæ purpureæ succo distemperatum in narem eius partis qua dolet, immitte, statimq; dolor cessat. Ad hemicraniam vehementem sicca cum flamma in inio siue fontanella colli admota remediatur, oleumq; nymphæ, naribus attractum frugiferum est, teste Razi.

De capitis dolore à futuris.

CAP. IX.

INterdum incidit capitis dolor ab apertione suturarum, sanatur verò ligatura quæ cephalica dicitur, & reuertentibus futuris in suum locum cessat dolor, vt asserit Oribasius.

De

De capitis dolore cum rheumate.

CAP. X.

Primum destillatio curāda est auersioni-
bus variis cognitis, sed sanguinis missio
nocua est, nisi ad partes internas cōfluat
materia, cauereq; oportet ne topica ca-
piti ad applicata rheumatismum dissoluant.

De amuletis.

CAP. XI.



Orpedo viua imposita eo loco, qui in *Torpedo.*
dolore est, in perpetuum remediat, teste
Scribonio, fecula illigata prodest. Lima- *Limacis calcu-*
cis calculum quandiu tecum habueris
nunquam dolorem patieris. Magnes collo adalli- *Magnes.*
gatus, vel circa caput, dolori medetur. Idem præ-
stat lapillus albus hirundinis in manu retentus, vel *Lapill^{us} alb^{us} hir-*
capiti alligatus. Gallinacei pluma vel crista adalli- *Gallinac. pluma*
gata. Corona è pulegio. Ad hemicraniam mirum *vel crista.*
remedium est, se tondere luna 7. vel 17. vel 27. *Corona è puleg.*
Caput muris suspensum. Corium vppupæ illigatū. *7. 17. 27. du*
Rafis. Vppupæ pennæ capiti appositæ sedant so-
dam. Idem & Vincentius. Gagates adalligatus ca- *Lapis gagates*
pitis dolores inueteratos sedat. Actius.

*De vertigine, scotosi, scotoma, scotodiniāve,
& inde scotomatici vertiginosiq;*

CAP. XII.

d 3

Sco

SCotomica passio ab accidenti nomen sumpsit, quod repentinas oculis ingerat tenebras, à qua separare vertiginem necessarium non est, vt autumat Aurel. Itaque Linacer vertigines ait Græci vocant scotomata. Aliter Gal. 4. r. a. quum caput, inquit, circumagi videtur, *δῖνος*, id est, vertigo vocatur affectio, quum autem & tenebricosa simul fuerit visio, *σχοτόδῖνος*, hoc est, tenebricosa vertigo appellatur. Sunt tamen caligines oculis offusæ, & vertigines cognata vitia, vt ait Herodotus. Itaque vt Æginetæ placet, *σχοτόδῖνος* est ingens vertigo, in qua obscuritas fit: Et hæc in cerebro fundamentū habet. Ergo non errant (vt quidam putant) qui inter vtrunque agnoscunt differentiam. Mendum euidentis est in lib. diffi. vbi scriptum est, quod scotomaticis caput circumferri videtur, cum lucis splendoribus.

Causa. austri, motus circularis, quia non permittit materiam difflari irruente cum turbinis impetu aëre, & transpirationem inhibente, vt docet Cassius. Inspectus aquæ fluxus, ambientis calor, quo incalescunt spiritus & humores, & inde commouentur in gyrum. Caluariæ fractura vel perforatus. si priores cerebri ventres premantur. Contingit etiam vertigo acrius intuentibus ex ponte veloces aquarum cursus, rapitur enim spiritus viuus

fiuus ab obiecto rapidi cursus. Capite multa humiditate pleno, flatus excitantur, qui circa oculos mouentur, & vertigines pariunt, fit etiam à spiritu vaporoso, qui in cerebro est, & inordinato citatur motu. 3. aph. Vaporosus autem spiritus, vel à capitis intemperie ortum habet, vel ab oris ventriculi vitio nascitur, vel forte per calidam cordis intemperantiã gignitur, per arterias pone aures, aut per alias his maiores, quæ ad cerebri sustentamentum per retiformem membranam ascendunt, ad cerebrum fertur. 3. de loc. af. Efficitur etiam à dyscrasia inæquali, inibi. A frigida humida & materiali. Æg. à vaporibus quoq; incidit, eleuatis ab humoribus qui in ventris ore sunt. 4. apho. com. 17.

Dignostica causarũ cognitu facilia sunt. Nempe ex capitis & sensuum oblesione, vel ex nausea cordis ve morfu. Et si percussus arteriarum post aures vehementes sunt, liquido iam constabit vertiginem vaporum esse sobolem, vt ait Damascenus.

Prælag. vertigo prænuntiat epilep. aut apoplexiam. Senioribus accidit. 3. aph. facile ea capiuntur, quibus solitæ excretiones retinentur. Aet. Ve- ^{quo tempore?} ^{fit vehemētior.} hementescit hyeme vel veris initio. Aurel. Anorexia cum vertigine, orisq; amaritudine, purgationem per superiora necessariam significat. 4. aph. 17.

Metho. m. symptomata curantur sublatione
d 4 causar

causarum efficientium. 12. th. Igitur cor, os ventris, vel ipsum caput curandum. Sed caput ante totum corpus curare non licet. 4. ther.

Accessio præsens curatur quiete, & aëre obscuro, lux enim spiritus exagitat, serapia frigida & astringentia ex usu sunt, quoniam spirituum humorumq; motus turbulentos sedare possunt. Ea quoq; quæ odore spiritus animales recreant, optima sunt. Sed euaporatio à capite auerti debet frictionibus, vinculis ad musculorum capita iniectis ficyis, causticis, clysmis acribus, & id genus aliis. Veluti si pathema dependeat ab humorum qualitate, purganti pharmaco, sin à copia secta vena saphæa auersio fiet, vel scarificatione crurū, vel per hirudines ano impositas. Si verò per calidam cordis dyscrasiā per arterias vapor sursum feratur, arteriæ sectio retro aures his adhibere cōsulunt Hippocr. & Galen. vel desuper imponenda sunt pharmaca astringentia, vti balauſtia, cytinus, malicoriū, galla, acacia, aloes, opium ad formam emplastri cum aceto vel oui aquata redacta. Etsi præsentium & futurorum vna communisq; medendi ratio sit, vt innuit Hipp. 2. aph. 29. præfata auxilia non solum præsentem paroxysmum curabunt, sed etiam impendentem declinabunt.

Remedia in causâ calida, sy. acoris citri vel li-
vel de pomis. monis, acetosus, de ***prunis. Oxyrhodinum, de pur-
 gentib

gantibus, electarium rosatum, de psyllio, & confectio hamec, hiera simplex, decoctum myrobolanorum. Vertigo in febre modò non contingat obcrisim, sanatur, si capiti raso catulus scissus aut galus vel gallina calidus imponatur. Constan. In causa frigida conueniunt oxymel simplex & scyllite, acetum scyllinum, dianthos, diaprassum, diamoschus, confectio de stecade & alfescera M. purgant clysmi acres, hiera diacolocyn. hiera hermetis, hieralogodium, pil. de hiera, masticinæ, arabicæ, pil. sine quibus, coccia, huc etiam pertinent errhyna, apophlegmatismi, gargarismata. R. coriand. præpa. 3. S. rasuræ eboris 3. ij. libani 3. j. cum succo ros. f. massa, ex qua fermentata formentur pil. paruæ, sumat. x. cum puluere zucari omni nocte. R. chame-meli m. j. stæcadis m. S. ros. m. S. galliæ moschata 3. iij. f. sacculus in vertice, roborat cerebrum frigidum & hu. & ab eo arcet vapores, vt ait Bauerus. Capitis lotio ex decocto inulæ sanat vertiginem. *Enula campana* Idem præstat abrotanum potum. Rosarius.

Amuleta. corona ex planta vlmi capiti circum- *planta vlmi.* ligatur. Ruel. virga vulpis capiti adalligata vertigi- *Virga vulpis.* nem tollit. Niculus.

De ephialta, seu incubone. CAP. XIII.

Eφιάλτης à verbo ἐφάλλομαι, id est, incubus, pnigalion seu pnigamon x. epi. est passio posterioris partis cerebri, videli-
d 5 cet

cet, obstructio à crasso vapore, qua offenditur motus corporis & linguæ, ita vt præfocari in ea affecti videantur. Mouendi enim vis, linguæ, aduenit à septima neruorum à cerebro ortorum cōiugatione, non longe à spinalis medullæ initio. 4. de lo. af.

Causa remota cacochymia, proxima vapor crassus ex crassis ortus humoribus, & cruditatibus qui prohibet facultatem liberè per neruos transire, vt ait Aet. vnde incubus fit ab organorum facultatis animalis modica obstructione. 9. Alman. Ephialtæ fiunt in somno quum crassus humor seu in cerebro, seu in thorace impedit motum thoracis, eaq; compressio mouet imaginationē, vt cogitet premi thoracem ab aliquo alio.

Digno. ab essētiæ ratione explicata sunt. Ephialta est quædā in somno epilepsia, lib. de vsu respi. nam quæ epileptici interdium, eadē ephialtici dormientes noctu patiuntur. Paul.

Prælag. præambulo est apoplexiæ, epilepsiæ & mania. Paul. & lib. diuis. Incubo vitæ periculū interdum affert teste Scribonio.

Metho. m. Cacochymia purgatione quæ cuiq; superanti succo sit accommodata curatur.

Remedia, à purgatione confert assumere conseruam anthos calēdulæ, exhilarans. Manforis. Naribus ad olfactandum crebro suggera anesum.

Amuleta. de collo gestent corallium, aut radicem

cem pæoniæ, quæ ephialtion propterea dicta est,
quod nocturnis incubonum ludibriis medeatur.
A collo pyriten gestās lemures ac laruas nō timet,
literis proditum est qui lapina pelle conteguntur
suauiter & sine formidine dormiunt. Ex Plin. &
Pratenfi.

*De apoplexia quæ & stupor attonitus, &
apoplexis, & syderatio dicitur.*

C A P. X I I I I.

Apoplexis dicta est, quod tanquam ex le-
tali percussu repentinum faciat casum,
vt retur Aurelian. Est enim repentina
omnium corporis partium sensus &
motus priuatio, cum principis animæ facultatis
læsione. 3. de lo. aff. Eius differentia fortis & debi-
lis. Apoplexia est maior, hemiplexia minor, vt ait
Orib. Anheliud in debili apoplexia, aliquem ser-
uat ordinem. In forti est inæqualis. In fortiori ma-
gna cum vi fit. In fortissima deficiens est spiratio.
2. aph. 42. sicq; discernitur affectionis magnitudo,
ex noxæ quam spirationi infert vehementia. 3.
de loc. aff.

Causa non est dyscrasia, quoniam subitò euenit,
sed est aut frigidū aut crassum, aut viscidum quid-
piam, quod principes cerebri ventriculos affatim
implet. 3. de lo. aff. Apoplexiæ omnes fiunt vi ani-
mali

mali non potente defluere ad partes infra caput
existentes, aut propter aliquam dispositionem si-
milem inflammationi quæ in cerebro sit constitu-
ta, aut vëtriculis oppletis humore pituitoso. 2. aph.
com. 42. fit etiam interdum à sanguine, & ab atra-
bile. 6. aph. com. 57. Accidit quoq; obstructis, dē-
fatis, vel compressis in collo arteriis carotidibus
quæ & apoplecticæ ob id dicuntur lib. de vsu pul. &
4. r. a. Præterea immoderatam sanguinis euacua-
tionem apoplexia sequi solet. 9. ther.

Digno. malum hoc plerunque citra febrim ad-
uenit, & hominem repente in terram prostermit,
qui veluti dormiēs iacet, & sine somno stertit, ron-
chisatve. Ad nullas inclamationes, nec ad quas-
uis collisiones expergiscitur, & tam grauis torpor
attonitum tenet, vt nullis stimulis discutere queas.
In hoc affectu omnes thoracis muscoli mouentur,
propter respirationis necessitatem, quæ neruorum
vim excitat ad operationē. Alij verò muscoli motu
priuati sunt. 2. aph. com. 42.

Præfag. apoplexia licet acutus sit morbus, est ta-
men sine febre. 2. aph. com. 19. vehemēs solui non
potest, leuis non de facili potest. 2. aph. 42. Debilis
citò curatur. Gal. in com. terminatur in paralyfim.
Est morbus senibus familiaris, ob pituitosos in ce-
rebro humores. 3. aph. com. vlt. Difficiles curatio-
nes fortium hominū, quia in illis maior spirationis
noxa

roxa contingit, quàm in frigidis & debilibus, ut ait Aurel. Qui strangulantur & exoluuntur citra mortem si ore spumant non referuntur. 2. aph. 43. spuma it ex humiditate, in qua aer subingreditur, quæ in hoc malo nota lethalis est, & in epilepsia salubris rationem explanare nititur Gilbertus. Ante tertium diem exactum apopletici sepeliendi non sunt. In tribus enim diebus humores omnes motus suos complent, ut scribit Concil.

Metho. m. Extremis morbis extrema remedia optima. 1. aph. 6. ut os apertum maneat, cuneus intra dentes ponatur. Mox à cerebro materiam reuellere, distrahere, & vacuare oportet, sanguineam, sanguinis missione, pituitosam phlegmagogis, clysmis acribus, errhynis, apophlegmatismis, sternutatoriis, frictionibus, ligaturis doloriferis, rubificantibus, cucurbitulis, & caustico in vertice admoto. Sed notandum, quod in forti apoplexia curationem ordiri oportet à clysmis acribus. In debili contra à sumendis catharticiis ut consulit Razes 1. cont. & lib. diuis. Idemque iubet iugulares venas secare, sed non imitandus propter periculum, ut ait Agrado. Placet tamen (quam Razis laudat) phlebotomia ambarum cephalicarum simul eodem tempore facta. Apoplexiæ omni quæ non fit à frigida causa, confert sicca in colli fontanela, siue inio admota. 3. aph. Raz. Item sicca cum multa flamma sub sinistram

Observatio prætica notatu digna

*nota.**Sartago ignita**Unguent. opt.*

strum armum iniecta, reuocat ad vitam deploratos. Et in omni cordis passione optimum remedium est. nā obstructa itinera spiritibus patefacit, & liberam virtutem reddit, ex Apono. Apparantia & purgantia materiam in cerebro pituitosam libro præcedenti notata sunt, similem cum his quæ digerunt, & caput roborant. Sartago ab igne candens capiti ita proxima, vt cerebrum incalescat, adeo opitulatur, quòd deperditam loquelam restituat. Vnguentum optimum Tussiquanæ, euphorbij, piperis, hyssopi, calami aromatici, costi, castorei glutinis alibar, opoponacis añ. 3. iij. styracis 3. j. S. ceræ citrinæ q. s. cum oleo costino f. vnguentum quo vngatur caput rasum. Aliud. R. emplastri apostoliconis 3. j. S. resinæ 3. S. ceræ q. s. ammoniaci castorei añ. 3. iij. euphorbij 3. j. fiat ceratum, caluæ impositū à profundo aquosam materiam extrahit, mirabiliterq; iuuat apoplelios syderatosve.

Amuleta, smaragdus si de collo pendeat, apoplexi confert. Zoar.

De epilepsia.

CAP. XV.

Epilepsia nomen habet quod sensum & mentem pariter apprehendat, vt placet Aureliano, forsan ab ἐπι καὶ λήσις, id est, supra captio. Eadem dicitur παιδικὸς morbus Hippo. & primus morbus Lucretio, quòd primam

primam ætatem sæpius oppugnet. Comitialis & maior Celso. Diuinus Apuleio, *ἐπεὶ νόσος*, Tralliano. A magnitudine herculeus, inuictusque Aristoteli. Sonticus Plinio. Lunaticus Cælio, quòd interlunio editos eo fere corripì adnotatum fit.

Vel quia dubiæ per tempora Lunæ

Conceptum talis sæpe ruina profundit, vt cecinit Serenus.

Est morbus acutus absq; feбри. 5. aph. com. 3. Est omnium corporis partium per neruos conuulsio non perpetua, sed quæ ex temporum accidit interuallis, cum mentis ac sensuum oblesione. In hoc enim vitio cerebrum se ac totum corpus cõcutit, vt à se expellat id, quod primo aut per consensum offendit. Qualẽ motum in singultu facit ventriculus vbi re acri mordetur, corrupto cibo infestatur, vel copia cibi grauatur. 3. de lo. af. Eius differentie tres numerantur, vna quæ fit læso cerebro affectu proprio. Altera fit per consensum oris ventriculi. Tertia per cõsensum partis alicuius prauè habentis efficitur. Nõnulli primã epilepsiam nominant, secundam analepticam, tertiam verò catalepsiam.

Causa externa, clamor tubæ, soniq; validi, quales fiunt tonante cælo, & excussu tormentorum. Magna ex parte victus deprauatus passionem generat. Apium naturæ suæ aptitudine nocet, si credimus Tralliano, Auicenn. Mesueo, & Setho. Pisces, inquit,

inquit Plin. si ægrotent in piscinis apio viridi recreantur, at in puerperiis ab eo cibo comitiales fiunt. Hanc apii proprietatem Galen. ignorauit, ut apparet in cōsilio de comitali. Huc refer quæ comitiales arguunt suffita, bitumen, lapis gagates, cornu ceruinum, odor hepatis caprini affati, & ipsum hepar dum editur. Apoplexis ob pituitæ in ventriculis cerebri aceruatæ multitudinem accidere videtur, proinde horum symptomatum generatio, tum solutio subitanea est, id quod per corporum intemperiem fieri haud potest, ut ait Gale. 2. de ca. sy. Et ut crassius pituitæ succus ita melancholicus quoque comitiales solet efficere, ubi in meatibus ventriculorum cerebri retinetur, siue is medius sit, siue postremus. Vbi verò in cerebri corpore abundat insaniam melancholicam efficit. 3. de lo. af. pessimus & horribilis humor est, qui hoc pathema efficit, ut opinatur Auenzoar, ex quo innuere videtur quod à qualitate humoris illud euenit. Oritur etiam secundum Gale. à vapore aliquo, aura ve spiritali à ventriculo aut parte aliqua ignobili elato.

Digno. si à proprio cerebri affectu contingat, subitus fit casus, cum vehemēti & continuā totius corporis concussione, & multa oris spuma, & hæc fortis dicitur, in qua omnes cerebri anteriores ventriculi obstruuntur. In debili & quæ fit per consensum

um obstructio minor, & reliqua symptomata debilia, & casus erit cum parua, & intermittente concussione, nec semper cum casu incidit paroxysmus. Quum humidior est materia, tum in crescente luna, quum verò frigidior, tum ea inclinante excrudescit. Quæ in coniunctione mouetur à frigiditate nascitur, quæ verò in plenilunio ab humiditate suos habet periodos. Ex Tussi gnana & Neocomensi.

Prælag. De comitali obnoxiis differit Crinitus. 25. de honesta discipl. Homo solus comitali in tenera ætate laborat, teste Aristot. Oues & capræ comitiales sunt. Hipp. eas tangentibus morbus affricatur. Plutar. Coturnices damnatæ mensis propter comitalem, hunc solæ animantium sentiunt præter hominem, vt scribit Plini. Ego non semel psitacos, canes, simias & cercopitecos cõuulsos ab epilepsia vidi. Melancholici comitiales fieri solent. Comitialesq; melancholici. 6. epi. A comitali furor interdum euenit. Acti. pueri propter neruosi generis infirmitatem facile conuulsionibus corripiuntur. 1. epi. com. 2. Iuuenes liberari possunt ætatis loci & salubri victus ratione. 2. aphor. 45. Comitiales qui ante pubertatē fiunt, in ea finiunt, qui vltra procedunt, commoriuntur. 5. aphor. 7. Pueri comitiales vna cum pubertate mutationes habent. 6. epi. Morbi per pueritiam crescētes pu-

To. I. Lib. I.

e

berta

bertatis siue coeundi tempus sanat, inibi. Coitus primo masculorum, & menstruo primo foeminarum plures morbi sanantur. Pli. Comitialis depulsus à quartana diu infestante. 1. epi. com. 3. Tuberculum esus frequēs epilepsiam & apoplexiam efficit, si credimus Setho. Si in prima accessione epileptici, sanguinis à quouis mēbro fiat detractio, nunquam postea homo à tali vitio infestabitur, vt asserit Theodoricus lib. 4. chirurg.

Remedia. membra primum in rectum extendi, vel corpus erigi debet, & pituita ob ore extrahi. Olfacienda ruta. Odor thymi & pulegij contriti statim excitat. Excitat subito humi prostratos oleū quod balsaminum vulgus vocat, naribus subditum olfaciendum, aut quod ex lateritio lapide eximūt. Comitialis paroxysmi præsentaneum remedium est, in os eius coëffundere ʒ. ʒ. aut plures aquæ ceraforum dulcium vi ignis extillatæ, quod pròdit vir doctus Io. Agricola. Deligatura quæ fit in scorto, efficacissima est. Item castoreū collo & nuchæ illitum. ℞. succi cyclaminis, se. rutæ, coaguli leporis añ. 3. j. f. mistura de qua iniice in nares. Itē totum os fricetur theriaca vel methridatio, vel palatū illinatur anacardino. Et auribus strepitus, & oculis magna luminaria offerre, quidam iubent. Si per consensum cum stomacho accessio fiat, penna oleo lita vomitus concitetur, si commodè fieri queat, dein

lein balanis acrioribus anus sollicitetur, vaporque
 rictionibus, ligaturis, sicyisq; super vĕtrem aut in-
 ernas femoris partes admotis distrahatur. At si
 accessio per cōsensum ab alia parte efficitur, viam
 vaporis præcludere oportet, stricta deligatura, vel
 sicya valde ignita, affectæ parti affixa, vel caustico,
 quale laudat ex diacastoreo & auripigmĕto Mon-
 ca. Item lepidium herba impositum parti ex qua
 epilepsia oritur eam sanat, nā oportet exulcerare,
 extenuare, & calfacere partem, à qua aura sustolli-
 tur, vt docet Trallianus.

Futuræ accessioni nulla debetur curatio, sed so-
 la prophylacticæ, cuius officium est, causam quæ
 morbum factura est adimere, vt ait Gale. i i. ther.
 Adimet autem proba victus ratione, apparantibus
 materiam, purgantibus & resoluentibus. In pitui-
 tosa concoquunt materiam mel rosatum, oxymel
 scillinum, sy. de stecadæ, de cortice citri, de acoro,
 cum aquis saluiæ, betonicæ, hyssopi, melissæ, peo-
 niæ, &c. purgant hiera s. cum agarico. pil. de hiera
 cum agarico, mastichine Con. cocciaæ fœtidæ. Di-
 gerunt de assumendis Acorus conditus, confectio
 de moscho dulcis, Aromaticum moschatū M. Ossa
 humana combusta potui exhibita epilepsiam &
 arthritim curauerunt, vt testatur Galen. i i. simp.
 R. bregmatis hominis combusti, seminis peoniæ
 añ. 3. S. tormentilæ, visci quercini añ. 3. ij. Eboris

Eboris ramenta.

e 2 etiam

etiam ramenta magnopere profunt ad dies quinque aut plures duorum cochleorum mensura quotidie pota ex aqua mulsa, vt asserit Aet. Ad pedum & infantes epilepticos plura conscripsimus auxilia, in pragmateia de puellorum malis. Istis benefacit aqua ex peonia extillata pota. Aliud optimū, pyrethri, stæcadis, costi añ. 3. x. agarici 3. v. cari, se. anethi, assæ foetidæ, aristolochiæ rot. añ. 3. ij. S. succi scillæ mellis añ. 3. xiiij. coque scillā & mel ad bonam viscositatem, & cum puluere f. electarium. sumat 3. iij. per 4. horas ante prandium. R. nigellæ romanæ, anthos, maioranæ, macis añ. 3. j. se. peoniæ 3. j. S. cum oleo nardino fiat vnguentum molle. cum momento ceræ albæ, illinatur naribus hora somni.

Nonnulli solis cauteriis putant sanari posse epilepticos. Et si ea quæ anterioribus cerebri nervis moueri solent, qualia os, lingua, oculi illæsa sunt, vertebræ candens ferrum imponunt, vnde nervus, conuulsi membri deriuantur. Quod si à collo infra totum corpus conuellitur, à tertia ad quintam vertebram cauterium imponunt, hoc solo suffragio, vt putat Cardanus, auxiliari poteris. Vltimum auxilium est, vt idem ait, iuxta talum ex utroque crure paululum sanguinis mittere, occiput incidere, & cucurbitulas admouere. In occipitio quoq; & infra, qua summa vertebra cum capite committitur

titur, adurere duobus locis, vt per vlcera pernicio-
sus humor euadat. Nos cōtra multos vidimus cum
salubri victus ratione, & medicamentis citra cau-
terium ad sanitatem redactos.

Observatio.

Amuleta. frons asini gestata, lapilli hirundinis,
crhyolithus, Iaspis, coralliū. Tral. lapis chelidonium
rubeus, Ser. Auicen. Alb. Aetites. Alb. smaragdus
Ser. pyrethrum collo suspensum Macer. Zona de
corio lupi vel asini, viscus quercinus de collo su-
spensus. Tussig. Peonia ex collo suspensa comitia-
lem sanat, quia citra vehementē calfactionē resic-
cat. Gal. 6. simpl. vngula Alcis, vel pars vngulæ ma-
nu in pugnum complicata, cōfestim paroxysmum
abigit. In anulo inclusa & in anulari digito inserto,
idem præstat, teste viro docto Leuino.

De phrenitide seu phrenesi Samonico.

C A P.

XVI.

ΦRENITIS est delirium perpetuum cum
acuta febre, vel cum synocho homoto-
no. Raro tamen ab initio phrenitis cum
febre irruit, si credimus Aetio, nam plu-
rimis à quarta, quinta, aut sexta incipit, & adhuc
serius cum ipso ferme periculo incidens. Itaque
phrenitis dyscrasia calida siccaq; est, siue inflam-
matio meningum, & vicinæ cerebri substantiæ
communis, licet præcipuè in tenui meninge con-

e 3 sistat.

sistat. Sunt autem phrenitidis variæ differentiæ, nempe incipiens aut perfecta, exquisita & falsa, ex primario affectu & per consensum. At quod per consensum fit delirium nō phrenitis sed *παράφρεσύνη* & *παράφρενιτις* dicitur, haud enim in phrenitide cerebrum laborat per consensum, sed primaria affectione, fieri tamen potest, inquit Galen. ut corde & septo transverso affecto phreniticus quis efficiatur. Nec otij plurimi est definire an cerebrū scirrhum admittat. An abscessio in cerebri substantia fieri possit? An in eadem inflammatio? Quum dictum iam sit, phrenitidem sequi cerebri aut meningum inflammationes.

Causa cerebri intēperies calida, aut pravi succi calidi, veluti flava bilis aut pallida. Ex priori vehementior est, ex hac mitior. Nec simpliciter ob calidos succos accidit, sed quū phlegmonem in cerebro, vel in ipsis membranis producant, fit etiam exquisita ex bile flava, notha verò quando flavæ bili pituita confunditur. Et inde vigilem soporem (qui à græcis agrypnon coma vocatur) excitat, phrenitis à pituita, apud Oribasium, sed de acuta & falsa intelligendum arbitror.

Digno phrenitidem futuram licet ex insomniis prænoscere, præcedentia symptomata & iam instantis explicantur 5. de loc. aff. Ex perpetuo delirio phrenitis cognoscitur. Nam nisi febriat ægro-
tans,

in phrenitide cerebrum laborat per consensum, non

ad diaphragma afficitur

tans, & continuo deliret, phrenesis non vocatur. Delirium nullum perpetuum excepto phrenitico, & quod oritur ex septo transuerso, quod non multum à phrenitide differt. In hac febris mordacem habet calorem & perpetuo similem. Phrenitidis propria nota est, si insania non quiescit, mitigato febrium vigore, & hæc à mania sola febre differt, pulsus paruus, rarissimè magnus, robur mediocre habet, durus, neruosus, frequens & valde celer, inæqualis in situ, huius magna frequentia eminentem minatur syncopem, nam crebritas ab imbecilla oritur facultate, pulsibus adest perpetuò, ut cum conuulsione quadam motus eorum abrum-patur. Multum loqui phreniticorū est, tacere melancholicorum. De notis etiam sunt lucis horror, cum vano manuum errore, id est, crocydismo, & carphologia, ut ait Aurel.

Prælag. est morbus acutus & periculosus, quarto die aut quinto pereunt, phrenetici nō omnes tremunt, sed qui deterrimè habēt. Labiorum tremor in acutis mortis signum. Phrenitis si in lethargum commutatur perniciosa est. Superuenit nonnunquam peripneumoniæ à calido ortē succo quē va-poribus replet cerebrum. Phrenitici sunt βραχυ-
 νότοι, non sitiunt quia vim stomachi appetitricem habent extinctam, his alba deiiciuntur, bile tota confluente sursum ad caput, sunt robusti quia ner-

Differentia phrenitidis & maniae

Pulsus phrenitidis

*Labiorum tremor
Lum arguit.*

Phrenitidis in lethargum perniciosa.

J. phrenitici bibentes

Phrenitici robusti

uorum genera quanto ficciora, tanto fortiora. Medicatoria non bibentium & vix bibentium, brevis spiratio.

Metho. m. consistit in victus ratione salubri. In auertentibus, repellentibus, in cerebri dyscrasiam alterantibus. In digerentibus materiam, si in meningibus superest. Victus ratio refrigerans & astringens idonea est, quò succi densati in caput ægrius confluant, decumbat æger in tenebricoso cubiculo, quia lux addit ad insaniam, præcipuè aërophobis, nam fluxum reddit magis exorbitantem. Conueniunt de cibis ptisana, cremor hordei, auenæ, & chidron, alica, panis medulla ex iure pulli gallinacei elixa. De oleribus elixis vtilia sunt lactuca, malua, scariola, intybus, borrago. Pisces saxatiles aquarum currentium, succus mali punici, aurâtij, limonis, cydonij, oxalidis, omphacis, & acetum. Vinum oligophorum concedit Trall. si vires non sint satis robustæ. Vinum vnicum subsidium est, ne in vaporem homo dissoluatur, vt inquit Areteus, aqua frigida tuta non est, sed tepida vtendum.

Vinum.

nota.

Auertunt sanguinis missio ex humerali, sed modica ne bilis furiat. Auertunt & ficyæ ceruicibus affixæ, frictiones artuum & partium inferiorum, ligaturæq; dolorificæ. De cholagogis clemens est syrpus rosatus ex nouem infusionibus cum diluto rhabarbari & manna, vel cum diapruno. Valentiora

tiora sunt electarium rosatum M. vel de succo rosarum Nicol. Clysmi molles plus conducunt quam acres, nam hi hepar infirmant.

Repellunt frigida astringentia, vti est oxyrhodinum syncephiti & fronti illitum. Ranæ viuæ vertici impositæ, epithemata ad caput ex succo plantaginis, solani, semperuiui cum rosaceo, quæ admota mutanda sunt ante quam incaluerint. Cum his olfaciat aquam rosaceam camphorata, bibat serapia frigida modicè astringentia, veluti sunt syrupus rosatus simplex, syrupus de granatis, aut de limonibus vel de acore citri. Sed ambigitur, an frigida topica imponenda sunt? Nicolaus vult tepida, quia frigiditas densat meatus, & sic materiam discuti non permittit. Caliditas etiam nocens est, quia addit ad feruorem. Verum si actus medicamenti potentia proportionatus esse debeat, vt vult Galen. frigida adapplicanda sunt.

Ad insomniam. Capitis lauacrum peruigilij & delirij remedium, apud Hippo. Balneum etiam commendat Trall. ob siccitatem & vigilias. Itaque oportet sopire & stupefacere principem facultatem. Et in augmento confert gallos vel columbos, per dorsum incisos, & farina albi papaueris, vel seminis alterci albi conspersos, capiti raso imponere. Præterea mirè somnum prouocat spuma quæ supernatat sero lactis ebuliente, capiti raso illita.

Epith. optim.

An Topica sint applicanda.

In princip. applicandum.

Quid in augm.

Spuma sero supernatans.

Diacodion non solum vigiliis sed etiam febris medetur. Insalubre tamen est in spuria phrenitide, maximeque si vires infirmæ sint. In extremis vigiliis & vnguenti populei ℥.j. violarum ℥.j. ꝑ. seminis alterci albi, corticis mandragoræ añ. 3. j. opij grana sex, croci 3. ꝑ. aceti momentum. fiat linimentum, ex quo illine tempora, nares, pulsus brachiorum & pedum.

De delirio.

CAP. XVII.

Delirium est actio læsa virtutis animalis, videlicet deprauatio imaginationis, cogitationis vel memoriæ. Indeque delirii tres species. Aut enim imaginatrix potentia læsa est, seruata illæsa ratione. Aut ratio tantum patitur, salua imaginatione. Aut imaginatio simul & ratio læduntur. Stultitia autem delirium non est, sed abolitio imaginationis vel cogitationis, vt abolitio memoriæ obliuio dicitur.

Causa ex natura, allium, cepa, fabæ, hæ si quidem à proprietate quadam cogitativam destruunt, vt testantur Auenzoar & Auerrho. faba, inquit Plin. hebetare sensus existimata, insomnia quoque facere, subaudi tristitia & turbulenta, ob hoc Pythagoricâ sententiâ damnata. Hyoscyamum potum aut comesum ab alienationem mouet. Dio. similem vim lolium habet, & coriandrum, solanum somnifer

niferum, crocus, edera, & onyx gestatus. Item leuibus de causis homini turbulento deliria accidunt. Contigit etiam delirium ex timore, & ex retentis mensibus apud Hippo. Deliria omnia patiente fiunt cerebro siue per se, & proprio affectu, siue consortij lege: læditur autem vel ob inflammationem, vel ob humorum biliosorum redundantiam. Desipientiæ etiam sequuntur acres excandescantias, & bilem amarā in stomacho vel cerebro consistentem. Desipientiæ temporariæ possunt oriri ex prædictis cibis, ex carbonū fumo, ex vini potione, vel ex domo calcis retinente qualitatem. Perturbatio intellectus accidit ex diminutione propriæ substantiæ cerebri, sicut senibus, & illis a quibus frequens sanguinis missio fit. Zoar.

Digno. delirium agnoscitur dum Aegri nihil sanum aut dicunt, aut faciunt, delirantium spiritus magnus simul & rarus. Desipientiam præcedere solet vigilia, & magna simul & rara spiratio. Oculi etiam ferocitas delirium portendit.

Præfag. facile illi in nigram desipientiam incidunt, quorū temperatura cordis calida siccaq; est, & cerebri humida. In his enim bilis flaua in iuuentate augetur, quæ in consistentia vritur. Adde quòd frigida ac humida cerebri dyscrasia in lapsu ætatis maior fit, eoq; cerebrum magis imbecillum redditur, sicq; facile vapores recipit nigros. Delirium

Asara

Afarauio est symptoma hereditarium. Deliria cum ficitate difficillima. Desipientia nulla secura. Minus periculosa quæ cum risu fiunt, omnium periculosissima quæ fiunt serio. Vrina alba & transparens delirantibus lethale signum. Vrina residentiā multam habens à desipientia liberat. Vbi somnus delirium sedat, bonum. A profluuio sanguinis desipientia & conuulsio malum. Ergo deliriū aliquando fit ex defectu.

Metho. m. est causarum efficientium abolitio, & capitis roboratio. Primum efficiunt cholagoga & melanogoga. de quibus puluis optimus est, qui recipit, rhabarbar. 3. j. mast. spice añ. 3. j. diacredi grana v. candi 3. j. senæ, polypo. epithy. añ. 3. ij. da 3. ij. ante cœnā semel in hebdomada. Aliud. epit. 3. s. lap. lazuli præparati agarici añ. 3. ij. scamo. 3. j. gary. nostro. xx. f. pul. da omni septimana 3. ij. Platearius laudat vsum myrobol. conditorum, in omni mentis alienatione.

Pul. benedic-
tus à Pascha-
lio nuncu-
patus
numero

De mania.

CAP. XVIII.

MEntis alienatio duplici specie insigni cōstat, hanc Græci *μανία*, id est, insaniā, illam *μελαγχολία*, id est, atram bilē appellant. Est autem mania delirium sine febrī, in quo imaginatio præcipuè læditur, sicut ratio in melancholia.

Causa

Causa externa, morsus rabidi canis, vinum fulmine gelatum & potum. Menses primi in potu sumpti. Aelini cerebrum comestum, vesicariæ alterum genus, apud Theophra. Mania ab ebrietate apud Aet. Item quæ mentem commouent, vt coriandrum, oreoselinum, altercum, solanum, mandragoras. Interna est calida cerebri dyscrafia, succiq; mordaces, flaua bilis assa, in cerebri corpore abundans ferina inducit deliramenta.

Digno. desipiētię ferinę sunt, in quibus ægri calcitrant, pedibus feriunt, mordicus impetunt, & ex-candescunt, eos qui ingrediuntur seu hostes existimātes. Qui tali vitio laborant, sunt, vt ait Herodotus, tumultuosi, præcipites, manu prompti, contumeliosi; fiunt.

Præfag. Mania accidit pluribus animalibus transferturq; ab vno ad aliud & eiusdem & alterius speciei, Zoar. & Aphrod. Philosophi mania obnoxij, primo passionarij. Varices soluunt mania. 6. aph. A furore dysenteria, hydrops vel mentis alienatio, bonum. 7. apho. Ex insania gibbus. 5. epi.

Metho. m. consistit in causarum abolitione, & in capitis confirmatione.

De remediis primum est victus ratio causis contraria, in qua maior intentio esse debet in humectando, nam maius vitium est siccitatis quàm ardoris. Musica animum recreat, & mores componit.

Achil

Achilles iram lyra mulcebat. Empedocles furibundum adolescentem cantu pacatū mansuetumque reddidit. Cleomenes Anaxandridæ filius, quum ei probro daretur violata iurisiurandi fides, præ dolore in dementiam versus, sibi corpus gladio fodit: sed noster fraterculus à suo cœnobio fugitiuus non sibi vitio vertit, quod dolosus, perfidus, ingratus, periurusque sit, nam fucata sanctimonia seu insigni hypocrisis sua tegere vitia molitur, quamuis à permultis iam cognitus sit, etiam pro stellione, & scarabeo.

Apparantia materiam sunt syrupus de lupulis, de fumaria, de pomis simpl. syr. de succo buglo. de nenuffare, violatus. syr. de cucurbita, cum aquis scariolæ, lactucæ, violarum, endiuia. Ab his purganda materia est cholagogis cum melanogogis, uti sunt diacatholicum, diamana, diasenæ, diasebestē, decoctum epithymij M. electarium de epithymo Mont. electario Auicen. ℞. lapil. lazuli præparati ℥.ij. lap. armeni imparati ℥.℥. aq. buglossæ ℥.ij. ex vino albo f. potio. ℞. myro. indarum emblic. añ. 3. j. senæ polypo. añ. 3. j. lap. lax. & armeni impar. añ. ℥. iiij. croci violarum nenuff. se. acetosæ añ. ℥.℥. candi 3. j. cum succo ros. f. maffa. ex qua f. pil. iiij. quas molles sumat, huc refer pil. indas, de lap. laz. & armenico, syr. de elleboro. ℞. sy. rosati cathartici ℥.iiij. diasenæ 3. iiij. electuarij de psyllio M. 3. ij. cum decocto

sto senæ myro.indarum liq.passul. tamarind.flo-
rum trium f.potio.

Ad sanguinem purgandum ab vtraque bile, &
noxiis humoribus pollēt syr.ros.lax.infusum aquæ
casei,infusum succi herbarū,decoctio capil.vener-
ris,decoctio fumarix, decoctio myrobal.decoctio
epithy. M.

Dum Aeger vtitur serapiis confert sanguifugas
hæmorrhoidibus admouere.

A purgatione embrocha ex humectantibus, re-
frigerantibus & somniferis admouenda est coro-
nali,per mediam horam,postea deterfo capite illi-
nre confert coronalem vnguento populeo. Illitio
capitis rasi ex adipe scrophæ curat phrenitidem &
maniam.Catulos scissos capiti adhibere confert,&
sicyas scapulis cum scarificatione.

De purgantibus etiam optima sunt subteriora.
℞.myrob. indarum ℥.j.elleb.nig.3.j.senæ epithy.
añ.℥.℥.f.decoctio colata ad ℥.iiij.cui adde mānæ
& cassiæ añ. ℥.℥. detur in aurora. Aliud. ℞.poly-
pod.3.v.senæ ℥.j.myrobol.indarum 3.x. tamarin-
dorum ℥.℥.passul.℥.j.℥.f.decoctio ad consump.
duarum partium, adde epithymi 3.x. dosis ℥.iiij.
cum syrupo vel zucaro. Aliud.myro.indarū ℥.j.℥.
senæ epithy.añ.℥.℥.pruna xij.f.decoctio colata ad
lib.℥.adde mannæ syru.viol.añ. ℥.j. Vel r.diasene
diacathol.añ.℥.℥. confec. hamec 3.ij. cum aqua
fuma

fumariæ f. potio. Ad insaniam multum pollet succus ellebori nigri ciceris magnitudine, si detur hora vna post cœnam. Idem præstat syr. de elleboro Amati. pil. de elleboro, & decoctum eius, & conditum de liquir. Saly. Confectio alkelmes M. siue antidotus è lapide radiante, antid. è sēna potum. antid. acharistos, antid. stotericos, altera cyphi. hæc illita fronti noxios spiritus & feras depellit & auertit. Theodoretus. anacardios dæmonio vexatis prodest, vt affirmat Myrepsius, huc pertinet memphitum Nicol. Mus assus & comestus sanat maniacos. T. P. vtatur vino buglossato, vel borraginato. Aliud salubre. macerentur in vino mustaceo aut nouello radices buglossi recentes mundatæ à meditullio, cum floribus borra. & buglo. been albi & rubei.

Amuleta. Maniacum iuuat dens equi capiti appositus, & lapis lazuli gestatus. Alb. Chelidonium rufus in pāno ligatus, & sub sinistra ala detentus lunaticos curat. Dio. & Gilib. Adamas sinistro lacerato alligatus insanos curat. In hoc etiā valet Chrysolithus. Annulusq; ex asini vngula pedis dextri anterioris, gestatus, sanat maniacos. Aeger ferat radicem eryngij vel bryoniæ, vel rad. hypericon.

Corroborantia cor, cerebrum & reliquas partes sunt balnea humectantia, Embroce ad caput cum oleo rosato, nenuffaris & modico aceto. Phœnigmi

gmi sinapismi ve, in humeris vel ceruice admoti. Cauterium calidum vel frigidum in vertice, vel in colli fontanela vocata. Phlebotomia ex saphea. R. conferuæ violarum, bor. bugl. añ. ℥. j. conferuæ nuff. ℥. ij. senæ ℥. s. cum syru. de pomis f. mixtura deaurata, sumat de ea semel in die. Aliud. conferuæ rad. buglo. ℥. iij. conferuæ rosarum ℥. ij. conferuæ bor. ℥. j. pul. diamarg. frig. 3. iij. hyacinthorū marg. añ. 3. s. f. conditum. adde folia auri x. & corticis citri conditi ℥. s.

Insuper ad maniam confert rasura cornu Rincerotis. Cinis testudinis vstæ potus, omnem mentis insaniam curat. Caro phocæ comesta demoniacos sanat, benefacit & peoniæ semen suffitum, vnguētum cynarium ad Maniacos. N. Alex. oleum gagatæ.

De melancholia.

CAP. XIX.

MΕΛΑΥΧΟΛΙΑ est delirium sine febris, nempe deprauata actio vel imaginatricis vel cogitatiuæ facultatis. Eoq; vt hominum, sic brutorum passio esse potest. Neque hi tantum melancholici vocantur, qui atram excernunt, sed qui in solidis iam membris talem structuram retinent, vt placet Aetio. Differentiæ ab imaginum varietate sunt innumerabiles. Quæ verò ducuntur à causa interna tres tantum numerantur,

To. i. Lib. i.

f tur,

tur, prima cum totum corpus melancholico sanguine redundat. Altera quando huiusmodi sanguis ipsum duntaxat cerebrum occupat. Tertia cum hypochondria ita prius affecta, tacito quodam consensu cerebrum in eundem affectum trahunt, hæc species à Damasceno vocatur *φυσώδης καὶ ὑποχονδριακή*, id est, flatuosa & hypochondriaca.

Causa. nascitur ab atra bile, humore frigido & turbido. Vnde fiunt tenebriones ac lucifugæ, tristesq; apparent, de omnibus suspitiosi, hominum consuetudinem oderunt, solitudinibus gaudent, ceu Bellerophontes à poëta describitur.

Ἦτοι ὁ καπτωδὶον τὸ ἀλγίον οἶος ἀλᾶτο

Ὃν θυμὸν κατ' ἐδῶν πᾶτον ἀνθρώπων ἀλεείνων. id est,

Qui miser in campis mœrens errabat Aleis

Ipsæ suum cor edens, hominum vestigia vitans.

Quidam ob vomitum acrius cōcitantia visi sunt melancholia capi. Huc pertinent cibi melancholici, & veneni haustus. Homines ex tristitia & mœrore laborantes, de potestate animi exeunt, vt scribit Aelianns. Timor & mœstitia non minus atræ bilis causa sunt, quàm signum, quoniam illis affectibus perseuerantibus sanguis & spiritus contaminantur, & bilis atra inducitur. Causa antecedens crasis atrabilaria, si animi mores corporis temperiem sequantur, iuxta illud Damasceni, temperatura corporis animi affectibus semper cohæret. Aetas

tas 25. annorum, vsque ad 45. annum ex omnibus ætatibus maximè atra bile detinetur. Si hepar sit calidum & siccum, consistente ætate atra bilis plurima. Rubicundi & qui fului sunt, repente in crasin melancholicam deueniunt. Vis cogitandi læsa est his, qui nimis magna aut parua capita habent. Causa propinqua humores, nam sanguinis varietas mentem variat, vt docet Hippo. lib. de flatibus, Plato in Timæo, Arist. 2. de par. animal. Humores corporis mutati, immutant animæ actionē, vt animæ actio mutata humores mutat. Causa immediata cerebri dyscrasia frigida & sicca, & succi atrabiles.

Digno. animi cogitatio perpendenda, nam si timor & mœstitia longo tempore tenet, atra bilis in vitio est. Celsus addit vigiliam. Obscuritas quatenus ab hoc humore dependet, in cerebrum induta, timorē facit, nec à Galeno dissentit Auerrh. & hoc symptoma ad atræ bilis ἰδίοτης ὁππίας referri debet, nam in tenebris etiam fani timent, non ob atram bilem, sed quia destituti optimo duce, id est, visione.

Prælag. In calidis siccisq; naturis atra bilis plenior qui vtraque bile redundant insomnes sunt. In ore ventris si colligitur atra bilis morosi tristes ac formidabiles fiunt, & sine siti, saliuâq; plurima illis scatet. Nonnulli illorum videntur famelici, in

f 2

quib

quibus, scilicet, atra bilis acida & malignior est red-
 dita. Biliosum & sanguineum corpus melancholi-
 cum fit, vbi non habuerit effluxum. 6. epi. ^{nam} vt
 suppressio effluuij vaporosi & benigni inducit ple-
 thoram, sic acris suppressio non solum melanco-
 liam, sed febrem etiã committit, huiusmodi efflu-
 uium acre in his cõsistit, qui sunt malis humoribus
 pleni. Atrabilarij sunt blesus, caluus, vocis exilis, pi-
 losus valde. 2. epi. sceminis atrẽ bilis vitia non fiunt.
 2. de præd. Galenus fuit melancholicus, si cre-
 dimus Mosi. 25. apho. Certè qui ingenio clarue-
 runt omnes melancholicos fuisse testis est Ari.
 30. probl. 1. innuens eos excellere ingeniis, quo-
 rum crasis est temperata, sed declinans ad melan-
 choliam, qualem efficit Saturni & Iouis cõiunctio,
 vt autumãt Astrologi & Pontanus lib. de re cælesti,
 ex quo liquet quod atra bilis naturalis est quẽ præ-
 stantiores motus in ingeniis efficit, & non adusta,
 vt existimat Aponensis. Melancholici comitiales
 fieri consueuerunt. Comitialesq; melancholici. 6.
 epi. Qui ad libidinem melancholici proni sunt, his
 venter plerunque inflatur, inibi, nam desiderium
 coitus illis non accidit à copia vel à qualitate femi-
 nis, sed à multo flatu. In morbis melancholicis ma-
 teriam ad oculos, neruos, vel cerebrum decumbe-
 re periculosum. 6. apho. 56.

Metho. m. in abolitione causarum consistit. In
 redun

redundantia sanguinis melancholici sanguinem mittere, vtile est. Si sanguis fluens melancholicus non apparet, statim supprimendus est, quoniam succi melancholici malitia, à sanguinis bonitate corrigitur. Galenus ex vena cubiti media sanguinē atrabilarium vacuare iubet. Arabes contra ex humeraria. Sed melior Salyce ti opinio, qui si mitti sanguis debet, feriēda, inquit, est saphea, quoniam atrabilaris sanguis crassus grauisq; est, eoq; facile descendit. Hinc est quod varices melancholiam solunt.

Melancholici affectus inhibēdi sunt melanogogis validè purgantibus. his etiam curandi sunt, si præsentium & futurorum morborum vna cōmunisq; sit ratio medendi: sed melanogogis commiscenda sunt quæ leniendo purgant, vti sunt pruna, thamarindi, manna medulla calami dulcis, violæ. Item purgare oportet non semel tantum, sed sæpius. Obseruandæ sunt melancholicorum phantasæ, quæ subuertendæ sunt placidè, & non damnandæ, ne prouocati respuant medētibus obedire. huc refer prudentiā Tralliani & Philotimi. Præterea in horū curatione naturæ quies condonāda, nā plerique hoc morbo infestati, quo tempore curabantur, nihil profecisse visi sunt, & sibi dimissos conualuisse, quia rectè prius tractati, postea vires aduersus morbum acceperunt, purgatio sanguinis

missionem præcedere debet.

Remedia, melācholiā recentē victus ratio humida & boni succi sanat, nam confirmata egrè admodum sanatur. Primū decumbant & versentur in loco lucido, rebus odoris consperso, sitq; victus ratio humectans & temperata potius quā calida. Confert vsus lactis continuus, & carnes pullo- rum, gallinarum & turturum mirabili proprietate iuuant, caro pulli accipitris & noctuæ cum succo maioranæ coctæ sanant melancholiā & cordis palpitationem, si credimus Mosi. Carnes veruecis vtilissimas esse aiunt Ali. & Azaranius, & carnem lupinam commendat Razes. Quantitas assumen- dorum moderata sit, & vitare oportet ne nimio potu cibus in ventriculo fluctuet. Galeno placet vt aceti acidissimi cochlear vnum post cœnam sorbeant, quum dormitum vadunt, & eo inter co- medendum obsonia intingat: & Hippocrati recla- mat Massaria, quod acetum atram bilem pariat. Absinthij decoctum laudat Gale. ad flatum & ven- tris concoctionem.

Quando melācholia accidit homini cuius suc- ci boni sunt, non competit catharticum, vt dicit Razes, qui etiam narrat verbis beneuolis quosdam seruatos, & plures, inquit Trallianus, sanati sunt quū vidissent, audiuisentq; ea, quæ consequi desi- derabant: talibus ergo blandiendum. Alij iurgandi verber

verberandiq; sunt & ligandi, ne sibi aut aliis manus violentas inferant. Hinc verum apparet quod ait Menander,

Sermo enim est trīstitiæ remedium solus.

Trīstitiā enim beneuolus sit medicari sermo.

Sermo medicus est, quæ est in animo passionis.

Animi ægrotantis est medicina sermo.

Maximum est iræ remedium sermo.

Sciendum insuper quòd sicut temperies calida & humida temperaturæ spiritui conueniens est. Ita illi contraria est frigida & sicca, & huiusmodi cerebri dyscrasia cōuertit sanguinem ad naturam melancholicam. Itaque à dyscrasia frigida & sicca cerebri, sanguis in eo fit melancholicus nō per adustionem, sed per cōdensationem: Talis humor apparatur syrupo de liquiritia cum syrupo de pomis. Sanguis cordis quum purus est, & clarus, lætificat, & resistit corruptioni cerebri, vt loquitur Auicē. proinde in melancholia cor corroborandum est, per assumenda & admota, salubris est confectio de hyacintho.

Melancholia secundum Auicē. non fit à Dæmonio, sed ab atra bile, ex qua spiritus permutatur ad naturam melancholicam. Sunt tamen qui credunt quòd melancholia efficitur à re non corporali, vt Asaranius & Agrado, quia nonnulli Melancholici doctè loquuntur de sciētīis, quas fani ignorabant.

rabant. Et huius euentus causam reddere mollitur Guainerius. Accedit huc quod multi sanantur sermone, qui eorum phantasmata destruit. Itaq; mulier quædam sanata fuit, ex aduentu mariti, cuius desiderio in melancholiam inciderat.

Apparantia atrabilarium succum sy. de lupulis, de fumaria, de buglossa, rosatus simplex, violatus sy. de pomis, sy. Sapor. de duabus radicibus, de eupatorio, de corticibus citri & de succo eius, cum aquis buglossæ borraginis, melissæ, cuscutæ, ceterac, scolopendriæ calendulæ.

De purgantibus sunt aloe, epithymus, polypodium, senna, aqua lactis M. Ius galli cum polypodio & epithymo, diacatholicum, diasene, confectio hamec, secaniabim hieralogodium Ruffi, pil. inde, pil. de lapide armeno, pil. lucis. pil. sebeliæ, syrupus de elleboro, myrobolani indæ.

Roborant cor & cerebrum diamoschus dul. zuchorum buglossatum & borraginatum lætificans Rasis. puluis ad idē. R. rasuræ eboris spodij de canna añ. 3. j. hyacinthorū 3. j. S. coralli rub. serici crudi añ. 3. ij. ofsis cordis ceruini 3. j. cinamomi margaritarum añ. 3. ij. zuc. rosati solidi 3. ij. S. folia aurix. sumat ieiunus cochlear vnum, cum serapiis vel aqua buglossi. R. conseruæ viol. bor. buglo. añ. 3. ij. frag. sapphiri hyacinthi smaragdi añ. 3. j. doronici, ofsis de corde cerui, spodij. añ. 3. S. zedoariæ moschi

ſchi ambari añ. gr. iiii. cinamomi gary. añ. gr. v. cum
 yrupo myrob. kebularum f. elect. ſub forma opia-
 æ, addēdo zucari ℥. ij. marg. 3. ij. folia auri x. Aliud
 quod omnes vires firmat, atque fortificat, recipit
 trobilos recentes decorticatos cum carne perdi-
 cis aſſa vel elixa, piſtis addatur pul. ſequens, been
 ulbi florum bor. & buglo. zedoarię añ. 3. j. croci 3. j.
 macis 3. ℥. hyacin. ſmaragdi, ſapphiri, oſſis de cor-
 de cerui añ. 3. ℥. marg. 3. j. fol. auri xij. f. electariū in
 morſelis. ℞. epithy. rec. ſene, florum bor. añ. 3. j. ci-
 namomi 3. ij. ℥. caſſiæ ſpicę macis cardamomi añ.
 3. ℥. zinzi. gar. ſe. aniſi añ. 3. j. cum vino tenui f. ne-
 ctar. doſis cyathus vnus mane ſumptus ſanat melā-
 chol. & quartanam, laudatur confectio alkelmes
 cui adiuncta ſint margaritarum 3. j. moſchi 3. ℥.
 folia auri ſex. Ad hypochondricā. ℞. capil. vene-
 ris, buglo. paſſul. añ. m. j. xyloal. ſpicę maſti. añ. 3. ij.
 epithy. polypo. florum bor. añ. 3. ℥. in aq. f. f. deco.
 colata, cui adde ſucci pomorum redolentium lib. j.
 zuc. lib. j. ℥. f. ſyru. aromatizetur cum ambaro.
 Cauterium calidum vel frigidum in vertice adhi-
 bitum vtiliſſimum eſſe aſtruit Guainerius, poſt ve-
 teres & Salycetum.

Ad melācholiā hypochondricā potio My-
 rep. ℞. myrobol. omnium exceptis flauis añ. 3. ℥.
 polypodij rec. epithymi boni, ſtecadis añ. exāgium
 vnum. ℥. zucari q. f. datur veſperi ſemiuncia.

exagium pende
 diiij.

f 5

Ad

Ad melancholiam myrachiam. ℞. florum & radicū buglossæ recentium añ. m. j. polypodij rec. lib. ℥. ciperi, capparis, acori, asari añ. ℥. j. fenæ, epithymi añ. ℥. ℥. sc. lactucæ, scariolæ, endiuixæ, añ. ℥. iij. buliant in lib. iij. aquæ ad consumptionem medietatis. Colaturæ adde mellis rosati collati lib. j. dosis ℥. iij. cum melle rosaceo, & decocto epithymi, valet ad omnem speciem melancholiæ. Aliud. myrobolanorum indarum contusarum ℥. j. ℥. prunorum damasc. ℥. ij. aquæ lib. ℥. fiat decoctio colata ad ℥. iij. cum mannæ drachmis x. & fiat potio.

De stultitia.

C A P. X X.

Stultitia est intellectus amissio, nam ubi simul cum memoria ratioque omnino deperditur, talis affectio stultitia vocatur. 3. de loc. aff. Itaque stultitia non est delirium, sed abolitio imaginationis vel cogitationis: perit enim functio in stultitia & obliuione.

Causa. stultitia & obliuio à frigore oriuntur. 2. de ca. sy. puro videlicet vel cum siccitate, frigus sine humore memoriæ nocet, & stultitiam inducit, stultitiam cicuta propinata conciliat. Contingit ab offensa in medio cerebri ventriculo, qui ceteris dignior est, ut pote sedes cogitativæ & æstimativæ facultatis.

Dignostica ex stultiloquio, fatuisq; moribus, ac
insulsis

insulsis, deprehenditur absque febris.

Prælag. vbi ratio læditur, sæpenumero contingit ædi memoriam, & è conuerso.

Metho. m. somnos obseruare oportet, an excernant aliquid vel è naribus vel ab ore, quod à capite defluat. An aridæ huiusmodi partes sint. Multa circa cerebrum vitia, ab extrinsecus applicatorum remediorum facultate, iuuantur. In summa cerebrum calfacere necessariū est. Id fieri poterit subterioribus remediis. Rosarius laudat errhinum ex succo cōsolidę cum hydromelite, & vinum in quo macerata sint abrotanum, saluia, follequium, per xv. dies potum, & cinerem testudinis omnem dimentiam curare dicit, & aduersus omnia mentis vitia pollere. Idem præstat semen brusci pistum & potum ieiuno stomacho. Et confirmato morbo, raso capiti imponere iubet, quæ materiam in cerebro contentam digerunt, & caput roborant, vt gallus calēs scissus, catuli, & id genus alia, huc pertinet capitis lotio. Varignanæ. embrocha Guainerij. Alia, ex aqua vite extillata cum roremarino, melissa, sampsucho, cynoglossa, & radicibus buglossę, & id genus cæteris. Laudatur etiam pedum ablutio ex decocto florum camo. meliloti, anthos, melissæ, foliorum lauri, &c. Huic affectioni ratio victus quæ melancholicis præscribitur conueniēs est, vt sunt de vinis buglossatum, borraginatum, de rorem

roremarino, cerebrum gallinarum assum vel elix-
 xum vtile est cerebro, & sensus internos roborat.
 Ad idem pollet xyloaloes sumptum. Herba paris
 sumpta curat dementes & fatuos à præcedentibus
 morbis factos. Idem pollet semen cataputiæ mi-
 noris potum. Sardus. ℞. mosci 3. ℥. cardamomi liq.
 gary. zinz. añ. 3. v. cinamomi 3. ij. xyloal. 3. j. croci 3.
 j. ℥. piperis longi 3. iij. f. pul. & cum zucaro soluto
 ex aqua buglo. f. electarium, sumat instar castaneæ
 mane & vesperi. Aliud. zinz. 3. ij. galangæ. 3. iij. nu-
 cismo. corallij, ofsis cordis ceruini, marg. añ. 3. j.
 gary. 3. j. macis spicæ, croci añ. 3. ℥. cinamomi 3.
 ℥. liq. 3. ℥. f. pul. & cum zucaro soluto f. electariū,
 vltimum remedium est cauterium in vertice ad-
 applicatum.

Appendix de his quæ intellectum, ingenium,
 rationem, & sensus acuunt. Aloe, xyloaloes, amba-
 rum, cyperi, carnes colubri, caro turturis & galli-
 næ sinapium, rasanus, nasturciū, Myrobalani che-
 buli, & emblici, & reliqui omnes, diaromaticum
 viatici, pliris arcoticum Nicol. diambra, confectio
 de moscho. Anacardinū, fatuitatis curatio, inquit
 Actius, consimilis est ei, quæ ad comitiales relata
 est, per calefactoria auxilia. Sambuci oleū corro-
 borat sensus, teste Auicen. videlicet capiti illitum.

Amuleta. Amethystus lapis, Berillus, Chrysolithus,
 Gerachides, hyacinthus, ex Alberto.

De

De obliuione, seu oblita memoria.

CAP. XXI.

MEmoriæ offensam ad præcipuam animæ potentiam refert Galen. interdum etiam ad imaginatiuam. Nam qui per metum aut ebrietatem aliquid egerunt, nihil eorum quæ egerint dum in illis cōstitutionibus erāt, recordantur, quod non intenti actionibus tota mente fuerint. Imaginatiua enim hæc eadem recordari videtur. Si itaque insignes impressiones rerum in imaginationibus acceperint, cōseruet perpetuò, idq; est memoria tenere, sin obscuras & penitus superficiarias, non cōseruat, & hoc est obliuisci. Ob hanc causam in ira, curis, & omnino in vehemētibus animi affectibus, nullius eorum quæ egerint in posterum amplius meminerunt, fanè meditationes reminiscendo memoriam tuentur, & saluant. Sunt itaq; facultates quæ ad animi principem vim spectant, ad omnes artes pernecessariæ, quarum altera cognoscimus quid consequens, quidq; repugnās est. Altera verò memores sumus. A prima id habemus vt sapientes sumus, à secunda vt magis memores. Eam tamen naturam hæ facultates habēt, vt per exercitationes vires indipiscantur, & crescant, otio languescant ac minuantur, nā vsus robur addit, vt ait Hippo. otiū cōtra dissoluit. Est igitur memoria eius partis animæ potissimum, cuius

cuius est phantasia. Vnde hac carentia animalia memoria prædita non sunt. Nihilq; aliud est memoria quàm eorū quæ quis didicit cōseruatio. At reminiscencia præsupponit memoriam, nam reminisci est obliuioni tradita recordari, quod opportunissimè fit, à circumstantiis personæ, temporis & loci.

Porro memoria læditur in sanis vel ægrotantibus, aut in his, quorum iam finiti sunt morbi. Nam quosdam à pestilentia seruatos, omnium quæ ante nouerant fuisse oblitos commemorat Thucydides lib. 2. & Lucretius 6. de nat. rerum. Insuper memoria offenditur non solùm cum læsa ratione, sed etiā cum illæsa. Interdum cum feбри, vt in lethargo, nōnunquam citra febrim.

Causa. A frigore nascitur, humiditas & frigiditas cerebri vel meningum obliuionem efficit, quæ si caluam tantùm affecerit, hominem memoria non priuat. Si frigiditas sit cum cerebri humiditate, non seruatur quod impressum est. Si cum siccitate, non imprimitur rerū species in cerebro. Obliuio igitur fluidam cerebri substātiā indicat. Memoria autem stabilem ac firmam. Demum metu facilè intercipitur memoria, & capitis ictu, vt ait Solinus, atque infanti ætate, ac senio.

Digno. vt vincentem inuenias intemperiem somnos obseruare oportet, vtrum vehementer, an mod

modicè somnolenti sint, aut omnino non somno-
lenti. Præterea cōsiderandum, an excernant quip-
pam vel ex naribus, vel ex ore, quod à capite de-
luat. An aridæ huiusmodi partes sint.

Præfag. Iracundi memoria præstant, graues ob-
liuione, Plato. Memoria valent qui tardo sunt inge-
nio. Aristot. An quod ingenium subtilem & mollẽ
cerebri substantiam indicat, vt memoria perma-
nentem. 2. ar. p. rationem, fortassis aliam explicat
Veltrichius, cuius non memini. Qui citæ appre-
hensionis sunt, & nimium hebetes, malè memora-
ri ac reminisci consueuerunt. At quæ bona ordi-
natione notata sunt, faciliè memorantur.

Metho. m. est causarum sublatio. Quum igitur
vel perit, vel grauiter læsa est memoria, frigida dys-
crasia est, quare ipsam calfacere oportet. Si verò
dyscrasia copuletur humiditati, arefacere, si aridi-
tati madefacere. Si verò intra has medium obti-
net, ipsam conseruare oportet cerebri tempera-
mentum.

Remedia promiscua, ebrietas obliuionem sa-
nat, quæ sequitur causam frigidam & siccam. Deli-
rium cum læsa memoria hæmorrhagia spontina
sanatur. 2. de motu muscul. Limatura eboris pota
conuenit obliuioni, & cerebrum gallinæ esitatum,
ouaq; perdicis & sinapis. Melissa comesta ante &
post cœnam memoriam confirmat. Aqua ex me-
lissa

liffa contufa cum vino extillata, pota confert me-
 moriæ. Acorus conditus sumptus optimus est, &
 confectio anacardina ex aqua calida pota. Theo-
 doricum anacardinum super omnia valet ad om-
 nes frigidos cerebri morbos. Zinziber conditum
 reparat memoriam. Semen ormini domestici ef-
 mirabile, cōfert & libani granū hora somni deglu-
 titum & Cubebæ commanſæ, & ſemen ormini
 commanſum. ℞. conferuæ anthos meliſſophylli
 añ. ʒ. j. inulæ zinziberis. viridis, añ. ʒ. ʒ. cort. ci-
 tri conditi ʒ. vj. pul. diambæ, diatrium pipe. añ. ʒ.
 ʒ. f. conditum. ℞. ambari ʒ. j. xyloal. ʒ. ʒ. cubebæ
 ʒ. ij. cum mero f. pil. xv. da binas ante cœnam. De
 topicis laudatur fel perdicis arteriis temporum il-
 litum ſemel in menſe. Oleum de caſtoreo & de la-
 teribus occipiti raſo illinuntur, valet ad idem aqua
 ex foliis hederæ ter extillata & illita. ℞. rad. acori,
 rutę, bugloſſæ, linguæ canis, rad. valerianę añ. f. pul.
 cum ſucco eufragiæ, gallitrici, berbenæ, & linguæ
 canis, fiat vnguentum addendo ʒ. j. anacardi. Em-
 plaſtrum de gallia moſchata laudatur à Neoco-
 menſi, & olfacere paſtillum è ladano Mundini, &
 ſacculus ad occiput qui recipit xyloaloes nuc. moſ.
 cyperi maio. anthos meliſſæ añ. ʒ. j. f. pul. conſutus
 in ſerico, in æſtate adde roſas & ſantalos. Benefacit
 capitis lotio, ex lixiuio in quo bulliant hederæ, roſ-
 ma. laurus, meliſſa, betonica & ſtecas, ſampſucusq;,
 Idem

Item ex simili decocto sæpe lauare pedes, & stare pedes post pastum, vtilissimum est.

Amuleta. lingua vpupæ suspensa restituit memoriam & intellectū. Nicolus. Dens Taxi suspēsus in brachio, vel pes sinister cum vnguibus confert obliuioni. Rasis. Annulos ad memoriam & obliuionem in gemmis insculpit Moses, vt memorat Iosephus, & Vincentius in speculo naturali.

De lethargo.

CAP. XXII.

Λήθαργος est vitium phrenitidi contrarium, in quo ratio & memoria pereunt, cum expugnabili penè dormiendi necessitate. sicq; ab obliuione nomen habet, ἀπὸ τῆς λήθης. Non solūm incidit in posteriori parte cerebri, sed etiam in anteriore, vt sentit Gentilis & Graduensis. Vt plurimum fit in meatibus substantiæ, cerebri & vētriculis, & non in meningibus, vt ait Auicen. At iuxta Herodotum in membranis cerebri constituitur.

Causa. refrigeratio fortis mista humiditati, id est, pituita quæ frigore nimio, ac humore cerebrum imbuit, & in somnū impellit. Tumor præter naturam à pituita putri in cerebro cōsistens lethargum efficit: febres enim lethargicæ fiunt, ex humore pituitoso in cerebro aceruato. Verus lethargus ex sola pituita nascitur: Nothus ex eadem cum bile

To. I. Lib. I.

g

mista,

mista, in capite putrescente producitur, vt Tralliano placet. Demorsos à tarantula lethargus occupat.

Digno. obliuio grauis cum cataphora, & febris continua lenta, febris tepida, inquit Galen. accidit in cataphoris & lethargis. Respiratio est inæqualis, tarda ob pituitæ naturam. Rara propter obliuionem. Imbecilla ob musculorū respiratoriorum imbecillitatem, pulsus magnus, languidus, mollis. Vbi deperdito sensu quis conciderit nō accedente motu quod vel conuelli vel salire videatur, id à vehementi frigore ortum habere indicat Gal. quo in genere lethargus continetur. Quosdam tamen lethargo occupatos cum conuulsione, narrat Aetius.

Prælag. lethargus acutus est, & nisi succurritur, celeriter iugulat. Cel. Est morbus acutus. i. r. a. septem diebus lethargicus perit, quos si effugiat sanescit. Hipp. 2. de morb. Neque lethargicus vigilando melior fit, sed per se si melior est, vigilat. Cel. lethargus ex alui fluxu suppresso, apud Trallia. Interdum à phrenitide, & à cōtinenti febris in lethargum deciditur, finiunt parotides lethargos, & reliquos omnes capitis affectus. lethargus sanguinem fluentem è naribus non amat. 3. de crisibus. *Ἐπὶ ληθάργω τρέμος κακός*: qui apho. non extat in nouis versionibus Pusilla vitæ spes huic est, qui per
inferna

inferna multum liquidumq; demittit.

Metho. m. consistit in coctione humoris per se-
rapia incidentia & excafacientia, inq; purgatione,
per clysmos acres. Auerfione materiæ, ne cerebrū
conscendat per frictiones, ligaturas & lotiones ca-
lidas partium inferiorum, per sicias à ceruice de-
scendendo ad scapulas brachia & crura. Item sina-
pismi conferunt, & prouocare menses & hæmor-
rhoidas salubre, huc refer sternutamenta & garga-
rismum. Repellunt à cerebro oxyrhodinum, dein-
de rosaceum cum aceto & momento castorei, &
cinere capillorum, lethargo capilli sunt antiphar-
macum. Nasturcium commansum iuuat. Ratio vi-
ctus sit causis contraria. ℞. aceti scillini ℥.ij. rosacei
℥.j. castorei 3.ij. f. linimentum capiti. ℞. pyrethri
sinapis scillæ añ. 3.ij. castorei, euphorbij añ. 3.ij. cum
succo aphodili & maioranæ fiat epithema pro ce-
rebro curatur musica, eadem ratione, qua demorfi
à tarantula. Inungantur nares & palatum aurea ale-
xandrina vino calido dissoluta. Excitandus est æ-
ger, quò & excernat aliquid & assumat, nunc per
inclamationes, & Stentorea voce, nunc per stre-
pitus, fragores, clangores tubarum, aut ferra de li-
mæ morfū stridente, aut tristi nefrēdium grunntu,
nunc trahentes nasum, & nares fetis fodientes.
Absente plethora sanguinis missio à cephalica,
nec à vena nasi, nec hirundines fronti appositæ, *hirudines*

videntur ex vsu, nam ex sanguinis detractiōe cerebrum & materia in eo contenta refrigerantur, licet cerebrum aëre calidissimo, calidius sit. 8. de vsu. p. R. sotiræ magnæ Auicē. 3. ij. cum aquæ rorisma. 3. ij. sumat in aurora.

24
saturcia.
Vigilias quibus opus, excitat sisymbrium syl. capiti cū aceto infusum. Veteriosis profunt myrob. empelitici sumpti, & rasanus mansus. Ad grauem somnum hædi coagulum fabæ instar per triduum ieiunus bibat ex mero. Galen. Eos excitat thymbra olfactu, aut coronæ modo capiti imposita. Olfactu peucedani veteriosi reuocantur. Adipis Delphini odor & illitio excitat. Idē pollet Asini lichen naribus illitus ex aceto. Confert etiam caprini cornus nidor, aut pilorum. R. rutæ sisymbrij añ. m. j. cū aceto acerrimo & oleo fiat decoctū, quo suffiatur, & illinantur tempora. Idem præstat suffitus ex galbano cum ramentis ceruini cornus, vel capillis vstis. Iuuat sanguis testudinis fronti illitus. Pulmo calens porci capiti raso admouetur. Coque saturciam in aceto, & capiti impone. R. tro. de scamonio M. sine opio, castorei añ. 3. j. cum succo sisymbrij & aceto fiat linimentum. Caput item liniatur castoreo, oleo rosato soluto, si adest febris, vel vntulo quod recipit castorei 3. j. staphis agriæ costi añ. 3. s. aceti 3. j. s. cucumeris syl. 3. ij. terantur simul. ista mixtura illinatur totū caput, quādo it ad lectum.

lectum. Et antè prandium & cœnam per horam & post cœnam fiat fricatio sub lingua cum modico mithridatio antiquo. Nec desunt qui laudant vsum camphoræ cum aceto. Excitant à somno insuper apophlegmatismi ex aurea Alex. vino calido diluta, sinapismi occipiti raso admoti, glâdes & clysmi acres, ptarmicum ex castoreo succo fœniculi diluto. Suffitus ex assa fetida, serapino, & opoponaco, hiera picra pota. Ex sale nitroq; cum aceto extremarum partium defricatio.

Amuleta. somnum arcet vespertilionis caput aridum adalligatum, in panno nigro ad brachium dextrum. Pil. Kir. ferat gemmam hæmatitum. Alb. Oculi & cor philomenæ adalligati arcent somnum. Kir. & Nicol. Item ala dextera Meruli in cubiculo suspensa. Alb.

De soporosis affectibus. CAP. XXIII.

SMnes in cerebro fiunt, & quatenus sopores ac vigilias inducunt, sensus communis symptomata sunt, quatenus verò phantasiam lædunt, principum facultatum symptomata esse censentur. Somnus longus est, qui solum tempore excedit modum naturæ convenientem, & nondum habet expergefactionem difficilem. Grauis sopor est, à quo egrè quis excitatur, huic contrarius somnus tenuis & paruus, &

g 3 effic

²⁴
J. Hernutator

efficitur à putrida tenuitate. Longus à refrigerato cerebro. Grauis à copia, & crassitudine frigide materiæ. Soporis causæ irrigatio cerebri, frigus, irrigatio & frigus, infirmitas virium quæ pulsu cognoscitur. *κῶμα* effertur de somno naturali apud Homerum. Deq; omni cataphoræ differentia, apud Hippocr. Est autem coma seu veternus, delapsus in somnum, quum videlicet quis vigilare nequit. Eius sunt tres differentiæ, profundum coma, somniculosum, & vigilans, easdem differentias de sopore refert Galen. sicq; carum cum comate confundunt interpretes, qui certè differunt. Coma graue est, quum quis profundè diuq; dormit, nec facilè expergisci potest. Coma vigilans dicitur quum quis apertis oculis vigilare non potest, sed etiã si clausis oculis dormire tentet, vigil permanet, nec surgere tamen potest, nec vigilantium munus obire, habetq; deterius quàm si vigilaret, graui enim corpore est. Coma medium vel cum alternis somnis ac vigiliis detinetur, vel in medio exquisitè vigilantium & dormientium statu, constitutus est. Cataphora insomnis duplex, pigra & non pigra.

Causa. ex frigiditate somnus à caliditate vigilia fit. Ex humiditate somnus, ex ariditate vigilia. Et si frigus cum humore vehementer intenditur, fit sopor & stupor, vnde ex varia harum qualitatum cōplicatione, varij incidunt affectus, nam quum frigida ca

da calidis, vel humida siccis, vt si biliosa pituitosis
 misceantur, sopor vigilans oritur, nam vigilantia
 coma iunctum succi mordentis permistione ef-
 ficitur, & interdum à copia sanguinis cum bilis
 permistione.

Prælag. somnus immoderatus est malus vt si-
 gnum, quia ostendit materiæ multitudinem, & vi-
 rium imbecillitatem, vt causa, quia multitudinem
 auct. Vigilia immoderata mala est vt signum, quia
 siccitatem arguit: vt causa, quia illam intendit. Ca-
 taphora somnolenta propria est lethargicorum.
 Vigil autē aliquando adest phreniticis. In omnibus
 soporosis affectibus ratio, & memoria pereunt.
 Nunquam coma bonum, nedum carus, sæpius vi-
 detur in acutis morbis, & in febrium accessioni-
 bus, sed sopore finito bona valetudo magna ex
 parte subsequi solet, quo termino etiam differt ab
 apoplexia.

De caro seu carosi.

CAP. XXIIII.

Est somnus longus profundus ægreq;
 excitabilis, duplexq; est non morbosus,
 vt à causa non morbosa, vt qui ex vino
 fit epoto, hic in ægris qui diu vigiles per-
 manserunt superueniens, nocte dieq; perseverans
 magnum affert auxilium. In infantibus quoque su-
 perueniens, non vno die solum, sed duobus ex or-

dine diebus sæpius magno fuit commodo. Morbosus à causa sic appellari videtur, & sub se coma & cathaphoram cōtinet, nam vbi Aeger tum motu tum sensu tempore aliquo priuatur, etiam si stimules vel ferias vel inclames carum vocant. Etsi autem caro proxima sit cataphora, tum quod eandem cerebri partem occupant, tum quòd imaginationis sit symptoma, tum quòd ab eisdem fit causis, differunt tamen, quia cataphora lenior est affectus, & à mitioribus causis genitus. In eaq; imago deleta non est, vt in caro, sed tantum imbecillitata. Carus enim est passio anterioris partis cerebri, per quam supremus ipsius venter afficitur: vnde sensus & motus perditur, & cogitandi actio vitatur, citra tamen noxam spirandi facultatis, qua sola differt ab apoplexia.

Fit à causa externa vt esu fungorum, vel à frigidis potestate venenis vt opio, mandragora, alterco, cicuta largiùs sumptis, fit etiam musculis temporum affectis, sed vehementer percussis. Inter perforandum quum quis membranam violauerit, sopor accidere solet. Et si os caluariæ attritum ventriculos comprimatur, maximeq; medium sopor superuenire solet. Quinetiam ad vehementes dolores sopor sequitur, concidente videlicet robore spiritus animalis. Quoniam huius vitij causæ plures numerantur, non facile propria causa deprehenditur, quam

Observatio.

quam vt assequaris exacta distinctione opus est,
multa etiam prudentia, & exercitatio.

De catocho seu catoche. CAP. XXV.

Catochos est sopor vigilans, cuius tres species, somniculosa cui lethargus inest. Altera vigilans, huic adest tetanus. Tertia fit ex mistione catochi & phrenitidis. Nam quum vigilare ægri apertis oculis non valent, sed conuiuent spe somni conciliandi, & vigiles tamen manent, vocitamus hunc affectum vigilantem soporem.

Causa explicata in superioribus est, quum pituitosus humor biliosusq; abundauerit, quorum ille somnum, hic vigilias facit, ex quibus fit mixtum quoddam temperamentum. Catochæ cum exolutione prauæ. Curatur vt carus. 1 3. ther. ergo differt à catalepsi, quod videtur contra Aetium & Aeginetam, qui vtrunque affectum cōfundunt. Typhomania etiam curatur vt catoche, vel saltem curatione mista ex cholagogis & phlegmagogis, est enim passio permista ex lethargo & phrenitide.

*De catalepsi, quæ & aphonia, anaudiaq;
dicitur.* CAP. XXVI.

Catalepsis, id est, occupatio, congelatio' ve, affectus cerebri est, in quo palpebræ ma-

g s nent

Sopor vigilans

nent apertè, nec palpebrant, & infixa ac immobili-
 lis stat intentio luminum, hac qui corripitur, in illo
 permanet habitu quo correptus, stans scilicet vel
 sedens, clausis oculis, vel apertis, quia rigidi fiunt
 nerui, & frigido sicco velut concreti, ob id spiritus
 animalis à neruis in cerebrum non reuocatur, eoq;
 fit vt somnus in hoc affectu nullus sit. Itaque me-
 moriam, mentem, & iudicium illigat, occupat, &
 detinet, ac inde nomen sortitur. Nos in febris ter-
 tianæ nothæ accessione hoc symptomate corre-
 ptum vidimus Stephanum Cadeliriū canonicum,
 qui etiamnum sanus est, auxiliis subterioribus per-
 sanatus. Est passio celeris etiā si in chronicas vene-
 rit febres, omni febriculæ irruere potest, grauior
 est in algore, minus grauis in tremore, & minus of-
 fendit si citra algorem sit febris insultus.

Historia.

Meth. med. calefacere & madefacere oportet.
 Curatur enim calidis moderatè & humectantibus
 sumptis & admotis, non modò capiti sed ceruici
 & spinæ dorsi, vt melancholicus affectus. Conue-
 nit forus ex decocto chamæmeli, meliloti, saluiæ,
 maioranæ, & similium ex aqua vel vino. Itē quod
 fit ex oleo sesamino, iasmino chamæmelino, aut
 oleo liliorum alborum. Sed à mitioribus incipere
 curationem oportet per embrocham, & transeun-
 dum est paulatim ad valentiora qualia sunt oleum
 iosminum cum euphorbio. Item castoreum & eu-
 phor

horbium in oleo lenigata, capiti illita subue-
niunt.

De vigilia & insomnia.

CAP. XXVII.

Va de fatis fusè scripsimus lib. de salubri-
tate, fit autem vigilia ex motu naturalis
caloris ad exteriora: duplexq; est, mode-
rata, & immodica, hæc propter calorem
primæ partis sensitiuæ, sed vel ex sola temperatu-
ra, vel ex humoris biliosi abundantiam, fit etiam à
siccitate immoderata. Est igitur causa interna sic-
citas & calor immodicus. Externa verò mœror, do-
lor, tristitia de futuro quidem, nam quæ de præteri-
to est, ad somnum inuitat, vt ait Arnal. Nouimus
nobilem matronam quæ per 35. annos insomnia,
permanfit sana & citra noxam, vt ipsa cum marito
& tota familia affirmabat.

*Historia.
mira.*

Attamē vehemens vigilia cruditatem ciborum
& potionis efficit, siccatur etiam totius habitum cor-
poris. Saturos lædit. Itaque vigiliæ inter mala cor-
poris vniuersi numerantur à Plinio. Somnus iuue-
nibus bonus, vigiliæ malæ. Contra senibus, &
infantibus, ac mulieribus, vt ait Oribasius, forsan
id contigit, propter humidam illorum temperatu-
ram naturalem, vel ascititiã. Interdum tamen pue-
ri per somnum longum in pristinam valetudinem
referuntur. Nimirum somnus concoquit, & vigiliæ
diger

*Vigilia immo-
derate incom-
moda.*

digerunt, & ob id infantibus noxiæ esse possunt, quia propter habitus mollitiem succi perspirabili cute faciliè digeruntur.

Remedia hymnotica, ad peruigilias. Amomum illitum fronti somnum allicit, & doloris sensum aufert. Odore somnos allicit ligustri flos, crocus & baccaris. Confert aliquid ad somnum silanus iuxta cadens. Aqua frigida ex vasis in vasa transfusa conciliat somnum. \mathcal{R} . fol. violarum chamæ. meliloti añ. m. j. florum nymphæ m. \mathcal{S} . calicum papa. albi \mathfrak{z} . j. foliorū salicis, vitis, & maluæ añ. m. \mathcal{S} . Ex decocto si pedes ac manus lauentur somnum euocant vel in febribus. Instilla in aurem guttam vnam olei in quo sinister Ericij oculus frixus sit, & statim somnū inducet. \mathcal{R} . florum violarū, & nenuffaris añ. 3. j. \mathcal{S} . corticum mandragoræ 3. ij. se. anethi, croci añ. 3. j. puluerata ligentur in serico, confert ad peruigilias febris pestilentialis, & inquietudinem. \mathcal{R} . se. alterci albi \mathfrak{z} . j. cum lacte mulieris aquato oui & momento aceti f. illitio fronti. \mathcal{R} . lactis muli \mathfrak{z} . iiij. alba ouorum tria, aceti parum, simul mixtis adde farinam se. papa. albi, impone fronti. Huc refer spongiam somniferam. N. Vigiliis resistit sedum, si inuolutum panno nigro, ignorantis puluino subiiciatur. Idem præstant folia alterci viridia sub puluino imposita. Item confert plantas pedum illinire adipe gliris. Aqua florum croci dempto croci stamine \mathfrak{z} . iiij. ponde

Decoct. somni-
fera.

montale ad vi-
gilia febris pesti-
lentialis.

Litur.

Imperuini

Lioscya. fol.

deps gliris.

pondere, dormituris datur tepens, & somnum mi-
 ro modo conciliat, nec cerebrum frigefacit. R. se.
 anethi, croci, florum liliorum alborū, violarum añ.
 3. S. nympheæ, se. lactucæ añ. 3. j. foliorum arido-
 rum mandragoræ 3. ij. cum succo foliorum papa-
 ueris albi fiat massa, ex qua formentur pilulæ octo
 pro drach. dormituris da binas aut ternas somnum
 tuto inducunt. Aliud, confectionis de styracæ cum
 opio 3. j. ducatur in mortario, mox distritum proii-
 citur, & in mortario imponitur loch de papa. 3. ij.
 pul. diamarg. frig. 3. S. hæc pilo agitata vim opij ac-
 cipiēt. Aliud. opij 3. j. alliorum duo capita simul cū
 opio pinsita extillentur, fiet aqua excellēs non fœ-
 tida, dari possunt aliquot guttulæ cum modico vi-
 ni, vel per se, vel cum alio liquore, vt scribit Praten-
 sis vir sanè doctus.

Amuleta. somnum conciliat & cōfirmat dextra
 phocæ pinna capiti supposita. Somnos allicit
 cuculus auis leporina pelle adalligatus. Ardeo-
 læ rostrum in pelle asinina fronti adalligatum.
 Est etiam per se rostrum eiusdem effectus, vino
 collutum. Plin. Si suspendatur dens hominis, & ala
 vpupæ dextra, capiti dormientis, non excitabi-
 tur, donec auferatur. Item dens & os brachij mor-
 tui, sub capite dormientis repositum, facit ve-
 ternum, ex Raze.

Ad

*Aq. opij et allii**Dens hominis*

Ad insomnia molesta. CAP. XXVIII.

Est autem insomnium triplex, naturale, quod dispositionem corporis naturalem sequitur, nempe humorum in corpore dominantium naturas. Animale, quod prouenit ex animi affectibus iuxta illud, Somnia ne cures. Diuinū quod à Deo immittitur ad prophetas, & apud Hom. ab Ioue insomnia ostenduntur: Sed de his fusè, Concil. Naturalia sunt passionum animæ & corporis indicia, proinde sunt à Medico contemplanda, vt ait Aristot. de his etiam scripsere Hippo. & Galen. sed plenissimè Artemidorus. Qualis est insomnia sentiendi functionibus talis est cōuulsio per epilepsiam functionibus voluntariis. At offensæ ex somno cōtingunt ex malis cibis, nam caules tristitia insomnia faciunt, phaseoli turbulenta, allia & cepa terribilia & consequenter ex humorum prauitate incidunt in somno læsiones, & molestiæ.

*Melissa.**Lactuca semē.**Portulaca.**Margarita.**Anisum.*

Remedia, melissa à cœna comesta somnos iucundos facit. Arcent insomnia semen lactucae potum, & portulaca super lecto posita. Amech. Puluis serpentis. Alb. sub capite positus Varig. Margaritæ suspensæ collo timorem in somno abigunt, Auicen. Idem præstat dexter vrsi aut lupi oculus suspensus. Raze Anisum insomnia leuat, suspensio
in

in puluino, vt dormientes olfaciant, Plin. Ad ster-
 tentes, & eos qui è lecto exiliunt, sub capite dor-
 mientis pone anethum. Galen. dentes equi positi
 sub capite dormientis, eum cōtinent. Rasis. Atlan-
 teis somnia non videntur Pratenfis.

Anethum.

Dentes equi.

ANASCEVE MOR- BORVM, LIB. II.

De nervorum affectibus.

De stupore.

CAP. I.



Nervus est symptoma sensilis po-
 tentiæ, tactiux vel in toto cor-
 pore, vel in partibus vt in ore, &
 dentibus hæmodia. primo de. ca.
 fy. Est autem symptoma motricis
 in difficili motu. Proinde ex sen-
 tiendi, mouendiq; facultate compositus existit.

Causa. continua affectus nervi est talis, vt vim
 illi à cerebro missam impedire possit. Impeditur
 autem torpedinis tactu. Item si nervus meatu ali-
 quo præditus obstructus est, vel compressus, si ve-

To. I. Lib. II.

rò

rò solidus sit. Idem illi eueniet, si constringitur, refrigeratur, vel crassescit. Denique stuporis causæ resolutionis causis similes sunt, nisi quod minus vehementes. Torpor à sanguine ex coxis & femoribus depresso in tibiis ac pedes, fit etiã stupor propter corruptionem substantiæ membrorum sensibilium, vt in lepra, vel à dyscrasia frigida corrumpente calidum innatum. Paralysis à torpore sola magnitudine differt.

Digno. Vbi citra aliquam huiusmodi causam ultro torpor acciderit, tunc vel vitæ ignauiam, vel ciborum multitudinem, crassitiem, lentitudinem, aut solitæ secretionis suppressionem antecessisse necesse est.

Præsa. stuporis dispositio inter resolutionem & integram valetudinem media est, ideo necesse videtur præcedere paralysem, in eam ob causarum vicinitatem transit. In capitis ictu stupor aut mentis cōmotio malo est. Obstupentia dignoscitur quando neque aliquid dicunt neque agunt, sed apertis oculis quieti manent, similes his qui ex timore sunt attoniti, vel qui præ timore obtupestunt. Quocirca iste stupor idem est *ἐκπληξίς*. catalepsi non dissimilis videtur.

Metho. m. stupor per causarum abolitionem curandus huius mali remedia cum paralyfi dicatis præsiidiis affinitatem fortiuntur.

Remed

Remedia. olei lib. \mathfrak{s} . euphorbij \mathfrak{z} . \mathfrak{s} . castorei *Simimentū.*
 \mathfrak{z} .ij. misceantur in phiala quæ operculetur & bul-
 liat in duplici vase ad consumptionē tertiæ partis
 olei, hoc illinantur loca. Pastorē stupidum in omni
 sensu & motu sanauit Vales. apparantibus humo-
 rem frigidum & purgantibus ter vel quater repeti-
 tis. Ab his sternutamētis siue ptarmicis vsu & con-
 seruæ rad. acori. Ad stuporem à causa frigida fots
 ex vino albo polyphoro, seu vino actu calido, vel
 ex decocto in lixiuio facto, cum foliis lauri, vel vn-
 gatur oleo de pice, nauali actu calido, vel \mathfrak{x} . olei
 costini de pipere, olei de croco añ. \mathfrak{z} .j. pul. foliorū
 roris marini, eupatorij, spicæ, nardi, origani, pulegij
 añ. \mathfrak{z} .j. ceræ albæ quod sufficit. fiat vnguētum mol-
 le. Pars illita tegatur pelle vulpina. Pedum torpor à *Vulpina pelle*
 sanguine discutitur si pedes steterint in aqua frigi- *Aqua frigida.*
 da, quæ vltra malleolos madefaciat.

De tremore.

CAP. II.



Tremor est motus deprauatus virtutis &
 morbi per contrariorum motuum suc-
 cessum partem nunc dimittētium nunc
 attollentium. Est igitur motus compo-
 situs, quo corpora deorsum pondere suo vergunt,
 rursus in altum à facultate attolluntur, lib. de tre-
 mo. & palpit.

Causa externa vini immodica potio, vel aquæ

To. i. Lib. ii.

h

è niue

è niue solute. Interna quę corpus sustinet, mouetq̃:
 vnde senex tremuli. Tremor, etiam ex timore fit,
 quia viriũ robur aufert, nempe in frigidat loca su-
 periora. At imbecillitatis varię, sunt causę. Alimen-
 ti inopia vt in fluxibus, hæmorrhagiis, inedia. Vitali
 robore resoluta, in exolutionibus vel violento
 frigore occupate. Imbecilla quoque ad motus vir-
 tus efficitur, plenitudine ponderis modo degra-
 uante, vt in tremore Estymargei ancillæ. In summa
 infirmatur facultas ex inopia spiritus si longo mor-
 bo deteritur, vel immodico labore exhauritur, vel
 nimia venere profugit, vel immoderatis vacuatio-
 nibus euanescit; vel senio abolefcit, vel timore se-
 condit. Altera causa est ^{neruorum} ~~neruorum~~ obstructio à suc-
 cis multis crassis lentis, ita vt exigua vis motrix in
 partem affluat, nisi dum cōfertim irruens, illos ex-
 cussit. Tremor musculorum infirmitas causam
 habet continentem imbecillitatem, quę afficitur
 aut per se, id est, per dyscrasiam, aut per humorum
 exundantiam grauantem. 3. epid. Atque ibi tre-
 moris triplicem exponit causam, videlicet instru-
 mētorum voluntariorum dyscrasiam, affectus ani-
 mi, & oneris grauitatem. manibus nerui dantur &
 spinalis medullæ regione, ad 6. 7. & 8. vertebram
 tertio epid.

Dignost. patent ab essentiæ ratione, & à relatio-
 ne ægri.

Præfag.

Prælag. Qui in causo tremores fiunt, delirio soluntur. 6. aph. in hoc fit tremor quando materia è enis traducitur ad nervos in com. fit etiam vbi er febrem materia confluit in musculos. Concor.

Metho. m. Curandus est per efficientium causarum sublationem. Tremori eisdem præfidiis quibus stupori succurris, subueniendum est. De assumendis cõuenit syrupus sthecadites Mesuæ, blanca N. hiera Hermetis Mes. Mithridatium, etiã thesiaca, vel puluis quæ recipit cinamomi ℥. j. cõseruæ esbri ℥. 8. zuccari albissimi ℥. ij. macis ʒ. j. sunat omni mane coclear vnum. De admouendis vnguentum de castoreo, & vnguentum zosimi, vel illinantur cum succo arthemisiæ, cum oleo mixto, vel cum oleo nardino, castoreo, vel euphorbio, fiat etiã vnguentũ vel illitio cum oleo cinamomi, vel de cucumere, syluestri, vel cum oleo piperato, philosophico, vel gagatiuo Mesuæ, præcipuum est cerebrum leporis assum si manditur: Zoar.

De palpitazione.

C A P. III.

Π Ἀλμῶς est motus totus præter naturam, paucus, tardus rarus, quo partes palpitan-tes citra voluntatem nostram attolluntur, & deorsum aguntur 2. de ca. fy.

Causa. spiritus crassus, & vaporosus, cui non sit trāsitus, loco præcitato. Palpitationis cuiuslibet ex

h 2 frig

frigido generatio est.

Præfagia. ætates frigidiores palpitationi obnoxia, inibi.

Metho. m. palpitationum remedia calida extenuantia, nam fundunt, laxant, meatus aperiunt, spiritum attenuant.

De pandiculatione. CAP. IIII.

Non est ἀλική, vt interpretatur Gaza. sed σκροδανισμός dicitur. 2. de ca. sy. Est motus expultricis ad distentionem membrorum, inuitantis, vt vapores difflet.

Causa. sensus euaporantium excrementorum in carnibus ob congesti cibi concoctionem, & quietem motionum. 2. de ca. sy.

Præfag. non aliter ab oscitatione differunt nisi quod hæc omnium musculorum symptoma est. Oscitatio verò eorum tantum qui circa maxillas sunt.

Metho. m. hanc vinum aqua temperatum soluit, nam quia calidum resoluit materias, quia temperatum facilius penetrat.

De oscitatione. CAP. V.

Xασμή est motus expultricis, ad euaporationem spirituum flatuosorum in maxillis contentorum.

Causa

Causa igitur humiditas flatuosa, vel spiritus flatuosus contentus in musculis 2. de. ca. fy.

Præfagia. Quum humores facientes oscitatione & pandiculatione exuberauerint, fit horror, & tremor, si plus abundauerint febris efficietur. 3. p.

Meth. m. pandiculationē, oscitationē, horrorem, vinum par pari ingestū, tollit ægritudinē, quia cito penetrat resoluitq; materiam. Medicatoria continuarum oscitationū proluxa spiratio. 6. epid. Nam detentio spiritus vacuare redundantias, superuacuaq; potest. 3. de dypsnœa. Gal.

De oris distortionē.

CAP. VI.

AN oris obtortio distet à cynico spasmō? Est enim cynicus spasmus resolutio, per quam in vtrālibet partem deprauata est facies, vt definit Paulus. At Almanfor censet oris peruersionem cōuulsionem esse. Similiter fiunt oculorum, palpebrarum facieiq; variæ peruersiones, quia facies à parte anteriore cerebri, suos nervos recipit, qui & resolui, conuelliq; possunt. Os & labrum distortum seu reflexum. 3. epid. In summa oris distentio est figuræ deprauatio in vtraque parte sana scilicet & ægra, vel in altera tantum.

Causa. resolutio aut conuulsio. Naturalis enim frigida membri vitiatur ob resolutionem neruo-

h 3 rum,

rum, aut distentionem, inflammationem, aut schirrhum: si quidem in his, qui in altera parte sunt resoluti, membrum trahitur à musculis actionem facientibus. An in his, quos in altera parte conuulsio exercet, aut phlegmone, aut scirrhus, aut dura cicatrix, pars sana trahitur ab affectis musculis. Partium fiunt peruersiones extentis atque contractis his qui ad eas nerui pertingunt per conuulsionem. ita contrahuntur ægræ partis muscoli, ut ad eorum retractionem sanæ partis musculos trahi sit necesse. Resoluuntur autem & conuelluntur magna ex parte ob pituitæ infarctionem. Vbi muscoli ab altera maxillæ parte resoluuntur, fit ut altera breuior appareat & quasi contracta, sed quæ vitata est, eam secuta extendi videtur, nam quum muscoli omnes vnâ propriam habent actionem, nempe ad sua initia sursum contrahi quâdo illi qui à sinistra maxillæ parte sunt, agendi potestate priuantur qui à dextra, sunt robusti ac viriliter habentes, agunt ad seipso attrahentes dextram maxillam vniuersam & labra, atque ita conspicitur sinistrum labrum extensum & longius redditum.

Digno. oris conuulsione aliquem affligi censemus, si quando illi os ad alterum latus contorquetur, & oculum ad quem illud conuellitur, occludere nequit: præterea si expirare iussus, flatus ab altera tantum parte prorumpat effleturq; .Non ea maxilla

xilla quæ peruersa apparet, sed opposita resolutione infestatur. Resolutum latus ad alteram faciei partem retrahitur. Resoluto alicuius partis musculo pars ipsam in cōtrarium: Resoluto musculo qui dextram partem labri mouet, ipsa ad sinistram flectetur. At si is, qui sinistram mouet resoluatur, ipsa trahitur ad dextrum: haud secus & totam mandibulam, & narium pinas & genas quæ à lato mouentur musculo, in aduersam partem flecti contingit. In summa si oris distentio ob resolutionem incidat, resoluti musculi, id est, priuati sensu, & motu à musculis appositæ & sanæ partis trahuntur, vnde figuræ deprauatio in sana parte monstratur. Si verò distentio ab conuulsione perueniat, cōtrà omnino accidet. Nam pars ægra sanam ad se trahet contractis nimirum in sese ægræ partis musculis.

Prælag. Cynicus spasmus cum acuta febris oritur, scilicet qui fit à conuulsione: risus enim sardonius musculis labiorum conuulsis incidit. In febre continua si labrum vel oculus vel nasus, vel supercilium peruertatur, mors proxima. Obtortio quæ non repente vel paulatim accidit non nisi in pernicioſa phrenitide, aliisq; morbis acutis inuadit.

Metho. m. Temporum maxillarumq; musculis, item labris & narium pinnis sensus & motus, linguæ verò omnibusq; oris partibus sensus duntaxat à tertia cerebri neruorum cōiugatione oritur.

h 4

A se

A secunda oculorum musculis motus vt à prima oculis ipsis cernendi sensus suppeditatur. Peruersio quæ etiam sequitur conuulsionem eadem metho- do eisdemq; mediis curatur quibus & ipsa paralyfis apud Almanforem lib. 9. forsan quia Paulum se- quitur, qui cynicum spasmus ad resolutionem refert lib. 3. Auicen. tantum iubet vt in spasmosa tortura ante vsum resoluentium admoucantur mollientia.

Remedia sunt purgatio vniuersalis per pilulas foetidas, particularis per gargarismata, ex sinapi di- luto cum syrupo acetoso. Item per ptarmica ex struthio (condisum vocant) detrito & inspirato. Præterea materia digeritur vsu confectionis ana- cardine, & vnctione vertebrarum colli, frontis, & fa- ciei ex oleo costino. Nux etiam moschata in ore retenta cõfert. Paulus sanguinem detrahit ex vasis linguæ subiectis, super quo amplius deliberandū, ne per sanguinis detractionē affectus incrudescat. Sicyas adhibet priori vertebræ, & capistro æquali- ter in oppositum affectum ducit: sed de capistro consule Galen. lib. de fasciis. Inter remedia sunt li- quor ex galbano extillatus. Arnal. fomētum ex de- cocto tunici. Tor. Errhynum Conco. quod recipit auriculæ muris, cyclaminis, nucis indicæ, cucu. syl. nucis mosc. acori, pyretri añ. m. §. elixentur in vi- no, cuius colati vna vel altera gutta in nares instil- letur.

letur. Ad spasum & peruersiones faciei confert plurimum sy. de calamento. ℞. calamenti rom. cinamomi zedo. gary. añ. 3. j. fantali, xyloal. añ. 3. j. moschi ʒ. ʒ. puluerata illinantur oleo amygd. & cum melle despu. f. elect. bibatur ex eo gr. xv. cum sy. de cal. omni die. in causa frig. Aliud. castorei doronici, been albi & rub. condisi, opopan. abrengi, spicæ baurac añ. ʒ. ij. fiat pul. aroz. cum moscho. mouet sternut. vt olfactorium admotum. Errhynū sed potius ptarmicum ex felle Cati syluestris cum zambac dissoluit oris torturam. Idem præstat quod fit ex felle gruis cum zambac. Raze.

De spasmō.

CAP. VII.

Σπασμός, id est, conuulsio, vt nomen indicat, cōuulsis seu reuulsis fit ad propria capita musculis, & neruis. Est motus naturali similis, nisi quod totus est præter voluntatē, deprauatus motricis motus, scilicet dum fit contractio: hac autē facta, est morbus in figura. Conuulsiones & à plenitudine & ab inanitione eueniunt, vt pote per quas nerui immodicè tenduntur. Tendo est voluntarij motus primum instrumentum. 1 2. de vsu p. & musculus. primo de motu musc.

Differētia omnes tres, opisthotonos, id est, tentio ad posteriora. Emprosthotonos, id est, tensio ad
h s anterio

anteriora, & Tetanos, id est, distentio. 4. aphor. rigor Celso. ex duabus aliis speciebus composita. Sunt præter has tensiones aliæ in dextrum, vel in sinistrum, quæ sæpe accidunt, sed nomine carent, ut inquit Paul. has refert ad gibbositatem Torna.

Causa externa. Ab æstibus fortibus conuulsio aut distentio malum, frigidum cōuulsiones distentiones 5. aph. Ex ebrietate ibi 5. ex elleboro ibi 1. Vini potio in fame, quæ ex inedia vel euacuatione fit, conuulsionem infert. 2. apho. Cōuulsio ex vulnere. 5. apho. ex punctura chordæ. 3. art. p. A fluxu sanguinis, ibi 3. Ex superflua purgatione ibi 4. Ex feбри, ibi 66. Ab ileo. 7. aphor. Ex morſu oris ventriculi, ab humore æruginoso. A cholera morbo contractiones frequenter adueniunt, maximè eorum qui sunt in furis musculorum in summa omnis conuulsio fit ex repletionem, vel inanitione corporum neruorum, à quibus secundum electionem, motus perficiuntur: sunt autem hæc, nerui, ligamenta, muscoli & tendones. 5. apho. plenitudo autem hîc effertur de omni humore extēdente neruum, fortassis etiam de flatu, & hæc in seniorum cruribus frequenter contingit, facta à succis mordacibus ex inanitione fieri dicitur, quoniam succi tales vim exsiccandi habent. A siccitate autem seu ab humiditate nerui tenduntur, non secus quàm chordæ in cithara, quæ ab ytraque ambientis qualitate

litate, siccitate scilicet & humore ad vltimam tensionem perueniunt. In conuulsione tertiã aliquam causam supra euacuationem & repletionem nondum reperi, singultum tamen sine his fieri video acribus humoribus aut medicamētis stomachum mordentibus. Est tamen singultus conuulsio stomachi. Itaque glossematarij de conuulsione meminere, quæ efficitur à qualitate quadam alteratis per continuationem partibus, aut à substantia spiritali veluti aura ad neruorum principium delata, quam vt à se expellat conuulsorio motu concutitur.

Digno. Intenta & immobilior ceruix manet in tetano. In scapulas cōuertitur in opisthotono. Cōtra mentū pectori annectitur, in emprosthotono. Conuulsio omnis aut statim aut pedetentim apprehendit. Conuulsio in sanis repente facta necessario ex repletionem fit. Nisi sequatur repentinam vacuationem, subito etiam fit à frigido extrinseco. Si aliquādo per totum corpus neruorum actio vitiosa reddatur, ipsorū principiū affectū esse cōstat. Vniuerso infra faciem corpore cōuulso, omnium infra faciem neruorum originē affectam esse putandum est, quæ sunt primæ spinalis medullæ partes: si verò conuerso corpore facies conuulsa sit, non solum eam partem, quæ ex spina procedit, verum etiam ipsum cerebrum curamus. Dispositio
con

conuulsioni similis in musculis pectoris, ob quam luctuosa fiunt suspiria. Stridor dentium aliquando fit ex conuulsione musculorum qui in temporibus sunt, & maxillis, aliquando ex eorum imbecillitate, si nimio aliquis dentium stridore vexatur, maxillares muscoli conuulsione laborant.

Præfagia. pueri promptissimè conuelluntur, quia vim animalem & nervos habent imbecillos, primo epid. & tertio prognost. ac ibi in eis futurarum conuulsionū prænotiones explicantur. Conuulsio his, quibus inflāmatur diaphragma procliuis. Cōuulsio ex bile, vel mordēte & tenui humore, vel ingēti frigore facta, subinde procuratur. Quæ verò ex inanitione, vel siccitate fit, curatu perdifficilis, aut insanabilis. Conuulsio ex inanitione acutissima & perniciosissima. Quicumque à distensione corripuntur, in quatuor diebus pereunt, si verò hos effugerint sani fiunt. Est enim tetanus morbus peracutus, exactè, scilicet. Qui à cōuulsione aut tetano tenentur, febre superueniente liberantur. In acutis febribus cōuulsiones malum. In febribus ex somnis timores vel conuulsiones malū. In febribus spiritus offendēs, malum, cōuulsionē enim significat. Ebrius cōuulsus moritur, nisi febre corripiatur.

Metho. m. Conuulsio ex repletionē superueniente febre curatur. 2. apho. & 4. Curatur etiam multa aquæ frigida perfusione, si omnia consentiant.

riant. 5. apho. quæ curatio non adeò placet Auer-
rhoi. Neque febris in conuulsione excitanda est, vt
sentit Brasauola. Sanè imperitissimus medicus vi-
detur, qui morbum nescit, nisi morbo curare. Cõ-
uulsio à sanguine, vena secta curanda, sed parcior
fiat euacuatio, quàm ipsa copia exigat, ne vires
symptomati occursuræ deiiciantur, satius est enim
vacuationem partiri, quàm semel quātum necesse
est, vacuare. 1. ad Glau. & 4. 1.

Ad tetanicos, ex vulnere sanguis mittendus est,
vel copiosus, aut à vulnere ipso, aut à vena cubiti.
Alb. Conuulsio ex repletionē pituitosa ferè cura-
tur vt paralyfis, stupor, tremor, videlicet victus ra-
tione calida & sicca, apparantibus materiā & pur-
gantibus, & ad inferna materiam auertentibus per
clysmos, & reliquias materiæ neruis affixas dige-
rentibus topicis, vt oleo liliorum, costino, vngu. de
bdellio. Inseffus in soliū ex oleo calido. Item pel-
les, vulpis, lupi, melidū, ouis aut veruecis detractæ
& adhuc calentes salubriter imponuntur. Spasma-
tis subueniunt Mithridatium, theriace, sy. de agri-
monia. Oleum beeninum, linebœon crocinum,
piperatū & de lap. agate M. vng. de casto. aragon,
de bdellio, philagrios, ceratum diapente, & de eu-
phorbio. ℞. olei amygd. dul. lib. j. croci 3. iij. sapæ
lib. ij. bulliant ad consumpt. sapæ, & vtere. siccitati
membrorum medetur pinguedo cati afsi illita.
Spa

Spasmos fieri prohibet serpentum senectus in pelle taurina adalligata. Plin. 30.

De neruorum resolutione. CAP. VIII.

Π *Ἀράλυσις* est neruorum resolutio in qua scilicet nerui laxantur: nam resolutæ partes, hoc autem est, quæ nullo sunt vsui, vel conuelluntur vel laxantur, vt ait Aurelia. Resolutorum membrorum alia tenduntur, alia cōuelluntur, & contrahuntur. Syderatio duplex, vna cum contractione, alia cum remissione neruorum conspicitur. paralyfim hoc vtrunque vitium Græci appellant. Item resolutio cum remissione triplex vt Aurel. inquit, prima sensus, altera motus, tertia sensus & motus. sed quibusdam illa, quæ omni ex parte naturalē motum abstulit, paralyfis vocatur, quæ verò plurima ex parte motum vitiauerit, paralyfis etiam dicitur. Sed neruorum resolutio secundum Galen. potissimum dicitur, vbi motus deperditus est: vbi verò partium aliquarum sensus perit, eam partem sensus expertem esse, resolutā verò non adeò dicere consueuimus. De paralyfi tamen sensus & non motus meminit Galen. causam reddens cur per resolutionem interdū sensus duntaxat, interdum motus, nonnunquam ambo simul pereunt, sed propriè paralyfis est affectus, per quē sensus & motus deperditur. Quum omnes pariter
nerui

nerui tum sentiendi, tum mouendi vim amiserunt, apoplexia hæc affectio dicitur, vbi alteri laterum accidit, resolutio nominatur, eius scilicet partis, in qua consistit affectus. Quod si in aliquo membrorum idem euenerit, eiusdem membri resolutio esse dicetur. Resolutio neruorum spirationis apnœa vocatur, vocis aponia, vesicę diabetes. Sed de singularum partium resolutione cōsule Aurelianum, Paulum, & Aetium lib. 6.

Causa externa, ictus, luxatio, vertebrarum, vulnus, nuche, neruorum attritio, profusum gaudium, vel tristitia immodica, casus ex curru, vapor argēti viui, porcinae carnes, & aquaticæ, tubera quo in genere fungi continentur. Interna verò est cerebri spinæ, vel neruorum affectus impediens ne animalis facultas è cerebro ad partes resolutas dilabatur. Qualis est ventriculorum cerebri in toto capite obstructio, vt in Apoplexia, vel in altera capitis parte, vt in ipsa (quæ paralyfis Paulo vocatur) hemiplegia. In spinali medulla continui diuisio. Vertebrarum luxatio, paralyfis ab angina, inibi. Neruorum meatum habentium obstructio strictura. Obturantur autem humorum copia, crassitie & lentore, humores viscidi & crassi paralyfis autores fiunt. Stringuntur verò seu crassescunt, à causa externa vel interna, nempe frigore violento, compressione dura, ex luxatione, phlegmone, scirrhus.

rho. Vis enim animalis per neruorum solidorum corpora à cerebro permeat, vti solis radij per aquā vel aërem transeunt. Visibilis spiritus substantialiter ad oculos peruenit, & ad aliorum sensuum organa, non substantialiter, sed solum irradiatiue perueniunt, spiritus est substantia luminosa. In summa causa offensæ sensus & motus, gemina est, vna affectus per quem prohibetur penetratio spiritus ad membra, vt obstructio circa principium nuche, siue illa fuerint à causa externa, siue interna. Altera est dyscrasia nuda, vel materiola, in mēbris passis, per quam illa non admittunt spiritum, vt vehemens frigiditas, de qua Galen. historiam narrat de pallio circa ceruicē madefacto. Xenophon in 7. de Cyri minoris expeditione, Erat, inquit, in Thracia niuis magna vis ac frigus adeo vehemens vt aqua cœnantibus apposita, quin & in doliis vinum congelasceret. Multis etiam Græcorum nares & auriculę solo tactu præ rigore auellerentur. Paralysis item fieri potest à pituita tanquam à causa antecedente & coniuncta, vt notat de solo, à melancholico fucō & ex qualitate calida aut sicca. Vbi calida dyscrasia sanguinem & humores nimium torrefecerit, vt sentit Trallianus, haud dispariter proficisci poterit, ab impura bile, & crasso sanguine. Alioqui à pura bile & sanguine obstructio in neruorum origine fieri nequit, nisi tanquā à causa dissolvente pituitam

pituitam vt tradit Nicolus, paralyfis ex mœrore Trallianus meminit.

Dignostica. ab essentia ratione petenda, vbi vniuersæ partes quæ sub facie constitutæ sunt, resoluuntur, faciei partibus illesi, affectionem in spinæ initio esse certum est. Paralyticorum pulsus est paruus & tardus, quod morbus sit frigidus languidus, quod facultas infirmior, nonnullis rarus quoque, aliis creber, sed nonnihil inordinate intermittens. paralyticis ab angina non totum corpus resoluitur, sed vsque ad manus duntaxat. Paralyfis futura deprehenditur saltu, iectigatione, tremore, stupore, grauitate partium, turbatione sensuum, & eorum imbecillitate.

Prælag. Apoplexiæ solutæ, succedere solet paralyfis: hæc autem paraplegia nuncupatur. Ex neruorum passionibus cerebrum, quod est eorū principium compatitur. Similiter ex capitis passionibus omnia neruosa afficiuntur, si quidem omnes nerui ortum habent à cerebro vel à spinali medulla. Paralyfis rarissimè terminatur in alios morbos, sed multi morbi in paralyfim mutantur, vt apoplexia, epilepsia, colica, lethargus, suffocatio vteri. Paralyfis est aliquando crisis acutorum, quando materia terminatur ad neruos. Nucha oritur à membranis cerebri, & nerui motrices à nucha. Capitis parte vna læsa oppositi nerui læduntur, nam nerui

To. I. Lib. II.

i dextrî

dextri ad sinistras partes transeunt, & sinistri ad dextras se inuicem decussantes, vt aiunt Areteus & Cassius. Paralytici qui tremunt faciliùs sanantur teste Plateario, quia expulsio materiæ significatur. Colicus dolor qui fit à tenuibus humoribus in artuum resolutionem, sensu incolumi transit, vt testatur Aegineta. Paralysis quæ casum aut ictum repente subsequitur, desperata est. Paralysis ex ictu deterior. Tamen Pausanias ex paralyti digitorum propter casum facta sanatus est. 3. de loc. aff. Contingit quoque hemitriteum in paralytim terminari, vt subit Arnal. Paralytim sæpe sanauit superueniens diarrhœa. primo cōtin. maximè si deiicitur humor faciens paralytim. Tremor paralyti superueniens bonum, quia minor adest nerui obstructio, vnde transit spiritus. Paralysis vnius membri difficilius curatur, quàm ea, quæ vnum latus occupat, localia admota parti resolutè parum conferunt.

Method. m. curatio paralytis est causarum sublatio. An phlebotomia salubris? curatio à sanguinis missione auspicanda si plenitudinis notæ adfuerint, & per vires ægrotantis liceat, salubris item phlebotome in paralyti, quæ casum aut ictum repente subsequitur. Quibusdam etiã placet, inquit Aliab. vt in principio fiat phlebotomia, quæ pituitosum euacuet sanguinem, sed aliis hoc displicet, vt idem ait, quoniã per sanguinis detractionem sanguis

guis imminuitur, & complexio roboratur frigida.
 Verùm author passionarij Phlebotomus, inquit,
 adhibendus est, omnibus paralyticis, & sanguis à
 latere incolumiore mittendus, & moderatè, ne cor-
 pus refrigeretur: Sanè immoderata & vniuersalis re-
 pletio citra hydropem, nunquam caret sanguinis
 exuberantia. Si ex anatomice neruorum ad singu-
 las partes veniētium principia didiceris, per quàm
 facilè eorum, & sensum & motum deperditum cu-
 rabis. Et nisi affectam sedem, eiusq; dispositionem
 accuratè cognoueris, nequaquam eas partes, qui-
 bus vel sensus vel motus vitatus est, rectè curabis.
 Proinde Pausaniæ non digitis resolutis remedia,
 sed dorsi initio, id est, læsæ parti, remedia adhibere
 iussit Galen. Itaque Auicen. Sit intentio, inquit, in
 curatione posterioris partis cerebri. At inungere
 spinam in paralyti nullus ante Mesuem docuit, si
 credimus à Cauliaco & Tagautio. Auicenna post
 Aliab. monet nō esse dāda à principio mali, fortia
 cathartica: præsertim, scilicet, si materia sit fluxa,
 crassa & viscosa, si verò adhuc fluat forti pharmaco
 esse videtur deturbāda. Nā eius morbi curatio in- *Nota*
 cipitur nono Almanf. à propinatione pilularū fœ- *Pilul. fatidæ?*
 tidarum. Victoriū orditur curationem à sangui-
 nis missione, & sequenti die dat pilulas de hiera }
 simplici cum agarico. Corporibus carnes habenti-
 bus humiditas, fames offerēda est, fames enim cor-
 pora

pora siccat, nam quacunque exiccant, sunt passio-
num humidarum præsidia. Hinc tenuem victum
paralyticis subuenire perspicuum fit. Attamen vi-
ctus tenuis in longis morbis periculosus. Quod
verum est, in plerisque omnibus, non item in his,
in quibus ab ægrotantium corporibus, parum vel
nihil effluit, propter innati caloris imbecillitatem,
nimia humorum aut pituitæ abundantia contin-
gentem. Nam si oportet alimenti quãtitatem, eius
quod difflatur quantitati esse proportionalem, cõ-
stat difflationem sensui occultam necessitatis ali-
menti causam esse, hac ratione quæ hyeme delite-
scunt animalia non egent plurimo alimẽto, si qui-
dẽ & sine cibo possunt perdurare, vt testatur Gale.
& non rarò inueniuntur adipe obesa, sunt namque
frigida distemperãtia, quòd animales actiones tor-
pidẽ declarant, & spirationis fere abolitio.

Remedia sunt quinque generum, de spectatis
quæ materiam cõcoquunt seu apparant, sunt, mel
rosatum, hydromel, syr. conferuẽ acori, sy. de steca-
de, M. sy. de yua. Nicol. sy. de agrimonia Vigonij,
Acetata licet materiam crassam attenuent & len-
tam incidant, quia tamen neruis nocent, vt frigida
& mordacia cætera, ob id illis rarius & parcius
vtendum.

De purgantibus sunt pil. de hiera cum agarico,
mastichinæ, coccinæ, & fœtidæ, de sagapeno, de
opopa

oponaco, de euphorbio, pilulæ diacolocynthidos.
 Auertentia in contraria materiam quæ ad spinale
 medullam defluit, sunt clysmi acres, sternutatoria,
 errhina, apophlegmatismi, gargarismata, frictiones
 in parte incolumiore sicyæ innanes, & cauteria ca-
 lida, quæ impēsē commēdat Victorius, Si paralyfis,
 inquit, sit in brachiis, admoue cauterium in prima
 vel secunda spondili colli versus craneum, si verò
 in cruribus adhibe cauterium in spondili prope
 caudam. De his, quæ reliquam materiam digerunt,
^{mitiora.} mitia ora sunt primū exploranda, & inter assu-
 menda spectata sunt, cōserua saluiæ, acōri, anthos,
 yuæ, eringij, electuarium diamoschi dul. dianthos,
 diambra, theriace, mitridatium, nux moschata cō-
 dita, confectio anacardina, puluis radicis impera-
 toriæ, ex vino sumptus, omni mane, sanat paraly-
 sim faciei, & palpitationem. De admouendis sunt
 suffitus, vnguenta, emplastra, stube, & balnea sulfu-
 rea. ℞. olei costini, liliorum alborum añ. ℥. ij. amba-
 ri 3. S. misce in phiala stricti orificij operculata, in-
 soletur diebus triginta, vnguatur spina actu calido.
 ℞. oleorum vulpini, rutacei, laurini añ. ℥. j. succi ru-
 tæ, calamenti, adipis anatis, & gallinæ, œsopi añ. ℥.
 S. castorei 3. j. S. bdellij, ammoniaci in aceto emol-
 liti, añ. 3. j. S. euphorbij 3. j. cū modica cera, fiāt vn-
 guentum. Concoregij, huc refert oleum Valesci. c.
 de gonorrhœa, & liquorē ad paralyfin M. qui scri-
 bitur

N. B.

bitur à Cauliaco, & à Tagautio & à Philonio c. de gonorrhœa & liquores Arnaldi. Paralyfis ab ictu curatur pelle ouis recens detracta loco imposita. Paralyfim ex vftione fanare aiunt decoctũ corticis mediani vlini, & radicis eius illitum: sanat enim omne neruorum vitium. Afsidua inunctio spinæ ex oleo oliuarum abluto prohibet ne quis in senio incuruetur. Idem præstat oleum amygdalarum illitum frictiones vertebriſ vtilis, ſed vtiliſſimè cervicis. Iua moſchata ſiue chamæpityos, ſumpta, frequenter, valet ad hemicraniam, & paralyfim. Conſumit catarrhum, & omnia capitis excrementa: vnde viſum acuit.

Ratio victus in quantitate ſit tenuis, ſi per vires liceat, in qualitate verò morbo contraria. Contrarius enim in morbo victus, Zoar iubet comedere capita & carnes leporum, pullos columbinos, & columbos ſylueſtres, eoſq; viuos odorare, olfacere cepam, ius galli antiqui, & viperæ plurimum confert. Caro ſit minutim cōciſa & frixa, potus mulſa. huc refer auium genus præſertim paruorum paſſerum, qui *σποῦβοι*, non item qui *φύλας* nuncupantur, id eſt, auicularum in dumetis degentium, & paſſerum turricularum, ſtrobili pro bellariis conueniunt. Vinum neruis minus nocēs eſt, quod vetuſtate dulceſcit, quoniam minus in neruis acetare creditur. Braſſica ſumpta, capares, quotidiana eorum

eorum comestio , ericij carnes , galli ius cocti
cum polypodio , sale , anetio. Nasturtium come-
stum , coctum , histricis carnes sumptæ , rafanus,
carnes serpentis , testudo comesta.



ANASCEVES MOR- BORVM, LIB. III.



De his quæ ad oculos & visum pertinent.

C A P. I.



Is v s est potentia sensilis appræ-
hensiuæ rei visibilis in oculo , me-
diante diaphano. Igitur obiectum
visile. Medium diaphanum. Or-
ganum oculus. Visile autē triplex
est, lux, lumen, color. Item eiusdem
sensus est cognoscere sui sensibilis præsentiam ac
eius absentiam. Sensibileq; duplex , per se, & per
accidens. Illud etiam geminum, proprium & com-
mune. Lux autem est qualitas in corpore lucido,
nata moueri ad motum eius in quo est. in suo esse
non dependens ab aliquo extrinseco. Lumen etiã
qualitas , & non corpus à luce genita in corpore

To. I. Lib. III.

i 4

diaph

diaphano, est enim actus diaphani inquantum diaphanum. Umbra est lumen diminutum. Tenebra verò omnimoda lucis priuatio. Lux & color sensum immutare non potest, nisi prius in medio speciem suam multiplicauerit. At lumen videtur per propriam speciem multiplicatā per medium, & aliquando non multiplicatā. Nam lumen actuās medium & organum, non producit speciem suam in medio, nec in organo, sed immediatē in potentiam visuam. Vnde lumen aliter quā lux videtur. Lumen quoque sine obiecto opaco videri nequit, vt patet de lumine, quod in opaco loco per duo transmeat foramina. Lumen itaque incidens per foramen angulare rotundatur, quia sol à quo procedit, rotundus est, facit etiam ad hoc radiorum coincidentia. Color esse suum formale habet à lumine, quum sensum non moueat absque lumine teste Auerrhoe, proin color finitur qualitas visibilis per lumen, quod est in extremitate perspicui, in corpore terminato & nō transparēte, lib. de f. & f. Et perinde color profunditati opaci non inest, nisi quatenus color est qualitas secunda, quæ fit actione & passione qualitatum primarum in materia.

Medium peruium perspicuumq; corpus est, saltem in vltima parte, in qua colori coniunctum est, actu diaphanum. Nam lumen ad visionem requiritur,

ritur, non propter colores sed ob medium. Sunt tamen oculi nocturno tempore cernentes, veluti felium, capræ, & lupi, teste Plinio, forsan quod nox non tenebra, sed vmbra est, vel quòd conatum in oculis lumen habet. Noctu quoque fulgentia sicut nicedulæ cicedulæve in tenebris videtur, quoniã intrinsecum obtinent insitumq; lumẽ, vt ait Themist. sine medio nihil videri potest, ergo nec in vacuo. Cur per conspiciilla literæ maiores cernuntur? An quod per medium densius (vt etiam per aquam) simulachra maiora veris videntur, sic sol matutinus maior apparet, quia per aërem cernitur roscidum.

Organum oculus, aqueum enim est, sicut auditus aëreũ, lib. de f. & f. & de g. anim. hinc est quod potentia nobilior non dicitur ex eo, quòd nobilius organum habet. Oculi pretiosissima corporis pars. Itaque ob oculos caput factum. 8. de vl. part. saltem quantũ ad situm. Quod tamen non semper verum est: sunt enim oculi quibusdã in pectore, vt ait Plin. quare caput fortassis cerebri gratia existit, vt retur Aristot. 4. de part. anim. Oculus non rigit quia opimus. 3. 1. probl. vel quia crasis eius influens calida est, vt opinatur Grad. Oculus est acerrimi sensus. 1. 3. ther. & 4. $\nu\lambda$ $\tau\omicron\pi$. vnde fit vt cito deprauetur: sensus enim in animalibus breuioris vitæ causa est, vt tradit Auerrho. 2. de anima. Oculi vt

i 5 robur

robur habuerint, sicq; corpus. 6. epi. primùm moriuntur, nouissimè formàtur in corpore, operiuntur morientibus. In oculis etiam animi sedem, & maxima animi indicia existere autumat Plin.

An oculus sit coloratus? omnia corpora colore participant, lib. de f. & f. Itaque oculi triplici coloris genere distinguuntur, nigro, caprino, cæcio. Et totius corporis colorem, oculi quoque color consequitur. x. probl. 13. & 5. de g. anim. Attamen si humores oculi colore peccarent, secundum coloris naturã hallucinatio suboriretur, proin arquati quicquid vident, pallere arbitrantur. Sed de oculorum coloribus fusæ differuit Portius. Glauci oculi die minus vident, contra nigri interdiu magis quàm noctu cernūt. Oculi claritatem facit exiguitas humoris, nigritiem verò humoris copia. 5. de g. anim. At Gal. glauci causam ait splendidi luminis copiam & humoris crySTALLINI, situmq; prominentiorem. Locus orbita, interuallum pro sua magnitudine habet minimũ. x. probl. rationem explanat Carpus. Eoq; fit, vt sensus dextri nihilo sinistris sint præstantiores. 31. probl. 13. & 19.

Oculi partes instrumenta non sunt. 1. ther. Muniuntur oculi genis siue palpebris atque ciliis. Expurgantur per foramen quod acantho maiori ad nasum pertinet. Mouëtur 7. musculis, componuntur quinque tunicis. Quarum adnata ex pericranio,

oio, cornea ex meninge dura, vuea ex tenui, arachnoides & retiformis ex nervis opticis produci-
tur. Inter has tunicas sunt tres humores. Aqueus
inter vueam & corneam. CrySTALLINUS primum &
principalissimum visus instrumentum, quod satis
propalat suffusio, totus vestitur arachnoide, nisi
qua parte insidet vitreo, à quo nutritur per diado-
sim, id est, transsumptionem. Vitreum verò alit ac
continet retiformis. Vbi album nigro coniungitur
in bulbo septem circuli cohærent, crassitie & co-
lore discrepantes. Ob id locus iris & corona ap-
pellatur. In cuius medio pupilla. per quam visio fit,
quæ non solùm est vueæ foramen, sed & totū cry-
stallino obiectum spatium, quod vueæ foramine
terminatur, in quo scilicet nulla tunica est inter
corneam & crystallinum media 10. de v. par. falli-
tur Plin. qui pupillam corneam vocat. Aristoteles
quoq; cui pupilla est humor quo videmus, in quo
sit sentiendi vis. 1. & 5. de nat. anim. & 2. & 3. de
animal.

Illa quæstio, de visione, quæ est oculorum actio.
1. ther. hoc loci tractanda non est, nam Plato, Gal.
Macrobiani visionem aiunt fieri, emissio in res ab ocu-
lo radio. In visione prodire ab oculis spiritum cen-
set Aphro. horum sententiam in probl. videtur pro-
bare Aristo. sed hanc refellit 2. de anim. Visio, in-
quit, est quidam motus factus ab aëre in pupillam,
quæ

quæ dicitur passio, & lib. de f. & f. visum fieri asserit, radio à rebus conspectis ad oculum recepto, instar pyramidis, cuius basis in re visa, & conus in oculo est, sed de his abundè scripsit Protospatarius. Certè constat in visione & emittere aliquid oculum, & recipere, vt arbitratur Plato & Galen. Nec malè Aliab. sentit egredi & regredi ab oculo ad oculum species incredibili celeritate. Quamuis Ocham nullas species hinc vel inde relinqui opinetur.

Visus præstat reliquis sensibus, quia multas rerum differentias monstrat, omnia nanque colore participant. Mira visus exempla apud Plin. An homo ab aquila vel lynce in visu superetur? secundum Aristot. acumen cernendi bifariam dicitur, primo quod procul cernere possunt, secundo quod differentias quæ cernuntur quàm maximè sentiat, quæ simul nullis eisdem contingunt. 5. de g. anim. atque ibi causa, inquit, cernendi tam acutè, vt differentie percipiantur, in ipso oculo est. At vt procul cernatur causa, situs est oculorum, vno oculo exquisitiùs cernitur quàm duobus, quia spiritus coactus confectusq; ad facilem sensum plurimum confert. Ex præfatis liquet quod organo, medio & obiecto rite dispositis, non contingit sensum errare, circa sensibile proprium.

Radius visualis est species rei visibilis, siue idolum
rei

ei visæ, quod non idem numero, sed idem specie videtur, nam continuo ad præsentiam obiecti recens generatur, triplexq; est, eoq; visus omnino triplex, directus, refractus & reflexus. De quibus Optica & Catoptrica Euclidis est. Speculis diaphanis plumbum supponitur, ne idolū pertrāseat, sed ad videntem reflectatur. Aspectus per rectam lineam fieri ex radio semper directo, quo nos sol conspicit, probat Aristo. 1. 1. probl. 6 1. cui subscribit Galen. 1. 10. de vis. par.

De omni visus offensa.

CAP. II.



Triplex est, debilis in amaurosi & amblyopia, id est, obscuritate & hebetudine, deprauata in hallucinatione & suffusione, abolita in cæcitate. Causa affectus qui ad totum oculum pertinent, vel ad primum videndi instrumentum, vel ad partes administrantes. Priores sunt 9. Atrophia qua minor redditur oculus, huic contrarius affectus est Ecpiesmus, id est, expressio, quando sic exprimuntur, vt exerti perseverent, Strabismus conuulsoria est musculorum bulbum mouentium dispositio, Paralysis resolutio est, vbi obliquæ oculi motiones, & quæ sursum & deorsum fiūt expediri nō possunt, Myopias passio est per quam ab ortu naturæ propinqua vident, remota non item, vnde Myopæ, id est, luscio

lusciosi dicuntur. Nyctalops vitium est, quo per diem homo cernit, sole occiduo obscurius, nocturno omnino nihil. Amblyopia est hebetudo visus, quæ fit quia spiritus crassescunt, vel tunicæ densantur, vel humores lentiores fiunt. Epiphora est omnium humorum ad oculos impetuosior fluxus.

Crystalloidis sunt glaucoma, & dyscrasiæ per se, vel cum affluxu materiæ, conuersio à sua sede ad angulos, superiora vel inferiora, & solutio continui.

Aquei humoris vitia sunt incrementum, defectus, crassitudo, & coloris mutatio. At in vitreo nulli affectus peculiare sunt. Apud Aristo. 5. de genim. aquei humoris exsiccatio glaucosis dicitur, quæ glaucis oculis sæpe accidere solet, ceu lusciofitas nigris contingit.

Nerui optici. Aporexis siue disruptio ex ictu. Parremptosis, vbi in neruum humor aliquis aperto vel rupto vase incidit, eumq; obturat. Symptosis meatum ex tabe facit arctiorem. Amaurosis est obstructio per quam visio aboletur, absq; alio circa oculum affectu.

Adnatæ. 4. apho. Taraxis, id est, perturbatio seu ophthalmia levis ab externa causa. Ophthalmia seu lipitudo est inflammatio à causa interna. Chemosis est quum vtraque palpebra ex vehementi inflammatione adnatæ distorquetur, vt vix oculos oper

operiant, & album oculi nigro sublimius sit, & rubrum ac multam nigri partē occupat. Pterygion, id est, vnguis neruosa adnatæ eminentia, quæ ab angulo maiori oritur, & progreditur vsque ad corneam & pupillam. Pterygiorum alterum genus quum adnata in callosum tuber excrescit, quo piscatores maximè infestantur, vt ait Cassius.

Corneæ crassities, densitas, humiditas, partis pupillæ obiectæq; aciem visus hebetem efficiunt, phlyctenæ sunt pustulæ exiguæ ab ebullitione dictæ. Hypopyon est pus sub cornea altius aut in summa superficie collectum humanis vnguis specie. Elce, id est, vlcera, quorum sex species. Carcinoma est cum rubore, & tensione tunicæ & dolore vehementissimo, qui ad tempora vsque protenditur.

Vuæ duo affectus: protosis eius procidētia, quæ à corneæ ruptione, vel erosione contingit, vnde fit myocephalon, id est, caput muscæ. Strapholoma, id est, vuatio, acinum ve vuæ, & melon si adeò augetur vt extra palpebras emineat. Elos seu clauus fit, vbi, obducta cicatrice obduruerit.

Pupillæ. 3. apho. Mydriasis eius dilatatio, phthisis eius diminutio, hypochysis vel hypochema est infusio humoris lenti in pupilla concreti. Senes nō bene vident, quia cutis pupillæ illis obrugat, vt ait Aristo. 5. de g. animal.

Ad

Ad duas tunicas simul adnatam & corneam pertinent duo vitia, hyposphagma, quando propter ictum fractis aut contusis vasis intra tunicas sanguis colligitur, & in extima oculi parte veluti sanguinis puncta apparent. Alterum vlc, id est, cicatrices, suntq; duplices. Nephelia vocatur, quando in summa oculi superficie consistunt. Leucomata quando altius radices egerint, illa albugines tenues, hæc verò albugines crassæ nobis dicuntur.

Angulorū affectus encanthis est naturalis circa maiorem canthum carnis excrescētia. Rhias eiusdem imminutio. Aegilops est abscessus inter canthum maiorem, & nasi os, qui ruptus si negligitur in fistulā abit. Anchilops dicitur priusquā diruptus in vlcus abeat. Epinyctis Plinio est vlcus in angulo oculi ex quo perpetim humor emanat.

Palp. aff. Ippos affectus est, per quem genæ sunt instabiles. Emphysema tumor laxis & indolens. Hydatis pinguis superioris palpebræ substantia pondere suo sic grauās, vt vix attollere oculum sinat. Ptilosis crassities calosa rubicunda cum pilorum defluuio. Anclyosis agglutinatio palpebrarum. Lagophthalmon vocant, quum retracta superiore palpebra oculis apertis dormiunt. Ectropion est inuersio propter cicatricem, aut carnis excrescentiam nascens. Inde ectropij. Trachoma asperitu

asperitudo interna duplex, fycosis ficus granorum refert similitudinem. Tylosis quum inueterata iam in callum abierit. Crithe est abscessus grano ordeï simile. Chalazion grando, tuberculum mobile rotundum & translucidum.

Ciliorum affectus pediculatio, defluuium seu glabricies. Trichiasis vbi pili inutiles & oculum pungentes enascuntur.

Visus præterea læditur ex spiritus visorij impuritate & paucitate. Impuritas quidem exactè, paucitas verò procul videre prohibet. Proinde si spiritus humidus & turbidus vt nebula, exiguus fuerit, neque exactè, neque procul cernere potest, si multus, res distantes videt, sed nō exactè discernit. Contrà purus, æthereus, paucus propinquas res planè discernit, & distantes non videt. At multus res distantes videt, & exactè discernit. Itaque ex proprio sensili visio dolore dicitur. nam atrii colores visum cogunt, splendores & candidi discutunt, denique sensibilibus excellentiæ sensum corrumpunt. 2. de a. Exercitatio oculorum acumini incōmoda, quia siccatur. Fumus oculos infestat. Aër post tenebras nimis luminosus ocissimè occæcat. Venę sectio frequens oculis nocet. Columborum syluestrium & gallinarum capita comesa cæcitatem faciunt. Zoar. Collyrium ex sanguine vel ex pulvere testudinis, vel balneū in quo proiecta sit testu-

To. I. Lib. III.

k

do cæ

do cæcos facit, teste Razio. Multa oculis contraria leguntur apud Dio. Plin. Ruel. Paduanum. Oculus citri succo illitus integra nocte, in obliquum torquetur. Ruel. Ocularij medicij præstantissimi sunt in Asia, Syria & Media, vt ait Alex. B. Stellæ minutæ, inquit, melius apparent hyeme, id est, crassiore aëre, quàm æstate, id est, rariore. Inde specilla quo crassiora sunt, eo maiora visibilium obiecta repræsentant.

De remedijs quæ oculis conferunt, quæ item claritatem afferunt, & obscuritatem hebetudinemq; pellunt.

C A P. III.

Oculos delectat cæruleus color & fuscus. Hic enim visionis essentiam cogit, citra violentiam. Addit M. colorem viridem, speculum tersum, & mediocres subinde literas legere. caputq; depectere, ac repectere. Serpentinum ius & caro comesta roborat visum. Auic. esus carniū rapacium. M. rapa Auer. folia raphani fatiui, Plin. Thymus in cibis caliginem abigit. T. P. Pica cocta & esitata reparat spiritus visiles. Arnal. puluis candi oculis immissus visum acuit Auicen. Ad idem prodest nux moscha. condita, quotidie sumpta. Chebulæ conditæ. Triphera minor cum 4. sui ponderis parte euphragiæ. Cōserua euphrag. & confectio quæ recipit euphrag. 3. ij. se. fen. 3. v. macis

macis, cubebæ, cinamomi, pip. lon. gary. añ. 3. j. cum
 liquore sequenti f. elect. R. mellis desp. lib. j. succo-
 rum depu. fen. 3. j. rutæ, chelidoniæ añ. 3. 8. reco-
 que simul ad mellis spissitudinem, dosis 3. iij. mane
 & vesperi. Collyrium. R. mellis 3. j. succi fen. depu-
 rati in vase æneo cum nummis aureis 3. iij. bulliant
 iterum parum & colentur. Visum etiam iuuat suf-
 fitus ex fumo decocti in aqua rutæ feni, & euphrag.
 M. Adipes piscium fluuiialium liquati & cum oleo
 & melle misti oculorum claritatem afferunt. Dio.
 Ali. Auic. Visum acuit si hæderæ lacrymam cum
 melle mistam illinas. Vel perdicis iunioris sangui-
 nem cum melle sine fumo ex æquo subactū illinas.
 Myrep. Item lumina reddit acuta, aqua stillatitia
 ex feni. verb. rosa, chelidonia, ruta. M. Collyrium ex
 oculo dextro Ericij in tenebris videre facit, teste
 Rasi. Huc refer puluerem, potionem diuinam, &
 collyria Mont. conf. 5 7. & 5 8.

Amuleta. lapis bostrychites gestatus ad aciem
 oculorum facit. Similiter contemplari assiduè sca-
 rabeum coloris smaragdini. Marcel. Soli gemma-
 rum smaragdi cōtuitu oculos implent nec fatiant,
 Plin. In hoc etiam commendat lapidarius sapphy-
 rum. Oculi cornicis collo suspensi sanant omnem
 oculorum infirmitatem. T. P. Radix corrigiolę de-
 crescēte luna collecta & collo appēsa arcet omne
 malum ab oculis.

k 2 Ad

Ad denigrandum oculi pupillas. Cinis putaminum auellanarum cum oleo perfuso syncipite. Dio.lib.j.

De ophthalmia.

CAP. IIII.

Est oculorum phlegmone, ex accidenti tamen oculi morbus esse videtur, est enim inflammatio membranæ quæ corneæ innascitur & adheret. Duplexq; est: humida quæ cum fluxione infestat, & sicca citra fluxionem. Diuiditur etiam in veram quæ fit à causa interna, & non veram ab externa factam. Causa, fluxio decumbens oculis ab ipso capite decurrit, 2. de diff. fe. lippitudines ferè omnes instāt repleto capite, quibusdam exceptis, quibus oculi præualidi sunt. 3. apho. com. 12. Confluxus causa duplex, vna est pars quæ trāsmittit, vt copiā superuacuum, vel qualitate molestum. Altera est pars quæ affligitur, quæ vel recipit fluxum quia imbecilla, vel attrahit morbofo calore, aut dolore obsessa. 13. ther.

Dignostica. Ex agnatę mutato in rubrū, colore, dolore, lacrymis & sordibus ducuntur. Videndum, inquit Tral. vnde id quod influit procedat. Nū ex toto corpore, an ex solo capite. Item vtrum per arterias, an à venis vel vtrisque profluat. Nam humores ad oculos fluunt, vel per venas supra cranium,

neum, vel per venas sub craneo existentes, vt ait Galen. 4. de oculis. Quale autem sit quod influit, ex colore, & doloris specie facilè depræhendetur, sed ex gramis inflammationis tempora colligit Auicen. Cruciatus luminum omnium maximè excruciat: est enim oculus acerrimi sensus.

Præſag. est morbus contagioſus, repetit per circuitionem, pestem præcedere solet. Alterius oculi morbus grauior & diuturnior quàm vtriuſque, eſſe conſueuit. Lippitudines ſiccæ fiunt, ſi ab hyeme aſtrali & pluuiosa, ver ſiccum & aquilonium fuerit. In ſicco autumno & aquilonio lippitudines. Aestate lippitudines. Nonnulli poſt lippitudines acutiùs vident. In oculis morbos cū luna increſcere ac minui prodiſt Plin. Grāma ſeu gramia (inde grammofi oculi) ſtatim in principio lippitudinis appa- rēs, cruditatis ſignū eſt, & diuturnā fore ſignificat. Deterrima quæ oculorum alba adeo inflata, tumidaq; habet, vt nigredinem obtegere, palpebrasq; inuertere videtur. Lippientē alui profluuiū corripi bonum. 4. aph. Oculorum phlegmone ſola purgatione per aluum vno die perſanat. 13. ther. Oculorum perſæpe dolores grauiffimos, è directo humeralis ſectio, intra horæ vnius ſpatium cōpeſcit, lib. de phleb.

Method. m. conſiſtit influentem materiam ad oculos auertentibus, & repellentibus anodynis, in

k 3 his

his quoque quæ materię reliquias digerunt. Victus quoque ratio salubris est, si causæ & morbo cōtraria sit, hoc est tenuis & refrigerans. Non māduet, sed sorbitionibus vtatur, ne moueat oculum agitatione maxillæ, vt monet Vegetius: nam membra per motū recipiunt influxus à cerebro prouenientes. 6. epi. Auertunt clysmi acres, & sanguinis missio ex axillari, sicyæ cum scarificatione in scapulis affixæ, ligaturæ dolorificæ, & extremitatum frictiones, cathartica quoque quæ pessum deturbant. Repellunt anacolymata, & collyria frigida humida, sed efficacius adstringentia, quibus si dolor vrget, admiscere oportet anodyna. Verū agglutinentamenta repellentia nocēt, si materia per venas & arterias intra cranium fluctuat, si quidē illam versus neruos opticos impingūt. Auicē. Oculi secundum naturam venas amplas habentes, & sanguine plenas, item qui glaucis sunt oculis omnino non ferunt collyriorum adstrictionem, vt ait Aet. Diurnas oculorum fluxiones traducere oportet ad fauces. 6. epi. com. 2. Super lippitudine caput contundisse iuuat. Aphro. lippientibus cæruleus viridis, fususq; color confert. Albus & splendidus summe aduersatur, reliqui ambigunt, sed collyria quàm poterint sustineri calidissima consulit Scribonius. Periculum à repellentibus est ne quod influit in oculum impetum faciat, fugere oportet cataplasmata

mata in oculis calidam fluxionem habentibus. Ad lacrymam aranæ imaginationem dans, infunde oui candidum præcalesfactum & nō lac, quoniam id ab immodica caliditate torrefactum velut arenulas quasdam producit.

Collyria salubria fiunt ex aquato oui cum aqua ros. & muccagine se. cytr^{*}iniorum & psyllij & cum ^{cit^{*}oniorū} tutia præpa. in aqua ros. his licet addere sief album sine opio, fiunt etiam ex lacte mulieris sanæ cum zucaro. Vel ex aqua ros. plan. solatri cū tutia præpa. in aqua ros. mucc. psylli & momento amyli & candi. vel cum tutia & margaritis & aq. ros. vel cum lacte hominis aut asinæ cum mucc. se. cytoniorum. Lac mulieris cum luteis ouorum & rozaceo mitigat & digerit igneas oculorum inflammationes. Collyria fiunt anodyna per mistionem se. papa. albi vel sief albi, emplastrum de pomis anodynum s. ex carne pomorum dul. sub cineribus coctorum cum farina ordeï lacte mulieris & lactice rosaceo, cum luteo oui. Collyriū polychrestum, tutiæ præparatæ 3. j. candi 3. s. aloes 3. j. s. chalcitidis vstæ 3. s. camphoræ gr. vj. cū aqua ros. & pimpinellæ f. Ad lippitudinem dolorem scabiem & vlcerationē. & tutiæ præpa. 3. s. adipis porci rec. sine sale 3. j. amyli rec. 3. vj. fiat vng. lotū ter cum aqua solatri, illine intus & extra palpebras. Lippitudinis medella est pulegij farina palpebris in vigore agglutinata,

Florentinus. Oculorum morbis omnibus à causa calida siue frigida conducit aqua calendulæ. Agric. Reliquias materiæ ex oculo vacuant decoctum se. fœnugræci vel meliloti ex spongia, vel linteo molli oculis admoto.

De purgantibus vtilia sunt sy. ros. catharticus, decoctum myrob. flauorū cum tamarindis prunis iuiubis & manna, vel r. cassiæ nigre diapruni simpl. añ. 3. vj. elect. rosati M. 3. j. cum decocto cōmuni f. potio. Caustica ex cantharidibus pistis retro aures sunt vtilia, & rubrificantia ceruici admota vel humeris. Insuper balneum aquæ calidæ ad manus, brachia & crura per duas horas ante prandium & cœnam ab oculis materiam confluentem auertunt.

Amuleta. lapilli in ventre hirundinum inuenti albi & nigri, si lupino aureo includantur, & collo suspendantur, omnem dolorem oculorum perpetuò auertent. Marcel. Oculus canceri fluuiialis appensus dolorem oculi lenit. Ras. Oculi lupus gestatus ophthalmiam sanat. Kiranus. Idem præstant oculi fellis collo ligati. Plin. Oculi cornicis collo suspensi sanant omnem oculorum infirmitatem. Richard. Saphyrus & smaragdus oculos quos sæpe tangunt, sanant. Lapidarius.

**
felis*

Ad epiphoram & lacrymas. C A P. V.

Lacr

Lacrymæ nihil aliud sunt quàm aquosus humor ab oculis profluens. Earum materia esse videtur ex sanguinis sero, sed cur mœrentes & lætius ridentes lacrymantur, an quod illi pororum densitate extrudunt quod in ipsis est humectum: tristitia enim frigiditatem facit, & pororū densitatem. Gaudentes verò raritate atque laxitate eorundem humida effundunt. Ridentium lacrymæ frigida videntur, quia calor tum maximè per faciē diffunditur. In timore lacrymæ non fiunt, quia repente humores & spiritus retrahuntur ad cor. Aër quoque frigidus occursans currentibus lacrymas mouet, quia contrahendo carnem exprimit serum. Lacrymæ ex mœstitia calidæ sunt, sed ex oculorum morbo frigida, nam quod incoctum est, frigidum morbosumq; est.

Epiphora à causa calida ferè remediis lippitudini dicatis curatur. Confert assiduè faciem lauare oxycrato, vel succo plant. prodest etiam collyrium ex tutia imparata amylo & muccagine sc. psylli cum aqua rosacea oculis in linteo superposita. ℞. corticum chebularum aflatorum in pane 3. ij. croci 3. S. cum aq. solatij f. colly. Aliud vbi adest pruritus & rubor. tutiæ præpa. 3. ij. lapid. calaminaris 3. j. coralli rub. assi 3. S. cum adipe porci rec. f. vnguentū. Aliud. ℞. lap. ematitis puluerati & loti decies in

k 5 aqua

aqua frigida 3.ij. spodij, coralli albi & rub. charabæ, corticum myrob. citrinarum añ. 3.j. succi extremi-
tatum rubri 3.iiij. conquassentur omnia simul in
mortario lapideo, & serua in vitro obturato, & sæ-
pe in die imponat oculis & palpebris. Epithema
oculis humorum affluxum reprimens. R. glaucij
præparati succi ros. aloes lycij santali rub. nucis in-
dicæ croci ori. añ. 3.ij. commista cū succo corian-
dri finguntur collyria, vnum illorum intybi succo
aut rosacea leuigatum fronti ac palpebris inungi-
tur. Agglutinamenta croci mastice. añ. 3. j. acatiæ
fang. drac. añ. 3.iiij. cum aquato oui fronti vel tem-
poribus imponatur. Aliud se. alterci albi 3.j. oliba-
ni 3. S. cum albo oui & aceto applicatur. Aliud
anacolina Valeriani, cochleæ sine putamine tritæ
cum thuris polline fronti illinuntur. Ricini bouis
fronti illiti sine mora lacrymas stringunt. Aliud M.
aloes, tutiæ, sief, memitæ, lycij, boliar. añ. 3. S. cum
albo oui imponitur. In causa frigida. R. sy. rosati cū
agarico 3.iiij. cum decocto corticū myrob. chebul.
indarum liq. & passa. f. potio hydragoga. sumat die
sequenti theriacis bonæ 3.j. Errhyna conuenire
videntur, nam per foramina & meatus nasi, qui in
canthis sunt egrediuntur superfluitates ab oculo
ad nares effusæ. 4. de v. par. Item purgatur cerebrū
mansa radice pyretri, vt ait Serenus, vel mastiche
commansa, vel frusto agarici masticato. R. maio-
ranæ

anae, hyssopi, betonicę añ. m. j. sinapis ʒ. ʒ. f. deco.
 cui adde oxymellis ʒ. ij. f. gargarismus. & olibani
 nast. sandaracę añ. ʒ. ʒ. f. empl. pro coronali, aut
 & macis, gary. corticis citri sicci, milij añ. 3. j. sanda.
 ʒ. ij. rosarum, conus cupressi, iridis florentiæ añ. 3. j.
 ʒ. f. pul. pro vertice. Vtilis erit reuulsio per sinapif-
 num in occipite raso adapplicatū, & interceptio
 per anacolimata, ex aloe & thure cum muccagine
 cochlearum fronti illita, vel ex cinere lanę sordidę
 cum aquato oui. Decoctum serpylli, betonicę, &
 radicum feni, ex aqua chalybata oculis impositum
 lacrymas fccat.

De suffusione.

CAP. VI.

Hypochyma & hypochysis dicitur, est
 enim humorum affusio inter corneam
 & crystaloidem cōcrescēs, vel pigri hu-
 moris in cornea iuxta pupillam concre-
 tio. Visus autē deprauatur circa suffusionis initia,
 imbecillitatur dum illa increfcit. Aboletur vbi cō-
 pleta est. Paulus tamen retur omnes suffusos lucem
 videre aut multam aut paucam. De loco suffusio-
 nis Galen. inquit, est media inter crySTALLINUM &
 corneam. 10. de v. par. est aqua cōcreta inter rha-
 goidem & crySTALLINUM. 4. de ocul. vel inter albu-
 gineum & crystaloidem. 4. de v. par. vel inter cor-
 neam & vueam, vt ait Iesus, nec in his syngraphis
 est

est pugnancia, vt putat Sauanarola, sed his constat, quod suffusio solius pupillæ morbus est, scilicet in via & numero. In suffusione sic obstruitur solaris luminis meatus, qui in tunica ragoide habetur, vt proprium visus instrumentum non amplius cum ambiente aëre iungatur. 7. de plac. Hypochyma nullius similiarium est morbus, sed oculi totius vt instrumenti. 2. ther. suffusionis tria genera apud Vegetium, imo plurima, magna, parua, completa imperfecta, crassa, tenuis, aërea, vitrea, subalba cerulea, glauca.

Causa externa, ictus, vomitus. Interna remota fit per consensum neque calefactis neque intentis oculis, sed solo vapore per ipsos transeunte. Eueniunt suffusionis accidentia affecto ventriculo. Suffusio oris ventris aut cerebri cognatione accidere solet: fit etiam ob consensum cum cerebro in delirio, & fit etiam fumis elatis per venas & arterias in oculum cum optico deductis, pupillam opplentibus. Rursus ob consensum efficitur cum toto corpore in febribus crisi instante per sanguinis fluorem è naribus. Itaque solet phrenitim sequi. Accidit quoque potissimum ex perfrictione atque imbecillitate spiritus visilis, si credimus Paulo.

Digno. partes in superficie constitutæ, vnà cum affectuum suorum proprietate facile sensibus præhenditur. Suffusionis initio pupilla tenebrosior
aut

ut turbidior, aut non exactè pura. Si plurimum
ducta fuerit crassitudo visum prohibebit. Comple-
ta visum prohibet. Talia apparent visa quale est,
per quod cernimus medium. Proprio ne affectu
an per consensum oculi suffusione infestentur, ex
visis quæ præ oculis obuersari videtur, ceu culices,
aut circa lucernas circuli, alia' ve lucentia aut te-
nebrofa corpuscula, quorum assiduitas proprium
affectum, intermissio verò per cōsensum fieri por-
tendit. Insuper quum vtrique oculo muscæ aut cu-
lices aut quid simile occursare videntur, ex affectu
ventriculi malum pendet. Si autem altero tantum
oculo huiusmodi apparitiones conspiciantur, vi-
tium oculo proprium esse iudicatur, sciendum quod
suffusio differt ab obscuratione, & glaucedine,
quòd in his laborantes ne fulgorem quidem vi-
dent, contrà omnes suffusi fulgorem vel multum
vel paucum intuentur.

Præfag. suffusis quibus altero oculorum clauso
pupilla clarior apparet, hi sperare debent, vt facta
perforatione visum recuperent, quibus verò non
dilatatur, ab omni spe recuperandi visus excide-
runt, nam si suffusio moderatè coaluit, ad eductio-
nem idonea est. Contrà si immodicè & confirma-
ta sit. Moderatè autem coaluit, si quadam ex digiti
impresione fusio oboriatur. Et hæc ferri aut aquæ
marinæ aut plumbi colorem habet. Si verò nulla
figuræ

figuræ immutatio ex digiti impressura obuenit, supra quam par est cōcreuit, & gypso similem colorem habere solet, vt ait Aeg. Quæ glaucescit suffusio, insanibilis est, sententia Aetij. Hypochyma incipiens digeritur, vbi diu consistit, non potest. 1 4. ther. Suffusio quæ inueterauerit, manu curanda est. Inter initia nonnunquam certis obseruationibus discutitur. Cel. lib. 6. Florus nubeculans odio equum habet. 9. de nat. anim. Ergo oculi non tantum homini deprauantur, vt scribitur 10. probl.

Metho. m. quod in corpore toto genere præternaturam habetur, id prorsus tollendum, quod si tolli nequeat, est transferendum, vt in hypochymatis. Promissiones medicamentorum quæ suffusis conueniunt, magnæ sunt, verum effectus aliquando nullus, vel valde exiguus. 4. $\pi\lambda\tau\acute{o}\pi$. Ergo in contumacibus paracenthesi vtendum, quæ fit acuta solida, vel secundum longum perforata, apud Salyc. & Arnal. Oculum sanare ante totum caput non licet, neque hoc ante totum corpus. 4. ther. nisi materia esset pauca, vel morbus exiguus, cui sat sit topicum auxilium citra totius corporis euacuationem, vt consulit Gent. 1. tertij. Præterea vniuersa curandi suffusiones ratio duplici notitia eget. prima præparatoria, cuius institutum est totum corpus ab excrementis, & caput ab omni dolore immune reddere, secunda est apotherapeutica, qua succurrendum

lum est suffusionibus. his enim curandis theore-
mata sex sunt necessaria. primum est cognitio il-
lius instrumenti quod est pungendum. Secundum
illius particulæ huius instrumenti quod est pungen-
dum. Tertium mēsuræ pro affectus ratione. Quar-
tum conuerſionem respicit. Quintum remotio-
nem suffusionis à loco, quem occupabat. Sextum
circa aſtrictionem verſatur, iſthæc de punctoria
medendi arte docet Galen.

Auxilia. laqueus in ceruice vel occipitio pro-
deſt, vel causticum ſcapulis, ceruici aut humeris
admotum, ſunt enim vlcera aliorum morborum
medellæ. 6. epi. De catapotiis conueniunt pil. ſine
quibus, pil. lucis, & elect. Galen. quod recipit ſpicæ
3. ij. ꝑ. cinamomi 3. ij. agarici ꝑ. vij. maſtichæ ad
pondus omnium mellis vel zucari q. ſ. ſumat quo-
tidie 3. ij. Caput roboratur ne facilè fluxionem ſu-
ſcipiat oxyrhodino, & aſpergine pul. macis gary.
ladani, cocci.

Suffuſiones diſcutiunt ſuffitus & collyrium de
calamo aromatico Vigonij, Aqua ſtillatitia Leo-
nelli. Altera P. Hiſpani apud Arnal. Colly. Gal. 3. de
facilè parab. Aliud de felle perdicis Sexti. Aliud ex
ſucco fœnic. melle & felle caprillo. 4. κατὰ τόπον. Ad
ſuffuſionem muris ſanguinem, & galli fel & lac ho-
minis añ. miſce, & bene ſubactis vtere illico. viſum
reſtituit. Aliud. bacchas lauri cortice libratas nu. x.
gummi

gummi 3.ij. ex aq. cœlesti fiat colly. Ad obtusam visionem, & imminentem hypochysim baccarum lauri purgatarum 3.x. tere cum vrina pueri & cum gummi 3.j. inunge oculis. Ad idem, chelidoniæ & conizæ succum cum melle inungas. Et succus fœnic. benefacit non solum ad præfata sed etiam dissipat & detergit antiquas ægrit. oculorum. Ut cataracta ab oculo auferatur citra ferrum, foliorum violæ, albæ, sem. raphani hortensis añ. 3.j. ammoniaci 3.8. puluerata balsamo optimo misce, quod mane & sero oculo inferere: non ambige quin mirabiliter subueniat. Ad idem finum corui aut fel mixtum cum melle sine fumo, in oculo super maculas impositum ocyus præseruat. Ad cæcos & caliginem oculorum ex cinere capitum pullorum hyrundinis cum balsamo fiat collyrium. Peucedani succus cum succo fœniculi & lycio tritus, oculo immisus sanitatem restituit. Morgellinæ agrestis succus de tertio in tertium diem oculo iniectus idem præstat, etiam panum in eo factum consummat. Ex Nic. Alexan. Collyrium cæcis visum restituens scribitur à Marcello. Ad caliginem incipientem, suffusionem & leucomata, ex felle vnius perdicis cum oppobalsamo & æris ærugine, fiat collyrium: ferua in pixide stannea vel argentea, inde inunges & miraberis vt prodit Sextus. Ad idem fel perdicis cum mellis æquo pondere laudatur à Pli. 29. cap. 6.

cap. 6. potio Montag. co. 59. R. aquæ roris marini calidæ ℥. ij. dissolue in ea salis gemmæ ℥. ij. fiat collyrium quod sæpe in oculos iniiciatur ad obtusum visum. illustrat humores oculi & confert suffusioni. Aliud restaurans visum. R. masticis pul. cymarum eufragiæ añ. ℥. j. zuccari ℥. ij. fiat pul. de quo in omni cibario ponatur & ante cibū & post accipiat. Aliud quo decrepiti ferè cæci curati sunt. masticis ℥. j. euphragiæ ℥. iij. fiat pul. sumat coclear medium semper ante cibum. Odorari frequenter maioranam confert ex Monta. qui etiam laudat impensè aqua extillatam ex xyloaloe pro collyrio. Potio ad visionem tenebrosam, quæ etiam arcet suffusionem Monta. conf. 57.

Ad nyctalopas, id est, eos qui serò nō cernunt. Ex felle hirci cum melle illinito. tollit vitium paucis diebus. Vel obline ex sanie hepatis hirci, quæ fluit dum assatur, suffiantur vapore assati hepatis oculi. detur etiam iecur comedendum Trallia. vel suffumigantur vapore aquæ salis & calidæ in qua elixatum sit capræ iecur Sext.

Myopiasis insanabilis est, sunt enim Myopiæ qui primo natali die propinqua sanè vident, remota verò non item. Aeg. Ad dilatationē pupillæ seu mydriasin causā vomitus factam Zoar sanatus est collyrio ex aqua ros. vel syrupo rosato pluries iniecto vt testatur lib. 1. Ad sebel. pulvis putaminum

To. 1. Lib. 111.

1

ouor

ouorum recentium elixatorum in aceto oculo aspersus, Auicen.

Ad oculorum maculas. CAP. VII.

AD maculas. Aqua fragorum extillata. Sardus. Instillata in oculum eas etiam tollunt collyria ex succo foliorum caprifolij tritorum, cum lacte. Vel ex succo morsus gallinæ depurato, vel ex succo centinodie. Vel ex succo parietariæ cum albumine oui agitato & despumato, vel ex succo fœniculi cum camphora. Maturatur macula ante vsum dissoluentium cum oleo de auellanis. Cinis cochleæ cōbustæ sanat. Item cinis cornu cerui impositus, pulvis optimus fit ex rosato zucco, & sale gemma Cinis quoque fimi humani efficacissimus est. Author T.P. Qui in hoc etiam laudat collyriū ex calcitide, rutia, aloe, & aqua rosarum, & aquā artificiosam P.H. Oculorum vuas, pustulas, vlcera, & veteres fluxiones sanat succus foliorum oleæ syl. Idem præstant nuclei palmarum cremati. Ruel. oleum de fisticis eradicat caliginem à variolis factā offultum p. 4. Ad panum se. centri galli pulueratum offultum, id est, impositum oculo quotidie sanat. Arnal. Mulsæ extenuant crassam oculorum pituitā, & nasci prohibet instillata. Trall.

Ad

Ad oculi vnguem.

CAP. VIII.

AD vnguem & maculas. Ad panum valet collyrium ex pul. radicis ireos vel iridis cum aqua rosarum carnem superfluam leuiter corrodit. Plat. Cōuenit aqua metallorum Arnal. primo breui. c. 18. Instilletur succus rad. lilij vel succus portulacæ. syl. Vel sanguinis anguille viue. Autor T.P. Vel succus virgē pastoris. Arnal. zinziber fricatum super cotem cum vino albo impositum. P. lucrator.

Ad vlcera.

CAP. IX.

AD vlcera succus foliorum oleæ. syl. nuclei palmarum vsti. Ruel. ℞. alba duorum ouorum aque rosaceæ ℥. ij. his bene subactis adde æruginis æris gran. iiij. fiat collyrium Montu. myrrha vlcera oculorum explet Ruel.

Ad fistulam.

CAP. X.

AD fistulam cant hi maioris succus plantaginis, vel puluis tussilaginis inspersus sanat. Dio. succus solatri depuratus instillatus. vel ℞. aloes, thuris, sarcocol. sang. draconis, balaustiorum, antimonij, alumnis zuccarini añ. ℥. ij. ziniar. ℥. s. fiat sief. & cū aqua collyriū
 1 2 instil

instillantur iij. vel iiij. guttæ supino à puris expressione digito facta. Varig. huc pertinet etiam collyrium polychrestum Montui. Aqua Castri villani. Aqua Io. Ariminensis. Collyrium Monta. con. 61. Alica ex aceto cocta & leuigata non modò incipientes ægilopas, sed etiam iam inueteratos & in pus conuersos mirabiliter sanauit. Interna arundinis membra cum melle vel per se imposita perfanat: est enim quod rotundum circa nodos inuenitur. Ad vlcus ægilopis vitrum tritum cōuenit. Act. Ad palpebras inuersas humor florū luteorum qui per se in vitream ampullam destillat, quæ plena floribus diebus pluribus sole continuo macerantur, vnde liquor in fundo residet, qui salubriter imponitur.

Ad albugines.

CAP. XI.

AD albugines collyrium. Concoregij linguam vulpis viuæ arefactam phœnico ligabis, & collo suspendes. Marcel. Ad albuginem, argemata, nephilium, glaucoma, pterygion. fiat collyrium ex felle capræ vetusto cum modico vini & melle. Sext. Anemone herba etiā portata vel subligata collo eius qui glaucoma patitur intra dies 45. eum sanissimum reddit, si Marcell. credimus. Albuginem tollit collyrium ex succo morsus gallinæ cum succo cymarura

ram rubri iniectus Richard. Anemone omnis succus cicatrices oculorum exterit. Ad albuginem in pueris mater ammoniacum commandet, & in pueri oculum sufflet, butyrum liquatum solùm illine. Aet.



ANASCEVES MOR-

BORVM, LIB. IIIL.

*De aurium affectibus.**De omni auditus offensa.* CAP. I.

VNCTIONIS auditus noxa triplex, à debilitate quæ *δυσλειτουργία* dicitur surdaſtri fiunt. Abolitio quæ *λωφωσις* vocatur, ſurdos reddit. A deprauatione quæ obauditione appellatur, ortum habent ſonores, ſibili, tinnitus, murmura, bombi, nam in auditu ſonitus, & ſtrepitus præter naturam ſunt.

Cauſa in primo inſtrumento, ſiue vbi meatus dilatatum neruum attingit, octo dyſcracia, obſtructione, continuiq; ſolutio. Qui etiam morbi incidunt

1 3 aliquan

aliquando in meatibus in anfractu auris existentibus, & in potentia audiendi, id est, in neruo & cerebro. Doloris ex proprio sensili causæ sunt vox aspera, grauis, celerrima, maxima. Nam audiendi instrumenta diuellunt, iuxta illud Ari. Sensibilibus excellentiæ sensum corrumpunt. Vnde accolæ cataractarū Nili sunt omnes surdi, apud Philostr. Diodo. & Cicero. Omnis surditas aut ob biliosum humorem sursum vergentem contingit, aut ob crudos crassosq; humo. auditum obstruentes. Surditas fit, vt inquit Galen. primo pror. ob humorē quendam impactum in auditoriis meatibus nihil quod malignum sit habēs, & interdum extincta audiendi potentia. Et alibi dolor auris, ait, efficitur ab inflammatione cutis meatum auris ambientis vel nerui auditorij, cuius nota est pulsus ferratus. fit etiam dolor à causa frigida, vt à flatu.

Dignost. Quicumq; affectus in aurium oculis obiecta cōcauitate oriuntur, rationali inuestigatione non indigent. Illæso verò apparente aurium foramine, si præter audiēdi facultatem nihil læsum est, neruum proprium affectum esse haud obscure cōiicimus. Obauditio continua fit per essentiam. Interpollata per consensum. 4. 1. Ex soni differentiis materia flatus depræhenditur. Causarum sonitus aurium certa cognitio in principio haberi non potest. Non cōuenit citra artem aut cogitationem
curat

curationem auspicari, sed artificialem quandam coniecturam ex causis externis facilè licet colligere, si quis earum vires norit. Ad eos affectus qui nostram notitiam fugiunt, externæ causæ cognitio est utilis. 4. ther.

Prælag. argumentum incolumis auditus explicat Aristot. 2. de a. Surdi ab ortu naturæ muli, sed muli non fiunt qui ex morbo surdescunt. Surdi è naribus loquuntur magna ex parte, quia pulmo eorum vitiatus est, surditas enim detrimētum pulmonis est, vt autumat Aristot. 3 3. probl. 1 4. Capras audire per guttur, testatur Diodorus Siculus. Si pisces audiant in aquis vt credidit Plin. non solum in aëre fit auditio, sed etiam in aquis. Constat tamen aërem ex cuius collisione vel fractione sonus oritur, non nisi in aquis vehementer penetrare posse, quoniam aër aqua leuior sit. Quod videri potest aduersus Diuinum Hippo. lib. de flatibus, & Plinium 9. nat. histo. Surditatem per febres ortam hæmorrhagia, aut alius turbata soluit morbum. 4. apho. 60. Talis enim per consensum surditas fit. Vnde mirum non est si vacuatis aut trasmutatis noxiis humoribus cessent passiones, vt ait Galen. Itaq; quibus biliosæ deiectiones, hæ superueniente surditate cessant. Et quibus surditas adest, superueniētibus biliosis deiectionibus cessat. 4. aph. 2 8.

Aurium dolores vehementes permultos peri-

1 4

munt

munt, in consensum perducto cerebro. Aurium etiam dolor delirium gignit, quoties fluxio dolorem excitans confertim decubuerit in cerebrum. 3. prog. com. 13. Sordes aurium dulces mortifera. 6. epi. sordes enim fiunt à natura expurgante cerebrum, quum ex natura sua sint amaræ. sed fieri non potest ut euadant dulces, nisi ægrotante cerebro. dulcescunt itaque per eius colliquationem, ut sentit Galen. à natura aliena est purgatio per aures. Quãdoq; tamen & in infantibus etiam per aures cerebrum expurgatur. Inde cerumen aurium & marmorata.

Metho. m. In doloribus, affectæ partes exquisita quiete opus habent. Quicquid adhibetur mediocriter calidum esse oportet. Nullum frigidum auri adhibendum. Aures refrigerantur celerrimè, quod exangues, excarnes, & chartilagineæ. Auri dolenti instillanda pharmaca sunt prius calefacienda, ad lucernæ vel cereæ candelæ flammulam, tandiuq; ea instillare oportet, donec aliquid ex ipsis ad exteriorem partem regurgitet. Nihil debes infundere dolore vexatis, neque per lanam instillare quod præstet. Neque omnino contingere, doloris tempore auditorum meatum. At remisso dolore par-^{auditor}tem dolentē fouere licebit, & iniicere salubria tepesacta, postea forinsecus vniuersæ auri mollem lanam imponere, diligenter cauēs ne aliquid aliud graue

graue aurem contingat. Porro Medicus omnino anniti debet, vt sciat quæ & qualis & quanta sit morbi causa, & vbi maximè ea dominetur, quo videlicet curationem vnicuiq; cõuenientem faciat. *In vnaquaque affectione proprio pharmaco vtendum.* Nam in vna quaque affectione proprio pharmaco vtendum, vt docet Galen.


Ad auris inflammationem. CAP. II.

Remedia, si inflammatio adsit, statim sanguis ex humerali vena eiusdem lateris mittendus est. Et si moderata sit inflammatio & non pulsatilis, rosaceo & aceto simul temperatis tepesactis atque infusis curatur. Ad vehementissimos dolores fiat collyrium ex opio, lacte muliebri, & oui candido. Aliud ex opio castoreo & sapa. Iuuat anserinus adeps adiectus cum butyro receti liquato & lacte muliebri. Adeps gallinaceus anserinus cum succo papa. Aliud in oleo viol. & rosaceo confusis addatur opium & instilla. Aliud optimum ex adipe gruis anseris & sturni. Aliud in oleo violato & anethi bulliant onisci, & cum luteis ouorum, mometo croci, & vino grana. fiat colly. in causa calida. Ad magnos cruciatus decoctum ex calicibus papaueris, meliloto, chama. violis purpureis, cum se. altheæ, lini & farina ordeï, butyro rec. adipe anserino, oleo rosato & ^{*}rutaceo. ^{*}rutaceo.


l s quod

quod sedat dolores & pus maturat. *℞. rad. altheæ emedullatæ coctæ & cōtritæ lib. j. farine, scœnugreci, se. lini & florum chamæmeli añ. ℥. ij. butyri rec. ℥. iij. lutea ouorum v. tepens auri imposito.*


Ad aurium dolorem. CAP. III.

 D aurium dolorem à frigore. Flos picis & oleum Oniscorum laudantur à largo. Oleum de luteis ouorum chamæmeli anethi à Zoar. Confert item oleum nardinum amaricinum amygdalinumq; , si mediocriter calida infundantur. Aliud. *℞. cæpam vnam sub cineribus coctam, butyri recentis ℥. j. olei chamæmeli, rosarū añ. ℥. j. croci 3. j. fiat catapl. anodynum est, & ad suppurationem ducit inflammationem vel abscessum.*

Ad aurium vlcera. CAP. IIII.

 D aurium vlcera. Audiendi locus quia siccissimus est, ideo his eget, quæ valentissimè siccant. Naribus enim vlceratis magis siccantia conueniunt, quàm oculo, minus autem quàm vt auri quadret. *5. ther.*

Ad dolorem & vlcera. CAP. V.

 D dolorem, vlcera, & veteres passionēs. *℞. croci 3. j. castorei aloes myrrhæ lycij añ. 3. 8. simul tere, & cum melle collige, & resolut*

solutum cum oleo rosato & passio auribus instilla.
 Ad idem & foetorem. R. nucum nucleos viridium,
 oleo immitte, quos insolabis sub cane. de quo tepidum in aurem immittas. N. Alex. R. mellis 3. ix. aceti 3. viij. coque & despuma, adde æruginis 3. j. linamento imponitur. Valer. Ad supercrescentes aurium carnes, & nasi vlcera citra dolorē reprimens. R. aluminis scissi 3. 8. mifeos vsti 3. 8. æruginis 3. ij. lemnij sigilli, gummi, añ. 3. ij. cum aceto f. tro. vti-
 tor cum vino vel aqua. Act. R. lactis canini 3. ij. mellis 3. j. misce & infunde, & lana obclude, nihil potentius, etiam si intrinsecus cancerauerint aures. Marcel. Ad putredinem aurium & dolorem esdra Nicolai cum calæno distemperata valida est.

Ad aures humectas. CAP. VI.



D aures absque vlcere humectas, per arundinē insufflare iube misi in linteolo illigatum vstum, vel gallam in linteolo illigato vstam. In hoc etiā valet lotium, succus virgæ pastoris, volubilis, vitriolum, alumen, aristolochiæ.

Ad cophosin & surditatem. CAP. VII.



D cophosin & surditatem caput purgandum est, vtilis sunt pilulæ de hiera f. mastichinæ, alefanginæ, his fortiores sunt pil. lucis maio. pil. sine quibus, pil. arabi-
 cæ,

cæ, cocciæ, & aureæ. Ab his vtatur diabuglossato & borraginato, & aurea alexandrina, & gargariset acetum scylliticum ieiunus. Ad surdiginem, cepæ succus melle permistus, & instillatus dolorē sedat, purulenta expurgat, vermes necat, aquam ingressam omnemq; humorem educit. Marcel. Surdis auribus Zoar. instillare iubet olei ex se. sinapis guttulam vnam, diebus alternis. Myrep. infundit fellis leporis & lactis humani simul mistis añ. momentū. Surditati vel grauissimē. & origani colocynth. florum serpylli, maio. añ. 3. j. moschi, ambari, añ. 3. s. cubebarū ladani machir, styracis cala. añ. 3. s. olei amygd. & de lilio añ. lib. s. singula contrita misceantur cum oleis, & in duplici vase feruefiant x. horarum spatio, & ad vsum seruabis, sanat infusum. Al. B. Remedium omnium optimum est alsandengi Raze. quod recipit aloes 3. j. interioris colocyn. euphorbij añ. 3. j. terantur subtilissimē, & cum felle vaccino misceantur, & fiant sief qui ficcati fricentur super cote, & cū succo raphani imponātur auri.

Ad surditatem & tinnitum. CAP. VIII.



D surditatem & tinnitum. & radicum cyclamini 3. s. nucleorum persicorum, amygdal. amararum añ. numero iiij. pista infundātur in vnciis iiij. aquæ vitæ, per tres dies continuos, dein fiat fortis express

pressio, cuius guttulam in aurem instilla vesperi in ingressu lecti, & bombace aurem obtura, & sic alternis diebus repete. Ad sonos incertos. R̄. olci nardini ℥.iiij. origani ℥.v. colocynth. ℥.j. foliorum lauri xyloaloes añ. 3. j. feruefacito in duplici vase, donec tertia pars supersit, exinde percollatum folibus exponito, & ad vsus seruato. Huc refer Halantium ad surdos Trall.

Ad meatus obstructos.

CAP. IX.



D aurium meatus obstructos, eos liberant quæ lapides in renibus attulerunt, & omnia quæ tenuium partium substantiam absque mordacitate habent, vt cucumeris syluestris radix, bryoniæ, ari, dracunculi, centaureæ, & polij. 3. ὡς ἑστὶν.

Ad illapsa in aurem.

CAP. X.



D illapsa in aurem extrahenda, specillo resina tincto extrahe. ptarmicum nari- bus inde, & os obtura & nares, & hoc assidue fiat, donec exciderit. Adiuuat etiã concussio, illisq; extractis lenire meatum ex laniatione offensum oportet, sapa infusa. Si aqua intrauerit, adeps anserinus cum cepæ succo mistus infunditur, à Sexto. Si animal aures intrauerit, fimum muris ex aceto dilutum infunditur. fit etiam auricu

auriculare argenteum aut æneum quod fuctu materiam extrahit.

Ad aurium vermes.

CAP. XI.

AVrium vermes extrahit salvia, veratrum nigrum cum melle immittitur, suffitus ex absinthio confert. Ad sanguinis ex auribus eruptiones. Ne in grumum coeant, porri succum & acetum mista infunde. Vel succum marrubij & acetum dilutum. Aut punici mali in aceto cocti succum. Ad parotidas, lutea ouorum induratorum tria, cum adipe suillo recenti f. cataplasma, pluria ad parotides scripsimus, libro de auxiliis chirurgicis.

LIB

ANASCEVES MOR-
BORVM, LIB. V.



De narium passionibus.

De omni olfactus noxa.

CAP. I.



ORATVS est sensus perci-
piens odores. Nasus est via ol-
factilium, vt ait Auerrho. ideoq;
inseruit odoratui & respirationi,
siue sit simus, resimus, extans,
aquilinus, repandus, retortus,
rectus. Addit Herodotus, quod per nares odoran-
tur, & cerebrum expurgatur. Remissè tamen ho-
mo olfacit, & nihil odorabilem percipit absque
dolore, & voluptate, ob idq; sensorium nō est exa-
ctum atque perfectum. 2. de. a. Est autem olfactus
sensorium secundum Galen. in anterioribus cere-
bri ventriculis situm. Obiectum odor, qui est su-
mida euaporatio, siue qualitas odorabilis in halitu
existens ex mistis, ex sicco videlicet concocto per
vim caloris in humido. Nam odor est sicci, sicut
sapor humidi. Itaque odorabilem substantia va-
To. I. Lib. v. poro

porosa est, & calida, quum vaporum copia à calido excitetur. Horum quædam suauius, alia ingrata, quædam foetida. Suauius dicuntur quæ spiritui contento in vëtriculis cerebri familiaria existunt. 4. S. Insuauius verò quædam sunt boni & grauis odoris, vt moschus, ambarum, camphora, galbanum boni odoris, in sacris, & grauiter spirantis copias thymbræ. Alia sunt grauis & mali odoris, vt caper sub alis, & reliqua foetida, quòd scite exprimit Melanthon.

Medium aër & aqua. Nam animalium quæ versantur in aëre, nonnulla odorem alimenti percipiunt eminus, perguntq; ad ipsum, vt vultures & Tigrides, de quibus mira narrat Albertus. Quæ itē in aquis degunt, videntur odorem sentire, etenim pisces non omnes eadem esca capiuntur, & prius quàm appetant odorantur, vt refert Plin. Ex his manifestum est cuncta animalia non similiter olfacere, si quidem quæ respirant nō olfaciunt in aqua. Homo verò non respirans, sed spirans & detinens spiritum, non olfacit, neque eminus, neque cominus.

An per medium ad organum diffundatur odor cum halitu materioso? an per species à materia separatas? Certè si odor nutrit, eum diffundi cum halitu necesse est. Atqui in India esse homines qui odore tantum quem naribus trahunt, viuunt, referunt

runt Plin. & recentiores qui ad nouum orbem nauigarunt. Rursus quendam hominem ad odorem mellis 40. dies vixisse asserit Oribasius. Contra si ab odoratis aliquid in sensum deliberetur, minora ob eam rem reddi oporteret. Nunc autem quæ odoratissima sunt, hæc potissimum eadem edurant.

Olfactus insuper triplex noxa, aut quia vix, aut quia vitiosè, aut quia nullo modo fit. Causa est spirituum intemperies, sensorij dyscrasia, vel nasi obstructio, contusio, continui solutio. Quibus os palati subsidet media naris his deprimitur. Si aliquod ossium palati deciderit, necessariò medium nasi subsidet: vnde *σιμότης*. Si nares confractæ sint, non rectè possunt restitui. At si ex palato fracturam accipiant, resimæ euadunt, & insanabiles.

Digno. olfaciendi facultate læsa si vox seruetur incolumis, ad priores cerebri ventriculos morbus refertur, qui aut ex dyscrasia sola noxam conceperunt, aut ex humorum copia: sin autem vox quoque lædatur propter meatus ossium colatiorum obstructos, affectum rursus malis quibusdam succis contrahi censeto.

Prælagia. Abolitio olfactus sine catarrho prælagit febrem. Ex odore anhelitus qui à corde ad pulmonem venit temperatura illarum partiū, & affectus significatur. Prima enim functio cordis spiri-

To. i. Lib. v.

m tus

tus creat, secunda diastole refrigerat, & spiritus alit, tertia fumos expurgat. Nam omnia membra concoquunt. Atqui in omni coctione aliquid recrementi à puro reiicitur. Id igitur euenit in cordis coctione, proinde anhelitus odor ex corde ad pulmonem proueniens significat de temperatura & affectibus illarum partium. Itaque Auicen. 2. primi anhelitus, inquit, fortis est ad significandum dispositiones cordis, ex læsis item anhelitus speciebus colliguntur thoracis & cordis patientis indicia. 2. ar. p. Ex anhelitus quoque qualitate agnoscuntur, nam spiritus frigidus in acutis ex nare & ore prodiens lætalis est, primo prog. Et quum fœtor putredinis indicium sit, 2. progn. anhelitus fœtus putredinem spiritalium partium denotat.

Ad tetros narium odores. CAP. II.

Interdum contingunt ex colluie genita & retēta in meatibus, qui ex anterioribus cerebri ventriculis ad nares perueniunt. Tum caput purgare vtile, concocta materia cum syrupo de meliloto. B. vel de fumaris. M. cum melle ros. de purgantibus optima est hiera s. cum agarico, diaphenico, mastiche, rhabarbaro, confect. hamec. De topicis optimum est errhynum ex vino, in quo nux moschata, maccis, cinamomi, gary. calamus aro. rosæ, spica nardi deco

decocta sunt. Vel resoluatur in vino calido gallia moschata quo nares & os colluuntur. ℞. aloes, myrrhæ, croci, mast. xyloaloes, gary. añ. 3. j. f. pil. v. pro 3. cum melle ros. vel vino odoro, sumat iij. quando it dormitum & in aurora resistunt putredini & odorem deprauatum emendant.

Ad fœdum oris halitum. CAP. III.

E Oedus oris halitus, curatur sublacione causarum, quæ sunt vitia in ore, ventriculo, vel thorace. Odorem gratum ori præbent ista commansa agallochum, anisum, citrum malobathrum, myrrha, mastiche. Putorẽ tegit globulus ex galliamoschata intra molares detentus. Item chirotechæ, indufia, & vestes odorem iocundum spirantes. Collutio oris optima. ℞. foliorum & florum rorismarini añ. m. j. bulliant in vino albo cum momento myrrhæ, cinamomi, & assæ odore, id est, benioin, ex hoc vino colluat subinde os. Nares grauitè olètes emendat succus hederæ frequenter infusus, vel si nares muris osculetur. Aeger similiter proderit mulieri si nares mulæ basiauerit. Marcel.

Ad axillas tragaseas seu hircosas. CAP. IIII.

Ragus siue hircus apud Marcel. Grasos etiam putor ille dicitur, quando sub alis trux habitat caper, vt ludit Catullus. Ex

m 2 quib

quibusdam seminis reliquiis fit. 7. quarti, ideoq; le-
 pram prælagit, vt autumat Raz. in apho. Panthera
 sola odorata inter animalia, vt tradit Plin. Nos ta-
 men cercopithecus odoros subinde vidimus, vt ta-
 ceam de Sebellinis & de cato zibethico, quẽ qui-
 dam è recentioribus hyenam esse voluit. Itaque si
 credimus Plutarcho primo sympos. Alexandro
 per cutim iucundus odor expirabat, vt odorata
 fragrantia indusium satiare. R. aluminis liquidi
 ℥. ij. myrrhæ ℥. j. dissoluatur vino, & alas subli-
 ne, licebit etiam addere amomum spicam & alia
 quæ vnguentum reddunt odoratum. Aliud arg.
 spumæ ℥. ij. myrti ℥. ij. amomi ℥. j. vino excipiun-
 tur. Huc refer roseos pastillos. Dio. & alia permul-
 ta, ex libro nostro de salubritate.

Ad grassonias.

CAP. V.

Graffonix sunt odores corporis tetri, ad
 quos Aet. præscribit potiones. Item car-
 dii radix illita graueolentiam alarum,
 totiusq; corporis emendat. Item si radix
 decocta in vino bibatur, copiosam vrinam, foeti-
 damq; expellit, vt aiunt Dio. & Galen. Odor enim
 corrumpitur propter humoris & sudoris putrefa-
 ctionem. 7. quarti. Humorem autem corrigit &
 restituit euacuatio & purgatio, alteratio & bona
 cōcoctio. Euacuatio scilicet cacochemix accom-
 moda

modata, per deiectiones, sudores, & vrinam. Alteratio quoque putredinem arcet. 3 .ar.p.

De hæmorrhagia.

CAP. VI.

ERuptio sanguinis è naribus est symptoma, causa igitur morbus, quamuis enim sanguinis affectus inter causas numeretur, qui non est morbus. Est tamen morbi causa vasorum. Differentiæ sunt variæ, nam sanguis vel profluit à vena, vel ab arteria à capite, hepate vel splene, cum crisi, vel citra crisin, sed criticum profluuium non est sistendum, nisi copia vires prosterнат.

Causa sanguis cacochymicus vasa erodens, vel tam multus vt non possit contineri. Affectus vasorum, hoc est mollicies ex humiditate, duricies ex ariditate, tenuitas ex inedia. Vasorum apertio ex causis externis, vel clamore magno. In summa sanguinis profluvia ex vasis fiunt per anastomosim, vel diapedesim, vel anabrosim. Anastomosis, id est, oris vasorum apertio accidit & ob vasis imbecillitatem, & sanguinis qui ad os eius impetu ruit, copiam, & acrem quampiam quæ illi extrinsecus incidat qualitatem. Diapedesis, id est, dissolutio, oritur ex tunica rarefacta, sanguineq; tenuato. Accidere etiam potest ex gracilium vasorum ore adaperto: vnde fluit sanguis veluti transcolatus, & sudoris

m 3 doris

doris modo transmissus. Anabrosis, id est, erosio, vitiosi succi soboles est, vel fit à causa externa, vbi vena fuerit erosa. Anabrosis siue diabrosis dicitur. *phlegm* est vasis ruptio & nō anabrosis vt quidā putat.

Dignost. ex causis procartacticis, & ex præcedenti victus ratione, ex ipsoq; sanguine, & corporis habitu colligenda sunt.

Prælag. hæmorrhagia si ex membrana cerebri profluxerit, irrita curatio habetur. Anastomosis perniciosorū morborum, inflātionum internarum est causa. 6. de v. part. Nimium fluorem solet sequi aqua intercus. 2. aphor. com. 23. Sanguinis profluvio laborantes quum moriebantur in fronte non sudabant. 6. epi. Quibus cutes circuntenduntur, aridæ & siccæ sine sudore moriuntur. 5. apho. 71. Adolescentes postquam rem veneream agere, aut hircire incœperint, tum sanguinis ex naribus profluvio tentātur. 6. epi. Sanguinis è naribus profluvium fit, vel subpallidè atris, vel pallidè rubeis, vel subpallidis. ibidem.

Metho. m. curatur sublatione causarum. Aper-
tis vasis astringentia, ruptis glutinantia, exesis sar-
corica & boni succi alimenta remedio sunt. In his
frigido vtēdum vnde fluit sanguis, vel fluxurus est,
nō ad ipsum, sed circa ipsa, vt docet Hipp. Omnis
immodicæ euacuationis communia remedia re-
uulsio & deriuatio. 5. ther. Itaque hæmorrhagia
fistitur

sistitur victus ratione refrigerante & astringente, auertentibus sanguinem & sistentibus. Interdum conuenit sanguinem de cephalica vel interna detrudere hæmorrhoidas prouocare, & sicyas hypochondriis affigere, atque genitalia constringere. si verò non cessat, sicyam in occipitio admoue, cum aliquo infrigidante caput. Rubra obstruere oportet emplasticis, quæ ex lenta crassaq; substantia consistunt. Alba verò obstruere conuenit, vt galla, & alumine. 6. epi. ℞. mast. libani, sang. dra. pilorum leporis vstorum gypsi vsti añ. cum albumine ouorum f. agglutinatorium fronti, & trahat per nares aquam panis porcini, & volæ manus & plantæ pedum regioq; hepatis refrigerentur aqua plantaginis cum aceto acri confusa, faciem quoque totam per spongiam humore frigido & astringente vel posca, imbutam refrigerare confert. De assumendis vtilia sunt sy. de portulaca, myrtinus, de rosis siccis, tro. de terra sigillata, de carabæ, tro. stellæ. Sistit etiam hæmorrhagiam athanasia N. cum albo oui mista & naribus adtracta. Idem præstat philonium persicum cum succo mentæ liquatum & naribus infusum. Cepam rubeam acerrimam tusam odorandam da. statim sistetur, inquit Myrep. De escharoticis. ℞. foreos, atramenti sutorij, chalcitidis, myseos, gypsi, gummi añ. 3. & fiat puluis, insufflatus persanat. vel ℞. chalcitidis 3. iij. resinæ fri-

ætæ 3. ij. thuris 3. j. f. pulvis, vel gallæ chalcitidis añ.
f. pul. insertus naribus sanat. Oleum de vitriolo
sanguinem è naribus fluentem cum rosis sistit.
Euony.

Amuleta. cinis ranarum illitus profluentis san-
guinis impetus sistit. Dio. Idem pollet saculus ci-
nere ranæ plenus adalligatus. Gor. Iaspis & coral-
lus. Alb. Rana rubeta arefacta collo suspensa sa-
nat. Marcel. Dicitur prodesse sanguinis proflu-
vio, vt æger osculetur nares mularum. Valerianus.

De sternutatione.

CAP. VII.

Pæquòs, id est, sternutamentum est mo-
tus expultricis potentia deprauatus, spi-
ritum mittens è pulmone & capite, ad
purgandos meatus narium. Est fortior
motus quàm tussis, vt alias quandoque multas na-
tura hominibus salutis gratia ingenitas indidit pas-
siones, ad eundem modum & sternutationem &
tussim. 2. S.

Causa, sternutamentum sequitur grauedines.
2. progno. Est igitur causa humiditas mordax in
cerebro, & naribus quam spiritu natura conatur
expellere per narium angustias. Od idq; sonat. fit
ex capite cerebro calefacto, aut humectata parte
inani capitis, aër enim ibi contentus erumpit, &
cùm sono, quoniam per angusta exitus datur. Item
stern

sternutatio fit calefacto & refrigerato inani, quod est in cerebro, vt ait Aet. Qui solem aspexerint, & qui nares penna sollicitauerint, sternutare magis cōsueuerūt. 3 3. probl. Huc refer ptarmica cū simplicia tum composita.

Prælag. sternutationes capitis grauitatem sanant, imo etiam lethargum & profundos sopores, & cōsimiles, extrudunt etiam muccos ex cerebro crassos & viscosos. Conferunt, ei quæ vterinis molestatur. 5. aph. 3 4. Moribundos sternutatorio sollicitamus, tanquàm si hoc affici nequeant, spes nulla salutis sit. 3 3. probl. 9. sternutatio tollit singultum. 6. apho. 1 3. Ex accidēte purgat pulmonem & caput. 7. apho. 5 1. In morbis pulmonis periculum ostendit. 2. progn. frequens in febribus caput replet. 5. tertij. In sanis noctu non contingit, vt asserit Celsius.

Method. m. primùm curanda grauedo, hoc est affectus vnde nascitur. Curatur etiam subitariis animi affectibus, videlicet ira, tristitia & id generis aliis. Oculo perfricato sternutamēta desistunt. 3 3. proble. Sternutationem frigidam sanant olfactorio-la calida, & econuerso, vt docet M. facilè sedatur si interuallum fricetur, quod in radice nasi vtrique oculorum interiacet, aut frons aut collum fricetur. Acetum sternutamēta olfactu sistit, similiter anisum, laurus, ocymū, succus ocymi sternutationem

m 5

à pro

à proprietate sedat, vt scribit Isac. naribus attrahat aquam ros. cum aceto mistam. Clem. De assu-
mendis confert rob citri & sy. de mitta Hali.

De rheumatismo.

CAP. VIII.

Catarrhus seu destillatio est fluxio per
venas à capite ad partes inferiores, sed
destillationē nominamus vbi ad os ex-
crementum defluerit. Grauedinē verò
si nares infestat. Raucitas ob destillationem imbu-
tis faucibus fieri solet. Si ad gurgulionē fluxio de-
riuetur, aut vuam parit, aut alias in tumorem ipsum
attollit, si in oris adenas antiadas facit, si in partes
illi adiacentes paristhmia. Obiter notādum quòd
antiades de parte, & affectu dicuntur, sic tonsile de
paristhmia. Insuper fluxio defertur à capite non-
nunquam in ventrem, nonnunquam in asperam
arteriam, vtrilibet mirificè nocēs. Herodotus tres
tantum numerat differentias, catarrhum, corizam,
& branchum, sed communi vocabulo destillatio-
nes nominamus quæ à capite fluunt ad pulmonē
per asperam arteriam. Humor de naribus secretus
tenuis & incoctus, grauedo dicitur. Talis ex pala-
to secretus, dicitur defluxio. 2. prog. com. 49. Gra-
uedines in solo capite oriuntur. Capitis tamē gra-
uedo illa dicitur, quæ fit non à causa externa, sed
ob naturalem capitis infirmitatem. Inde grauedi-
nosi.

nos. 6. epi. fluxionem quæ à capite deferuntur, quædam tenuis, quædam crassa. 4. r. a. com. 30.

Causa externa, auster, boreas, frigus, insolatio, vel sub lunæ radiis dormitio, sub dio statio, seu longa mora. Nam causa cerebrum est ut pars quidem similis vel à frigore, vel à solis ardore ad intemperiem reductum, ut instrumentum verò, quatenus à plenitudine infestatur. Caliditas externa vel interna. Capitis grauedo ob æstum, frigiditas externa vel interna, frigida enim destillationes mouent: frigus superueniens cerebrum repletum exprimit, veluti manus spongiam. Itaque fluxiones præcipue descendentes ex capite inualescunt pluuiosis temporibus, ut ait Gal.

Interna causa duplex, vna in parte transmittente, altera in parte recipiente, vel accersente. Nam sicut inter se particulae altera ab altera nutrimentum trahunt, ita altera in alteram quod superuacuum est, à se deponunt. Et sicut trahentium ea vincit, quæ erat valentior, sic & à se deponentium.

In parte transmittente, vel est humorum copia, vel qualitas infestans. sunt enim omnium excretionum causæ res mordens aut aggrauans. Materia autem inutilis confluit impulsæ vel attractæ. Impellitur quando expultrix triste aliquid sentit, quod duplex est qualitate & quantitate. Et perinde rheumatici affectus proueniunt, quando pars robusta ad
infr

infirmiorem mittit excrementa.

Causa copiae excrementi & qualitatis cerebri dyscrasia est, siue primario affectu, siue per consensum gignatur. Nam continuo caput repletur habentibus cerebrum calidum, si nullam seruauerint victus rationem. Et frigidum cerebrum habentes facile à causis frigidis offenduntur, offensionisq; tempore destillationibus & grauedinibus capiuntur. In cerebro humido excrementorum est multitudo, sic caput plurimum à frigida intemperie, vel humida, vel ab vtraque fluxionem recipit: fluxionis autē generatio similis generationi imbrium est, quoad magnum cum paruo conferre licet, ut ait Aristot. 2. de par. animal. vel assimilis est aquae, quae in meta distillatoria fit, ut vult Auicennas.

Causa in parte recipiente, vel est caliditas aut dolor ex quibus fit attractio, vel imbecillitas, pars autem imbecillis dicitur, quae vim excretricem vicinis omnibus imbecilliores obtinet, quod illi contingit necessario, vel ob meatuum ametriam, vel ob intemperiem: pars enim recipere maximè idonea est, aut imbecillior, aut rarior & solutior, aut attrahendum promptior, aut immobilior, ut tradit Galen. Sed cur partis suscipientis imbecillitas fluxionis causa est? An quia imbecilla membra solent plurima ac praua excrementa gignere, & nonnunquam noxiorum humorum copiam præripe

ripere, vt Hippocrati & Galen. placet.

Causa vtrique parti communis videtur virtutis regentis imbecillitas, siue illa virtus sit aggregatum ex quatuor facultatibus naturalibus, vt tenet communis opinio, siue quinta virtus, vt sentire videtur Auerrho. quam discretiuam vocat, hancq; collocat ante expultricem, sed de hac vi, nos satis scripsimus libro primo de medica theorosi.

Digno. fluentis substantiæ morbi facillime depræhenduntur, quoniam oculis maximè patent, fluxionis ex capite nota est irritatio in vua, vel aspera arteria. Si humor in nares destillat, tenuis per eas pituita profluit, frequentia sternutamenta fiunt, & capitis grauitas sentitur. Si in fauces, has exasperat, tussiculam mouet. Si in pulmones confluit, præter sternutamenta & tussim, adest capitis grauitas. In catharrhis & coryzis bronchosa vox efficitur, multitudine superfluæ humiditatis. Sicut clangosa fieri contingit pharynge & trachia arteria vehementer siccatis. Granula rheumatice semper sunt nuntia causæ, vt canit Aegidius. Humores noxam inferentes facilè depræhenduntur, coloribus, symptomatis, & medicaminum quæ admoventur experientia. Ad hæc etiam confert victus ratio, anni tempus, regionis constitutio, ætas, corporisq; habitudo.

Præfag. Quibus nares natura humidæ & genitura,

tura, minus integra sanitate fruuntur. 6. aphor. Omnes natura humidi vel secundum cerebrum tantum, vel secundum totum corpus, sani penitus esse non possunt, sed ex parua occasione continuo destillationibus capiuntur. Et si superfluitas ad inferiora per palatum descendat, partes subiectæ offenduntur, fauces, guttur, aspera arteria, pulmo, gula, venter. Inde fiunt tussiles dyspnœæ, anginae cruditatesq;, & ventris profluvia, & dysenteria, quando quod destillat falsum est. Multa in cerebro humiditas vel ipsum obstruit: vnde capitis grauitates, epilepsia, & apoplexia fiunt, vel fugit ad sensoria, & sensibus nocumentum facit, vel ad guttur & destillationes facit, vel ad partes inferiores, & varios efficit morbos. Si verò per totum corpus humiditas sit, fiunt putridæ febres, & putrefactionum morbi, vt ait Philotheus. Lacrymæ, narium humiditas, sternutamentum, aurium sordes, saliuæ excreatio, non eadem omnibus ratione fiunt. 6. epi. nam aliqua ex his sanis, aliqua ægris, nonnullis vtrisque accidunt. Duo canales qui per palatum in os totius cerebri excrementa eructant, soli expurgando cerebro sufficiunt, quandiu omnino rectè valet. 8. de v. par. Crassa per nares & palatum, subtilia per cranei suturas expelluntur. 9. eiusdem. Malignæ destillationes tenues sunt. 6. epi. Valde senibus destillationes fiunt, ob raritatem & venarum colliquationem.

nem. 3.apho. 13. In his non maturantur raucedi-
 nes & grauedines. 2.apho. 4. Qui destillatione à
 capite laborant, his lien minus tumens efficitur.
 6.epi. Membra per motum recipiunt influxiones
 à cerebro prouenientes vt ex motu vocis angina,
 ex manuum motu paralyfis, ex equitatione dolor
 spinæ. Moses 3.apho. Qui caput habent humidū
 & rheumate abundans, in acutis vocibus festinan-
 ter obmutescunt. Sic homo quē prior videt lupus
 obmutescit, teste Platone in politia. Grauedini &
 raucedini febris superueniēs ad earum concoctio-
 nem non inutilis. 6.epi.

Metho.m. Contenta in capite promptius eua-
 cuantur per palatum vel per nares vel per vtrumq;
 3.ar.p. per gargareonem & aures. 2.ad glau. tamen
 à natura aliena est expurgatio per aures. 3.aphor.
 com. 24. Oportet ad id quod superuacaneū trās-
 mittit omnem curam conferre, & de parte affecta
 tantisper esse sollicitum, ne quæ cōfluant promptè
 recipiat, id quod fiet astringentibus repellentibus,
 & ex parte quæ transmittit temperiei mediocrita-
 te. Si ex minus momentaneis translatio facta est,
 quod superfluum est, rursus ad ea reuelles, sin ex
 his quæ maioris sunt momēti, ambobus simul con-
 sules, eum semper submouēs affectum, qui fluxio-
 nem excitet. Influxus materię bene tamperatę so-
 lam euacuationem desiderat, vitiatæ verò euacua-
 tion

tionem alterationemq; , vt in rheumaticis affectibus. Postremò considerandum an causa & destillationis materia contraria requirant remedia , vt si materia est calida à frigore comprimente destillās, aut frigida à calore liquante. In hoc pugnantium indicationum complexu, vrgentioris maior est habenda ratio, altero tamen nō neglecto. In destillatione phlebotomia cōuenire nō videtur, quia materia eius nō est in venis. Alm. tamē & Mesueus cōcedunt in catarrho calido, vel feбри cōsociato, & si in oculos aut pulmones cōfluat per sanguinis missionem, purgationem , & ea quæ caput roborant, qui plane deplorati non sunt, omnes seruātur, vt scribit Galen. 5. ther. Apparant materiam calidam sy. violatus de iuiubis, myrtinus, rosatus ex rosis siccis, sy. capil. ven. sy. contra catarrhum calidū M. frigidam verò sy. de hyssopo, de liq. mel. ros. sy. de stechade, sy. de cortice citri, aqua mulsa. materiā item calidam purgant atramētum calami dulcis, manna, diaprunum simplex, elect. de succo ros. ex psyllio, rosatum M. pil. assaieret aggregatiuæ, aureæ frigidā deturbant à capite pil. coccia, agaricus, tro. ab his vtendum aurea Alex. vel acharisto, adriano, diaprassio N. A purgatione sumat theriaces rec. 3. j. conseruē ros. 3. s. Auertunt frictiones, ligaturæ, ficyæ, errhyna. Actius iubet plantas pedum cum pice in oleo plurimo dissoluta constanter fricare.

In manu

In manu dextra duo medij lino colligati destilla-
 tiones arcent, sic pollex in pede præligatus, & ca-
 nina cutis cuilibet digito circundata, ex Plin. Ca-
 tarrhum sistunt & increassant lutum figillatum, bo-
 lus arm. loch de papauere & hypoglottides quæ re-
 ciunt diatrag. frig. ʒ. ij. boliar. imparati 3. j. terræ
 figil. ʒ. j. cum sy. de papa. vel myrteo f. massâ, ex qua
 formentur, teneat in ore, confectio deiacur M. pil.
 de cynoglossa, pil. de papauere, & diapapa. & eius-
 dem. Errhynum ex māna siccatur catarrhum, & pul.
 stomachorum gallinarum potus, fumus sandaracæ,
 tro. stella Auic. Ad catarrhi impetum cohibendū.
 R. se. myrti coriand. imparatorum colliculi glādis,
 ipodij añ. ʒ. j. conus cupressi, coralli albi & rub. añ.
 ʒ. s. masti. 3. j. s. cum succo cytoniorum f. pil. sex
 pro 3. sumantur à cœna per duas horas, fluxiones
 suspendunt. R. resinæ ʒ. ij. ladani ʒ. s. myrrhæ ma-
 stic. añ. 3. s. sandaracæ, id est, vermicis 3. iij. gummi
 soluantur in lixiuio cum aceto confuso, & coquan-
 tur ad bonam viscositatem & cum 3. vj. ceræ albæ.
 f. empl. vertici. An in catarrho calido à materia re-
 nui empl. rubrificans, capiti admoueri debeat, vt
 Gale. consulit. 5. ther. hoc nō videtur ex vsu, quod
 etiā improbat Trall. Aet. & Auic. licet Arcul. placi-
 to Galeni adhæreat. zuccharum suffitu destillatio-
 nes sanat. Stechus.

In catarrho frigido pastillus ex ladano, vel ex

To. i. Lib. v.

n

melan

melanthio fricto, odoratu vel olfactu confert. Item
sacculus ex milio asso cum sulfure, & modico cala-
mi aromatici & sandarata infricatum tonso capiti
rheuma intercipit. Ad idem. ℞. gary. macis corti-
cis citri sicci añ. 3. j. fiat pul. pro coronali. In causa
callida fieri possunt garg. ex sy. de papauere & dia-
moron cum aqua ros. vel plant. In frigida verò, ex
vino in quo elixata sint nux moschata, conus cu-
pressi, vernix, myrrha, olibanum, gramen.

Remedia ad materiam in cerebro pituitosam.
℞. spicæ nardi pulueratæ ʒ. j. cum theriaca formē-
tur pil. ij. sumat eas à cœna duabus horis. ℞. ambari
grana tria. syr. de calamento ʒ. ij. cum aqua maio-
ranæ fiat potio, quam sumat in aurora. ℞. pulueris
moschi grana duo, aquę maioranę ʒ. iij. fiat errhy-
num. Confert etiā esse sex vel octo auellanas assas
post pastum, augmentum efficiunt in cerebro. 2.
cano. ℞. sotiræ magnæ Auicenn. ʒ. ij. aquæ rorisma.
ʒ. j. s. detur in aurora. Ad idem valet diambra, &
myrob. chebulæ conditæ. Aspergatur vertex pul-
uere chary. visum etiam iuuat, vel thuris ʒ. s. sanda.
ʒ. s. macis ʒ. j. f. pul. pro vertice, destillationē arcet.
Ad omnes sensus vigorandum, ambari ʒ. j. xyloal.
gr. v. f. pilulæ cum vino aromatico, octo pro 3. su-
mat duas omni vesperi per duas horas ante cibum.
Aliud agarici ʒ. s. pul. diambra ʒ. s. cubeborum
xyloaloes añ. ʒ. j. cum aqua iridis fiāt tro. siccati in
sole

sole, commansi ieiuno purgant caput & roborant. ℞. ladani puri ℥.j. nigellæ ro. ℥.j. s. ambari moschi añ. gr. iij. torrefiant omnia super patella ferrea, & ligentur in serico rubro, & sub forma pastilli sæpe odorentur vel olfaciant. Arcet defluxum. Ad antiqua rheumata consumendum. ℞. ladani ℥.s. styrcis calamitæ 3.ij. sandaracæ 3.j. ambari 3.j. conus cupressi mastich. corallorum amborum spodij añ. 3.ij. resinę 3.vj. soluatur ladanum cum resina in vino veteri & coquantur ad viscositatem, fiat cæratū pro coronali. Ad idem confert empl. siccans cerebrum, lib. de paratu faci ibus. Crassiā pituitā purgant sine molestia pulvis catapuciæ sumptus cum modico cinamomo ex ovo sorbili vel cum iusculo, dosis à 3.ij. ad 3.j. plus minus, ex Plat. & Vig.

Appendix de narium malis. CAP. IX.

Appendix de narium morbis omisiss. Simus nasus existit cuius partes mediæ compressæ sunt, sed elatæ, quæ vtrinque adiacent. Simitas naso, eiusq; & dentibus propriè attribuitur, pus narium nunquam album vt ait Zoar. Ad polypum, succi porrorum ℥.v. tartari 3.ij. ceræ viridis parum. fiat linimētum, quòd laudat Alexis. Aliud brassicæ erraticæ aridæ q. s. fiat pulvis, coniice, in triduo excidet. Cato de re rustica. Vnguentum ex spuma nitri & floribus

n 2

viola

violarum cum aqua à Galeno præscribitur. Huc refer spectata remedia Vigonij. Ad polypum & cancrum vlcerata, item ad vlcera serpentia optimum est vnguentum Montag. conf. 1 4. Ad vlcera antiqua narium, ex succo extremitatum hederæ arbore fiat collutio, Varig. Ad omne vlcus ducendum ad cicatricem & gallarū, cerusæ añ. ℥. j. amyli tragachantæ añ. ℥. s. cum adipe gallinæ fiat linimentum. Ad ozenas, feminis erices, nitri, myrrhæ, sidiōrum añ. 3. ij. croci, costi añ. 3. j. trita insufflato in nares. Aliud myrrhæ cassiæ rosarum añ. 3. j. s. tritis & cum melle permistis, illine narium intima. Ad vlcera narium, adipis vituli anseris & butyri rec. añ. ℥. j. plumbi vsti 3. xij. rosacei ℥. ij. plumbum cum oleo subigito, & misce liquabilibus. Ad foetorem narium, amomi repurgati, myrrhæ rosarum aridarum añ. ℥. j. trita insufflato narium intimis partibus, aut cum nardino dissolue.

LIB



ANASCEVES MOR-

BORVM, LIB. VI.

*De linguae & oris affectibus.* CAP. I.

S, inquit Apuleius, est animi vestibulum, orationis ianua, cogitationum comitium, & ab oris exiguitate, *μικρόσολος* homo appellatur, sed lingua Aetio est principium & finis interaneorum. Est vocis & loquelæ instrumentū, & gustus sensorium Galeno. lingua dicitur à ligando cibo, vt Varroni placet. Cibos enim conglobat, deprimit, ac transmittit in ventrem, quoniam in omnem partē mouetur liberè. Est autem munus eius duplex, primū quod saporum vim persentit, vnde gustus sedes indigitatur, alterum quod animi cōceptus enuntiat,

De vocis & sermonis offensa. CAP. II.

Ingua vocis & loquelæ instrumentum existit, proinde de vocis & sermonis læsione dicendum. Vox est omnium animæ actionum principalissima, quia co-

To. I. Lib. VI.

n

3

gita

gitationis & mentis nuntia est. Actiones autem circa respirationem conuenientes sunt quinque, exspiratio, efflatio sine & cum strepitu, vox & loquela. Expirationem efficiunt vniuersi thoracem contrahentes muscoli. Efflationem (quæ vehemēs exspiratio est) intercostales maximè. Strepentem hi qui in faucibus sunt: vocem verò gutturis muscoli absoluunt. At lingua articulatim vocē distinguens, loquendi vsum largitur, ad quam rem conferre videntur dentes, labra, narium foramina, palatum, gurgulio, mediocreq; ipsius linguæ vinculum. Est igitur loquela organorum quæ sermoni sunt deputata munus, sicut vox vocaliū instrumentorū. Sunt autem vocalia organa, arteria, larynx, pharinx, & in gutture epiglottis, siue ligula.

Vox quum voluntaria sit actio, causam habet efficientem vim animalem, instrumenta musculos & nervos, materiam verò aërem. Est enim vox aër percussus. Locus in quo fit, bronchij caput est, ex cartilaginibus quo resonaret factum, vociq; necessarius est mador faucium. Nec fieri potest vox, nisi transitus sit angustior, hæc omnia in capite comprehendit Homerus inquiens. Clamorem emisit quantum caput huic capiebat.

Leditur autē vox, quia vix, quia vitiose, quia nullo modo fit. homo quē lupo prior viderit, obmutescit, & grauā virium iacturā facit, vt narrat Plato in
Poli

Politia. Contingit etiam vocem lædi defectu materiae, vel desiderio virtutis animalis, aut vitio instrumentorum. Defectu quidem materiae quæ est flatus, quem efficiunt commissso thorace inter costales muscoli: vnde his nihil agentibus animal vocem amittit, etiam nullo in propriis vocis instrumentis apparente affectu. Sic dissectis musculorū intercostalium fibris, perit vox. Item per vehementia thoracis vulnera, animal semispirans ac mox semiuocale euadit. Cuidam vox amissa fuit, affectis ex prolapsu intercostalibus musculis, quāuis materia ad guttur perueniret, sed eius quātitas sufficiens non accedebat. Virtutis animalis desiderio vox infirmatur aut perit, nam vbi virtus ad vocalia organa descendere prohibetur, aphonia incidit. Mutum quoque animal redditur incisus aut laqueo interseptis, nervis recurrētibus, aut musculis qui epiglottida mouent, aut aspera arteria, intercepto etiā neruo ex sexta coniugatione ad laryngis musculos perueniente. Nec dissimili ratione vox offenditur ab angina, gulæ tumoribus vertebrarum ceruicis ad interiora luxatione, & in apoplexia, comitiali, sopore, catalepsi. Demum instrumentorum vitio vocis offensa contingit, vt ex musculis guttur mouentibus præcipui sunt, qui ipsum aperiunt & claudunt, sic ex nervis vocalibus, recurrētes, quare per vulnera refrigerati vocem impediunt. Itaque

n 4 perit

perit vox, si vel claudentes, vel aperientes guttur musculi immobiles reddantur: ubi verò difficulter mouentur, vel palpitant, vel tremunt, vel aliter afficiuntur, pro affectionis modo, vox ipsa lædetur. Præterea vox in acumen & in magnitudinem vitatur, ubi fauces à suis musculis contendere & contineri non possunt. Insuper vitato palato vox culpata redditur, est enim obiectum gutturi palatum tanquam tintinnabulum, sine quo vox neque canora, neque suauius est. Vox rauca efficitur quum membrana faucibus, gutturiq; continua, multa humiditate rigatur. Ob destillationem imbutis faucibus branchus fieri solet. Pulmonis siccitas vocem canoram reddit, ceu humor fuscum & raucum. Vox infantium intercipitur suppressa aluo, stertunt ob pituitam in ventre collectam, proinde vomitu & alui solutione curantur.

Prælag. trauli seu balbi, ab alui profluuiio maxime capiuntur. 6. apho. 32. Inde traulismus. Ancyloglossi & mogilali apud Aet. Quorum caput humidum est, & rheumatismis abundans, in acutis vocibus festinanter mutescunt. Duæ sunt circa vocem passionēs, clangor & resonatio. Circa dialectum, id est, literarum expressionem etiam duæ, pselum & traulum, ut scribit Philotheus in com. Cœlostomi sunt quibus vox est interrupta, & concisa, pulmonis aut pectoris vitio: est enim cœlostomia,

mia, quum vox quasi in recessu oris auditur. Trochoreus.

Method. m. harum affectionum curatio fieri non potest, nisi per causarum efficientium sublationem.

Ad linguam resolutam. CAP. III.

AD linguam resolutam venæ sub ipsa fecentur, & ficia sub mento ponatur, & quæ pituitam per os detrahunt, vt collutiones ex sinapi, & linguæ exercitia imperentur. Illitiones item acres, epithemata & sinapismi occipitio ac collo vniuerso admoueantur. R. seminis præoniæ decorticati numero 30. sumptum statim curare ferunt. Errhynum laudatur ex benedicta & succo rutæ syluestris. Aphronitrum cum pane mixtum ex æquo, commanducatum sanat, semen nasturcij & castoreum linguæ affricatur, mox colluitur sequenti decocto, quod recipit castorei, piperis, pyrethri, euphorbij, anisi, maratri, gary. xyloaloes, saluiæ, baccarum lauri añ. ʒ. s. terantur, & ex vino albo fiat decoctio, hypoglottides ex saluia castoreo & melle, vel è nuce moschata condita vtilis sunt. Glaucium in cote cum aqua leuigatum inunctum linguæ confestim sanare aiunt. Confectio anachardina linguæ illita reddit eam mobilem, & mox loqui faciet, vt ait à Grado. Septi-

n s cum

cum ex ventriculis cantharidum cum fermento vel sepo ceruici admotum vesicas excitabit, quibus ruptis statim loquetur, si credimus Myrep.

Ad batrachium.

CAP. IIIL.

AD batrachium siue ranulam, qui est tumor inflammatorius sub lingua erumpens, fac incidere linguæ venas, & occipiti appone sicyam cum scarificatione, & da crebro gargarisandum diamorum. Gallas terito, & irrigato cum melle, intimaq; cum his inungito, vel semen mali punici triti cum melle, illine, salem alicam & folia oleæ tenera trita impone. Absinthium etiã cum melle salubriter imponitur.

Ad malam linguæ pustulam.

CAP. V.

AD malam linguæ pustulam, liberidas incessas cum melle collige & impone, vel oleo, in quo scorpius frixus sit, adline. Sapphirus cum lacte illitus, omnes externas vlcerationes sanat, cū lacte potus, omnes internas fixurasq; linguæ inspersus sanat. Ex decocto radicis pētaphylli collutio, linguæ dolori subuenit.

Ad reliqua linguæ mala.

CAP. VI.

AD reliquas linguæ affectiones, asperitas leuigatur menta tusa & contusa vel mucagine seminis lini infricata. Benefaciunt
etiam

etiam adeps gallinæ, muccagines feminum cytoniorum, psylli, tragachanti, gummi arabici. Grauitati linguæ succurrit hieralogodium Nicolai, hiera picra Auic. thus commansum cum origano, acorus conditus, confectio anacardina, oleum chrysomilorum M. Esus brassicæ alleuat eius grauitatem à phlegmate ortam. Serapio.

Ad labiorum vitia. CAP. VII.

AD labiorum vitia, fissuras labiorum, linguæ, palati, atque oris exulcerationem, medicatur linimentum quod accipit tragachantæ ℥.j. cum aqua rosarum fiat muccago, & cū farina amyli fiat muccago, ex eaq; illitio. Aliud componitur ex amylo puluere litij cum latice rosaceo. Ad labiorum & omnium partium rhagadias. ℞. lithargyri argenti, myrrhæ, zinz. añ. ℥.j. cum cera alba & melle fiat illitio. Ad labiorum fissuras oui interna pellicula, aut oſis palmarum membranula, aut araneæ tela imponitur. Vel ostreorum cinis labris inspergitur. Aliud ad oris & sedis rimas. ℞. thuris, amyli, terræ asteris añ. ℥.s. fiat puluis, rimis insperge. Ad intertriginem. ℞. seui capræ liquati & colati ℥.ij. pulueris gallorum 3.ij. misce & illine calcanei rimas. Parygron ad calosas calcaneorum rimas, accipit lithargy. cerusæ añ. ℥.j. s. muccag. feminis lini olei añ. ceræ ℥. iiij. ad-
pis

pis suilli ℥.vij.colophonix ℥.vij. pernionibus, & calosis rimis competit.

Ad saliuam redundantem. CAP. VIII.

SD saliuam redundantem, corpus purgari debet syrupo rosarum cathartico, vel aliis hydragogis clementer purgantibus. Abstineat à iusculis & cibariis humidis & frigidis, vtatur ieiunus rosata nouella, vel triphera minore. De topicis coriandri semine, aut orizæ farina linguam illine, oriza etiam comesta confert. Item os caluæ irrigatur vino astringente tepido, aut galla trita cum solano & aceto rasura etiam eboris sumpta conferre potest.

Ad oris partium inflammationem. CAP. IX.

AD oris partium inflammationem, materia sanguinis missione vel cholagogis purganda. Mox in ore sequens decoctū frequenter contineat tepidum, quod est anodynum, & ad suppurationē festinam ducit. ℞. caricarum pinguium palmularum añ. numero, iij. passularum enucleatarum ℥.j. iuiubas xx. sebestem rec. numero iij. radicum buglossi rec. ℥.ij. ordeï mundi cōtusi, fursuris añ. m. j. bulliant omnia simul in iusculo gall. aut carnis veruecis sine sale ad consumptionem debitam, deinde exprimātur, & cum

cum modico zucharo parum bulliant. hoc remedium saluberrimum est, etiam ad parulidas. Est enim parulis inflammatio in aliqua gingiuarum parte suscitata, quæ nisi discussa fuerit, in suppurationem conuertitur.

De gargaris affectibus.

CAP. X.

GArgar seu gurgulio, columella & vua, cum particulæ, tum affectus nomen est. 6. *ἡ τὸ π.* Est enim caruncula, quam gutturi pro tegumēto natura addit, quæ voci ad magnitudinem & pulchritudinem cōfert, vt ait Aphro. 2. probl. eaq; aër ingrediens scinditur, & vehementia eius impetus frangitur. 2. de vsu par. Columella vitium gargaris est, quum in longum per fluxionem adducitur. Lorum eius affectio est, quum ex suffitu nimirū ignitus gracilescit, & loro similis propendet. *σταφυλή*, id est, vua affectio est, quum vuæ acino simile summum gurgulionis apparet. 6. *κατὰ τὸ π.* His malis interdū consociantur inflammationes, abscessus, exulcerationes.

Causa, si ad gurgulionem fluxio deriuetur, aut vuam parit, aut alias in tumorem ipsum attollit. 3. de ca. fy. Loro similis fit, propterea quòd alimentum non sentit aut quum laxitatem patitur.

Digno. facile dignoscuntur visu, simul & tactu, partes

partes enim in superficie constitutæ vnà cum affectuum suorum proprietate, facile sensibus depræhenduntur. Quando vua sine dolore tumescit, ex pituitæ destillatione euenit: quū dolet, phlegmone infestatur.

Præfagia, vua & lorum raro accidunt, columella frequenter, vt retur Aet. Præcisa vua celeriter iugulat. 4. r. a. Gurgulio si cum tumore rubescit, sine periculo præcidi non potest, quia inflammatio, sanguinisq; profusio ei accidit. Si pallidior sit, & ima eius pars crassa & rotunda, & summa tenuis videatur, intrepidè præcidi debet. 2. progn. Vuæ vehemens inflāmatio terrere debet, teste Celso. Gurgulio funditus exectus vocē obturbat, pulmones ac pectus refrigerat, lib. de diff. m. & 11. de vsu p. Cor infirmat, vt ait Zoar. Tabe consumuntur quibus gargar abscissum est. Aphro. hoc nō perpetuò verum, plures enim vidi obesulos, quibus gurgulio penitus erat præcisus.

Method. m. In harum partium inflammatione, prima præsidia fluorem reprimunt, si mediocris sit influxus mediocriter astringentis potentia, hoc est austerum remedium esse debet. Si vehementior influxus extiterit, acerbè. 8. $\pi\epsilon\lambda\tau\omicron\pi$. Ad inflamatam columellam Areteus vt iubet sanguinis missione, purgatione'ue, & vinculis vt in angina, & sicyis in occipitio applicatis, localia inspiranda sunt

sunt per calamum aut per oblongum canalem.

Ad laxatam columellam, primùm fluxio auer-
tenda & deriuanda, mox repellenda est gargarif-
mis astringentibus, ex aqua rosarum plantag. &
aceto. Vel ex succo punicorum cum malicorio
contusorum, aut ex radice gei, ex aqua vel vino pi-
tta. Retrahitur fluxio & ipsa vua, sicya longi orificij
vertici raso hærente, & subinde admota. Item vua
statim recurret, si altera manu syncipitis capillos
distendas, & alterius pollice pice liquida infecto
verticem illinas. Emplastrum ex galbano & opo-
ponace & calamento vertici & occipitio imponi-
tur. Sed circa initia laudat Mesue emplastrum ex
acacia cum aceto, & gallis vstis factum. Vua succo
brassicæ contacta potenter subleuatur, vt adstruit
Marcel. Cinis radicum caulium applicatus fluxum
resiccat. Dio. fiat garga. ex oxycrato vel aceto, cum
diamoro & aqua rosacea vel plant. vel gei, deinde
subtilissimi pulueres sufflatu iniiciuntur, vel pinna
illinuntur, ne fiat contusio. & balauftiæ gallæ vstæ
malicorei añ. 3. ij. corticū myrobal. citri. 3. j. cam-
phoræ ʒ. s. fiat puluis tenuissimus. Galla trita cum
aceto imponitur. Infantium vuas eleuant gallæ
adustæ cum aceto illitę in syncipite. Ad relaxatam
citra inflammationē præclarè facit succus Cyre-
naicus tritus & adhibitus, aut ipsum laser, vt consu-
lit Scribonius. Cinis anethi vuam in faucibus le-
uat,

uat, Plin. Ad valde laxatam & tumentem. ℞. piperis 3. s. aluminis scissi gallarum añ. 3. j. contritis vtere. Ad procidētem & suffocantem, nitrum tritum digito excipe, & adfrica, destillabit inde plurima pituita, eaq; cruenta, & sanabitur, vt refert Aet.

Amuleta. Electum flauum appenditur ad colli dolores, ad tonsillas, ad febres, & cōtra incantationes, ex Plinio. Assa foetida collo suspensa confert. Zoar. Platani pilulam lino traiectā suspende collo. Marcel. Radix portulacæ, siue peplij filo suspensa è collo, impatibiles vuæ morbos liberat, si Plinio credimus.

Ad aphoniam. CAP. XI.

REmedia ad aphoniam subito factam. ℞. garyophy. nucis moschatae, castorei añ. 3. j. fiat puluis, de quo bibat ex vino calido. Aliud ad aphonos. ℞. macis, croci, castorei añ. 3. j. fiat puluis, sumat 3. j. ex vino odorifero. Ad vocem amissam styracis glebulam instar ciceris ex aqua, dare iubet Galen. & statim loquetur. Succus herbæ paralyfis potus, opifer est. Item pulegium ex aceto tepido potum, & naribus applicatum loquelam amissam statim restituit, vt aiunt. Ad idem æger sorbeat liquorē Cirenaceum cum aqua calida dissolutum. Vocem clarificat & repurgat butyrum crebro comestum, allium assatum,

tum, galbanum pro pilula sumptum. Irraucientibus conferunt sy. de glyc. de iuiubis, diapienidion diairis, diatrag. theriaca. Opitulatur etiam raii & raiiscellis collum vnguento mucilaginoso calido perungere, dein forale super imponere. Troch. Ad raucedinem pedes vituli bouis, hœdi veruecis, elixi vtilis sunt, & sorbitiones ex iusculo cauliũ cum zucaro, salubria etiam iuscula fiunt ex amygdalis, strobilis, cremore hordei & amylo, & fursure, ciceribusq; albis. Vinum in quo herba gentianæ macerata sit sumptum raucedinem sanat. Conserua florum sambuci coccillantibus prodest. ℞. diairis 3. j. s. aquæ hyssopi 3. ij. sumat mane, & vesperi, vel ℞. cubearum 3. ij. bibat ex ptisana. Tragachantum vino madefactum & epotum vocem claram reddit. ℞. iridis hyssopi añ. 3. j. prasiij 3. j. s. croci 3. j. s. succi liquiritiæ puri 3. j. rad. liq. rasæ 3. s. zucari lucidi ad pondus omnium fiat puluis. huc pertinet loch de caulibus, loch ex vernice & melle factum. Acetum scillinum cum vernice gargarisatum. Razes ait gargarismũ ex sanguine critij cum melle & aqua calida, curare raucedinem. Hypoglottides ex vernice, verina, vel styrace sola, in ore retentæ conferunt, & pilulæ de croco M. suffitus ex radicibus tussilaginis. Aliud valde siccans ex sulfure fit, vel ex sandaraca Græcorum, aut arsenico, quod probat Gal. & Sauanorola.

To. I. Lib. VI.

o

Ad

Ad sermonis offensam à causa calida & sicca, fiat gargarismus ex lacte mulieris cum oleo violato, amygdalino, vel de semine cucurbitæ fatiuæ. Mox illine colli vertebrae ex adipe gall. suis, veruecis sine sale. Embrocha cōuenit ex viola, nenuffare, hordeo, &c. In causa frigida purgatio fiat per hydragoga, vel phlegmagoga, lingua fricatur conferva anthos, saluæ, sinapi, pyrethro. Gummi hederæ dissolutum cum melle, linguæ illitum statim sermonem restituit. Item benefacit vinum in ore retentum, in quo radices buglossi sint elixatæ. Quidam succum origani auribus infundunt. Loquelam impeditam sanare aiunt ꝑ. & seminis ocymipisti cum modico vino potam. Item rutæ decoctio pota. Modicum olei vitreoli cum pauca aqua rosacea potum, sermonem amissum restituere asserit Eunomius. Succus rutæ syluestris naribus sæpe infusus deperditam loquelam reuocat. Idē pollet succus betonicæ potus, & dictamū ex vino sumptum. Vocale instrumentum resolutum curatur vniuersalibus & topicis paralyti dicatis. Si contingat à catarrho vertici imponatur ficya, nam subito fluxum arcet. Sciendum quod neruus mouens linguam oritur à septimo pari neruorum, sed neruus dans ipsi sensum oritur à tertio pari. 4. de lo. aff.

FINIS TOMI PRIMI.

ANASCEVES
MORBORVM
TOMI SECVNDI,
LIBER I.



De dentium affectibus. CAP. I.



ENTES nascuntur homini postquam natus est septimo mense. Augentur ferè per totum vitæ curriculum, & quantum augentur, tantum in ciborū leuigatione atteruntur. Alteratio verò quæ in ore agitur per dentes, mutat alimentum in aliam speciem manifestè. Itaque dentes vnà cum lingua diiudicant sapores, & ad cibi necessitatem, & locutionem homini adnexi sunt. Sunt autem in vtraque maxilla sexdecim, & soli ex ossibus tantum modo mollium

To. II. Lib. I. o 2 cere

cerebri neruorum participes sunt. Ob id sentiunt ex sententia Galeni, apud quem dentium differentia tres sunt. Incisorij octo. Canini quatuor, maxillares seu molares viginti. Adde quod quibusdam dentes non sunt discreti, sed vno ex osse constant, vt tradit Herodotus lib. 9. seu in Calliope. Et de Pyrrho epirota Rodoginus, qui Hercule fuisse triplici dentium serie refert. Nec inutilis est simulata dentium ex ebore structura exēptilis, etenim non tantum hæc ad ornatum facit, sed etiam cōfert ad elocutionem & ad ciborum commanducatum.

Dentes porrò duabus affectionibus contrariis obnoxij sunt, inopiæ, scilicet, & redūdātiæ alimēti, quod ipsis suppeditatur. Inopia aridiores, tabidiores, & ob id tenuiores eos efficit. Redundantia verò consimilem in eis excitare affectionem potest, qualis est circa carnosas partes phlegmone. Inde dentium dolor, erosio, liuor, vacillatio, ὀδοντᾶλγία, αἰμωδία, ὀδοντᾶξις, ὀδοντοφυνία, & cætera dentium vitia. Quibus rariores fuerint dentes, haud ita diu viuere opinatur Aristoteles 3 4. probl. 1. Augustus vt narrat Tranquillus dentes habuit raros, paruos & scabros, annis tamen vixit septuaginta sex, propterea ex dentium raritate non semper vita brevis coniectatur. Si dentes superiores paululum intus vergant, celerrimè cadunt, si extra, celeriter, nam loquendo, edendoq; quum non rectè sibi inuicem occur

occurrant, mutuò sese debilitant, sanè non minus dentium incommodo homo carere potest, quàm senio, aut morte.

De dentium dolore. CAP. II.

Dentium dolor vel est in dentis substantia, aut in neruo ad radicem substracto, vel in gingiuarum inflammatione. Doloris causa est dyscrasia calida vel frigida, nuda vel cum materiæ influxu, & continui solutio, forantur dentes ab humorum acrium & erodentium influxu. Liuidi quoque redduntur ex vitiosorum humorum influxu. Si verò mobiles sint, absque ictu præcedente, verisimile est nervos radicibus eorum adnatos præ nimia humiditate laxatos esse. Difficilis quoq; dentitio contingit ex cerebri nimia humiditate, & caloris inopia, stridor etiam dentium incidit interdum ex cerebri humiditate. Dentium dolor vt ait Valerianus, in maximis tormentis dinumerari potest.

Metho. m. dolor ex causarum sublacione curandus. Erosio resiccantibus influentem humorem, qui si paucus fuerit per localia exiccantiaq; auxilia absumetur: si verò multus, vniuersi corporis prouidentia est habenda, quòd quidem si ob vniuersum corpus affectum sit, huic etiam est prospiciendum. At erosos ob mollitudinem dentes, duriores per
o 3 auste

austera & acerba reddendi sunt. Liuidi similē cum foratis curationem desyderant. Mobilibus siccantibus remediis est opus. Prominentiores lima atterantur oportet, vt Gal. scribit. ζ . $\nu\lambda$ τόπος. Ad dentium dolorem forficem remedium optimum esse dicit Marcellus, à quo plurimum mea distat opinio.

Remedia. phlebotomia & purgatio laudatur ab Almāfore, partim ad plethoram, partim ad cacochymiam & rheumatismum. Qui foeliciter reuellitur per sacculum adusto cumino & sale semipleno cum milio, & occipiti admoto. Item per caricis cum semine sinapis tritas, & panno inductas cubito alterius partis in qua dolor est, impositas. Aut per detim alij pistam & in pulsibus circa manum eiusdem partis adalligatam. Vel per causticum ex calce viua cum sapone molli incorporata compositum & applicatum.

In causa calida, conueniunt collutiones ex aceto calido, vel ex decocto radicū lapathi, vel ex decocto filicis ex aceto acerrimo, succus vel puluis calendulæ denti salubriter imponitur. Zazena M. denti illita laudatur. Collutio fiat ex aceto in quo opium instar ciceris sit elixum, vel sequenti decocto. \mathcal{R} . opij grana ij. hyoscyami gra. j. mandragoræ grana iij. aceti \mathcal{Z} . iij. aquæ ros. \mathcal{Z} . ij. fiat decoctio. \mathcal{R} . opij hyoscyami albi añ. cum aceto fiat pilula, vel
ex

ex cera cum opio fiat, quam sub dente contineat.
℞. seminis apij grana. ij. opij hyoscyami gra. iiij. cum
vino albo, vel cum syrupo de papauere fiat pilula,
denti imponenda. huc refer pilulas de cynoglossa,
quæ rheumatismum & fluxione laborantes sanant,
& cataplasma Bertrucij. Aliud. ℞. mastiches ceræ
añ 3. j. opij grana iiij. croci granum vnum, applica-
tur ad tempora, sed cautio est, narcotica enim falla-
cia sunt. Quidam nanque in dentis dolore impo-
sito oleo opiato, sopore perpetuo extinctus est, vt
narrat Alex. B.

In causa frigida. Origanum cum nitro tritum,
& gingiuis superaspersum statim dolorē mitigat.
℞. piperis albi & longi, cubebæ, staphis agriæ, cor-
ticis mori & mandragoræ añ. 3. j. pyrethri 3. ij. con-
tundantur, & ex vino albo fiat decoctio, de qua ca-
lida teneat in ore. Vel abluat dentes ex aqua vitæ.
℞. aluminis rochæ boli armeni añ. 3. j. vini albi lib.
ij. fiat decoctio in phiala ad consumptionem ter-
tiæ partis, teneat in ore. Berax pulsationem den-
tium mirè sedat. Idem præstat tincâr. Serap. Col-
lutio ex lacte asinino vel capræ remedio est. Ad idē
valet collutio ex aceto, in quo decoctum sit pyre-
thrum. ℞. vernicis 3. s. vini albi lib. s. bulliant ad
consumptionem tertiæ partis, actu calida colluan-
tur dentes. Vernicis fumus arcet rheumatismos, &
cuius iuuamentum in sedando dolorem dentiū ma-

ximum est, nec habet compar, & vitium gingivæ tollit, teste Auicen. 2. cano. Refrigerati & fluxione infestati, colluuntur decocto radicum graminis, & sanantur. ℞. aquæ vitæ ℥. ij. aceti albi ℥. s. anthos absinthij añ. p. j. mellis ℥. vj. vernicis ammoniaci, theriacæ añ. ℥. j. croci grana. ij. bulliant simul vnica ebullitione, dein colētur, & cum bombace imbuta hoc liquore calido dentes fricentur congelati, deficcat rheuma, dentes firmat & dolorem sedat.

Amuleta. dens hominis appensus dolores dentium emendat. Razis. Apij radix collo appensa sedat dolorem. Auic. Seitarag radix adalligata collo. Serapio. Acus quæ pupugit oniscos, tactu sanat dolorē. Kiranus. Rostrum pici collo adalligatum. Idem. Lepidium ligatum brachio partis dolentis. Plinius.

Ad erosionem dentium. ℞. falis armeniaci, falis gemmæ añ. lib. s. aluminis zucarini ℥. iij. leuigata omnia extillentur in aquam, qua erosio dentis fricetur. Peucedanum dentibus perforatis impositū dolorem protinus soluit, Aegineta teste. Cauos cinis murini fimi impositus eos sanat, & os corrosum restituit, si credimus Marcello, vel. ℞. coralli rub. mastichæ añ. ℥. s. fiat puluis quo dentis cauitas repleatur, arcet enim corrosionem. Ad vermes dentium borax. Serap. suffitus ex semine porri Auic. Ad cauos ne penitus exedantur aut decident.

℞. gum

℞. gummi ederæ inserito cauitati, gummi quoque cupressi insertum prodest.

Ad commotos. ℞. aluminis fisci mannæ thuris añ. trita insperge. Vel fidiorum, gallarum, pyrethri, mastichæ, croci, thuris añ. trita insperge. Ab ictu cōmotos lacte asinino crebro dentes collue. Myrep. Decoctio scobis cornus ceruini ex vino illita dentibus mobiles confirmat & roborat. Ad idem. ℞. coralli albi vel rub. ʒ. j. masti. ʒ. j. fiat puluis inspersus breui eos firmat. Stomacace, est oris vitiū, quo omnes dentes vacillant, & nisi subueniantur extra compages soluti excidunt. Dens putris eruitur citra dolorem, capsula ex gummi arboris mori imposita. Vt dens sponte decidat, impone oculum vitis albæ repurgatum ceraq; munito. Myrep.

Dentes illæsos seruat radix herbæ pentadactyli quotidie commanducata. Vt nunquam doleant, collue os bis in mense ex vino, in quo decocta sit radix tinthymali. Idem. Succus cepæ dentibus illitus. Macer. Collutio ex vino myrrhato arcet cariem. Auicen. Lac nocet dentibus, gingiuisq; 3. de alim. Vt dentes non putrescant nec vacillent, ieiunus sub lingua mane salem assiduè contineat. Marcel. & Plinius. Præterea dentibus conducunt oxymel scillinum, oleum philosophorum & frumentaceum. Zazena, Musa ænea, mithridatium, aurea Alex. diaprassium.

o 5 De

De affectibus gingiuarum.

CAP. III.

Π *Agulis* est inflammatio in aliqua gingiuarum parte suscitata, *ἑπουλὶς* carnis est eminentia iuxta dentium aliquem in gingiuis facta.

Ad parulidem. *℞.* caricarum pinguium palmarum añ. numero iiij. passerum enucl. *℥.* j. iuiubarum numero xx. ordeï mundi leuiter contusi, furfuris añ. m. j. radicum buglossi *℥.* ij. bulliant simul in iusculo pingui carnis sine sale, ad consumptionem debitam, dein exprimantur, expressioni adde zucari *℥.* s. & iterum parum bulliant. de hoc liquore actu calido teneat in ore. concoquit & sedat dolorem.

Epulis curatur reprimentibus, veluti sunt ærugo rafa, galla, fori, alumen. vel *℞.* pulueris gallarum, aluminis vsti añ. *℥.* ij. fiat puluis qui adapplicetur.

Ad vlcera corrodentia & maligna gingiuarum valet puluis de bryonia, puluis Monta. in antidotario. Acetum scillinum illitum.

Ad gingiuas fluxione infestatas. *℞.* panis vsti origani añ. *℥.* s. salis *℥.* j. leuigata accommodato gingiuis. Cruentas & defluxione tentatas sale vsto attingito.

Ad gingiuas fluxione tentatas & copiam saliuæ, benefacit collutio cum vitriolo, vel alumine, aut
mastic

maftiche, & aceto fcillino. Anthera etiam puluerata, & infricata fanat. Idem præftat puluis coralli.

Ad carnem generandum in gingiuis comestis. ℞. feminis rofarum 3. j. calami odorati veteris aut indici 3. s. fiat puluis & infpergito. Aliud. ℞. florum rofarum 3. ij. calami odorati 3. j. s. fidiorum 3. j. aluminis fcissi cyperi añ. 3. s. trita infperge.

Ad incrementum gingiuarum corrofarum. ℞. farinæ orobi 3. j. cum melle fiant trochifci, quibus ficcatis in furno & poftca pulueratis, adde fang. dra. libani añ. 3. s. rofarum, iridis añ. 3. ij. fiat puluis. & infperge. Mirum gingiuarum incrementum ex vomitu acidi humoris factum dicit Cardanus: unde colligit gingiuas increfcere ex collutione aceti mixti cum fua fece.

De angina & synanchicis.

CAP. II II.

MOrbi genus peftiferum arctumq; in faucibus effe confuevit, cuius quatuor funt differētia, prima vbi fauces inflammantur. Secunda vbi nulla pars videtur inflāmata, laborans tamen fuffocationis periculum in gutture fentit: Tertia vbi extrinsecus circa fauces inflammatio apparet: Quarta vbi gutturis partes externæ tum internæ fimiliter affectæ funt. Additur raro vifa Galeno, quæ fit luxatis intro primis ceruicis vertebris. 4. de loc. aff. & 2. epi. Synanche
fau

faucium inflammatio est, Parafynanche adiacentium faucibus partium, inflammatio. Cynanche musculorum gutturis interiorum vnà cum ambiente tunica inflammatio. Paracynanche exteriorum phlegmone existit. 4.aph.com. 34. & 3. prog. 18. Synanche à suspendij similitudine nomen habet, quòd non aliter quàm laqueus præfocans interficiat. At cynanche à canibus dicitur, lycanche à lupis, hyanche à suis, quòd frequenter hoc mali Cynas, Lycos & Hyas afficiat, vt ait Aurel.

Causa externa. alimenta vel medicamēta acria, aut austerà & acerba deuorata. Niuis potatio, exclamatio vehemens, laboriosi vomitus. Addit Aretæus plagas & ossa ex piscibus ad tonsillas impacta. Anginæ fiunt ex humiditate cerebri. 6. apho. com. 2. Anginæ autumnii ex biliosis humoribus ortum habent. Quæ Vere fiunt, sunt quodammodo pituitosiores. 3. apho. com. 2. Angina ex inflammatione musculorum qui gulæ præiacent, & aliquando gulæ ipsius. 4. apho. com. 35. Anginæ occultæ causam Archigines refert ad affectum nervorum, qui ad stomachum deferuntur. Causa viscosa fluxio, vel calida & salsa à capite. 4. r. a.

Digno. spirandi & deglutiendi difficultas maior & minor pro affectus magnitudine. Angustia in larynge percepta. Loquēdi difficultas ob angustia &

& dolorem, potus aliquando ad nares reflectitur. Tumor calidus, aut frigidus intro, foras, sursum ad fauces, aut deorsum ad pectus pertinēs, perspicuus, vel omnem sensum latens : reliquas notas require 4. de loc. aff.

Præsa. est morbus peracutus. 1. aph. com. 12. Est autem acutus ex loco patiente. 2. apho. com. 9. Ab angina habito si tumor fiat in collo, bonum. 6. apho. 37. Si angina ad pulmonem vertitur, in septem diebus pereunt, si verò hos effugerint, suppurantur. 5. apho. 10. febrienti sine tumore faucium, si strangulatio subito accidat, letale. 4. aph. 34. Angina celeriter enecat, quæ nec in ceruice, nec in faucibus conspicuum aliquid efficit, ex colore, calore, mole, &c. 3. prog. 18.

Method. m. Medicari in valde acutis si materia turgēt eadem die. 4. apho. 10. Compendiarium & præceptum auxilium omnis angina requirit, ac magna sollicitudine, & contentione opus est, etiam tum quum malum remittere videtur, ut monet Aetius, statim igitur à larynge materiæ impetus auerti debet ac repelli. Mox ubi fluxio consistit, materia deriuanda & dissipanda : quod si resolui nequeat, abscessus rumpendus, vlcus tergendū & postremo conglutinandum.

Remedia, auersio fit per phlebotomiam ex humeraria, per sicyas scapulis affixas, frictionibus

vio

violenter comprimentibus manuum condylos, ligaturis artuum dolorificis, super talos & genu, super brachia versus cubitos, & supra cubitos versus humeros. Ad hæc submergere pedes & crura vsq; ad genua, & brachia vsque ad cubitum, in hoc decocto calente mirum in modum reuellit. R. rorismarini saluæ absynthij florum chamæmeli meliloti añ. m. j. squinati ℥. j. fiat decoctio in aqua cælesti & vino albo. Clysmi conueniunt, & cathartica cacochymia accommodata, hyelata tamen, nam valētioribus humores agitare prudēter metuit Auic. 9. tertij. Verūm si à pituitoso humore incidat, Almanfor statim inter initia materiam purgat pilulis cocciis, & acriore clysmo. Sanguinis missio parca, & pluribus interpositis vicibus fieri debet, ob animi deliquij & suffocationis metum, sed lata & non angusta incisio conuenit, ne sanguis tanquam percolatus, manēte ipsius crassiori parte exeat. Repellentia foris non sunt adhibenda, quia materiam intro ad partem inflammata[m] protruderent. Aliqui tamen admouent lanam succidam rosaceo & oleo chamæmeli imbutum. Gargarismatis igitur vtendum frigidis & astringentibus, vt aceto cum rosacea, omphacio, syrupo punicorū, diamoro simpl. diacario cum aqua plantaginis, diacodio. Instanti anginae R. aque hordei ℥. iij. succi putaminum nucum ℥. j. fiat gargarismus, mirè impetus catari hi suspen

spendit. Mirè etiam iuuat atramentum cassiæ nigrae cum aqua plantaginis gargarisatum. Post retrahentium vacuantium & repellētium vsū, malignis anginis auxilium præstat, venarum sub lingua sectio. 4. r. a. & ficyæ cum cutis incisione collo affixæ, vt Mansori placet. Ad materiã laryngi impactam concoquendum & dissipandum. R. aquæ althææ extillatæ lib. j. fyrupi de betonica ℥. iij. in penuria sy. adde conferuam betonicae, vel stecadis, & gargariset. Aliud. R. mucaginis seminũ maluę, & feminum caulium añ. ℥. ij. caricarum pinguium ℥. iij. glycyrrhise rasæ & contusæ ℥. ij. butyri recentis ℥. j. bulliant ad ignem, hoc liquore sæpe vtatur gargarisando, & lambēdo. R. olei chamæmeli violati amygd. dulc. adipis gallinæ añ. ℥. j. misce, & illine locum & superpone lanã succidam. R. nidum hirundinis integrum cum oleo chamæ. & amygdalarum dulc. fiat emplastrũ quod gutturi applicetur. Alexis laudat oris collutionẽ ex vino albo, in quo duę vel tres guttæ olei de vitriolo admixtę sint. Ait etiam hoc epithema super loco adfecto admotum in tribus horis persanare anginã. fit enim ex aquæ scabiosæ lib. j. aquæ vitæ ℥. misce. Aliud. R. cineris hirundinis ℥. j. cum melle rosato & farina amyli fiat loch, deglutiat lambendo vel applicetur gutturi. Si autem angina resolui nequeat, suppurantibus est coquenda, emplastro ex farina seminis lini &

& fœnugręci, deinde abscessus est rumpendus forti vociferatione, vel deglutito duriore frusto panis, vel immisso altius digito vel scalpello, tuncq; inclinato capite, ne in pulmones ruat pus.

Amuleta, vt pæonia ex collo suspensa comitiales sanat, hoc pacto succus cyrenaicus columellam phlegmone affectam iuuat, testis Galen. 6. S. Scribonius nō modo cyrenaicum, sed etiam syriacum ad anginam præscribit. Assa fœtida collo appensa valde confert, vt asserit Zoar. Eum qui per guttur lupi bibit in synancha certissima salute euadere, vir doctus scribit Io. Agricola. Ad anginam si quis grillum manu contriuerit, & ad tonsillas vel suas vel alterius tenens ter adplicuerit, tactu illo tumorem sanabit, si credimus Marcello.

An in anginis laringotomia, siue arteriæ asperę diuisura sit ex vsu? Equidē opinor incisionem quā explicat Paulus salubrem fore, quò præfocationis periculum effugiamus, sanè extremis morbis extrema remedia optima sunt. Itaque Asclepiades vltimum auxilium posuit, de quibus metus est, ne strangulētur, superiorem gutturis partem incidere, vt testatur Herodotus. Eiusdē sententiæ est Aliab. Auenzoar autem sub gutturis capite in aspera arteria tres fissuras instar foraminis naris, vel lupini in capra fecit, experimenti gratia. Constat autem quod inter semicirculos cartilagineos, & sigmoideis art

deis arteriæ asperæ vulnuscum ex transuerso fieri debet, sed de his disputat Conciliator differ. 189. Areteus verò omnino negat asperæ arteriæ sectionem vtilem fore, quoniam caliditas inflammationis maior ex vulnere efficietur, strangulatumq; adaugebit, commouebitq; tussim. Et si periculum id euaserint, vulneris oræ in vnum coalescere nequeunt, quia cartilagineæ, & inter se inglutinabiles.

De respiratione naturali & transpiratione.

CAP. V.

Spirationem respirationem'ue Gale. vocat quum ambiens nos aër per guttur attrahitur, & rursus foras emittitur. Eius partes duæ primæ, inspiratio & expiratio, & duæ per accidens interiectæ quietes. Inspiratio est aëris ingressus: expiratio contra est exitus: hæc autem duplex est, cum & sine strepitu. Quæ cum strepitu est dicitur efflatio, seu vehemēs expiratio. Respiratio secundum Galen. est actio seu motus voluntarius, cuius causa est vis animalis, sed Auerrhoi est motus naturalis, vel mistus ex naturali & voluntario, qua de re consule Forliuium 2. art. p. Certè anhelationis motus verè mistus dici nequit. quippe à sola naturali vi aliquando proficiscitur. Nec valet argumentum, anhelitus ab vtraque

To. II. Lib. I. p potest

potest fieri, ergo mistus est, sicut densatio tam à frigore quàm à calore potest euenire: ergo mista affectio est, nam voluntaria actio in mēbris mera nulla est, habet enim instrumēta naturalia. At naturales duplices: aliæ meræ, vt concoctio: aliæ cohærentes voluntati, sed nō semper, vt anhelitus, quare, vt inquit Scaliger, mista actio non debet dici, sed potius indifferens.

Causæ continentes tres sunt, facultas arbitraria, instrumenta & vsus. Instrumenta quoque tria sunt, nam alia spiritus commutationi iacent, vt nares, os, pharynx seu fauces, & aspera arteria. Cuius summa pars larynx, id est, guttur appellatur. Alia excipiunt animam, vt pulmones. Alia hæc mouent vt thorax musculis agitur, & septum transversum, isthuc respirationis instrumentum dicitur, scilicet, præcipuum. Quum enim secundum naturam se habet homo, solum sufficiēter pectus mouere potest, neque intercostalibus neque superioribus musculis indiget, quum verò imbecillum est, omnes sensim mouent, videlicet superiores, octo abdominis, & costales, quorum extimi expirationem, intimi inspirationem perficiunt. An pulmo sit proprium respirationis instrumentum? vt innuit Aristot. 3. de part. & Auer. 2. coll. disputat Concil. diff. 99. Os non est respiratorium nisi homo re præter naturam afficiatur, vt Gal. dicit 2. de v. part.

Vsus

Vfus autem duplex est. Maior infiti caloris est custodia, calor enim per immiffum spiritũ refrigeratur, & peremiffum purgatur fumido vapore. Minor est animalis spiritus nutritio. Nec aëris substantia opus est cordi, sed qualitate, verũ resp̃ratione deficiente cordis temperamētum soluitur, & animalis sequitur interitus. An spiritus nutriatur aëre, require apud Tauergam & reliquos glossematorios, sed Manardus autumat ex aëre quantumuis syncero spiritus nutriri, & reparari ex odore, non solũ spiritus, sed solidiora membra.

Insuper transpirationem Gal. vocat aëris secundum totũ corpus introitum & exitum, lib. de diff. fy. Trãspiratus, perspiratus, perspiratio' ve, est aëris attractio à calore naturali in arterias per cutem. com. in polyb. Transpirationem cor per arterias efficit. 4. de loc. aff. & lib. de ca. morb. Vnde transpiratio resp̃rationis vicem quandoque supplet, præsertim in habentibus frigidam temperaturam, vt ait Auer. 2. coll. quod patescit de animalibus quæ in cauernis latitant, & de histericis mulieribus. 6. de loc. aff. Attamen quod aër per cutem ad cor peruenire non possit scriptum relinquit Gale. 10. ther. Neq; verò exigua est transpirationis vtilitas, si naturalis calor conseruetur resp̃ratione & transpiratione, quibus læsis vnà læditur, & alienus ac præter naturam in corpore excitatur. Quo fit

p 2 vt

vt transpirationis prohibitio putredinis occasio sit, quæ non incidit vbi diffilatur corpora, emissis foras quotidie vaporosis fumosisq; excrementis, & attracta intro aërea substantia refrigerante atque ventilante naturalem caliditatē. At ægrè transpirant quæ crassa, glutinosa, & frigida sunt. nam quod habile est in habitum resolui, tale humidum est, ob id puerorum substantia facilimè digeritur ac dissipatur, propterea quia est humidissima & calidissima. Ecōuerso transpirationem prohibet aëris humiditas, frigiditas, & stegnosis, de qua disseruimus in nostro de salubritate volumine.

De omni respirationis offensa. CAP. VI.

Difficultas spirandi dum modica est, neq; ex toto strangulat, dyspnœa appellatur: quum vehementior est, vt spirare Aeger sine sono, & anhelatione non possit, asthma dicitur, quum accessit id quoque, nec nisi recta ceruice spiritus trahitur, orthopnœa nominatur, vt tradit Celsus. Est insuper apnœa, id est, nō spiratio, verum impossibile est vt animal omni spiratione priuatum in vita seruari possit. Sunt igitur quatuor differentiæ, dyspnœa debilis actio, Asthma & orthopnœa deprauata. Apnœa deperdita.

Violenta autem spiratio duplex. Simplex, quæ alter

alterutram totius respirationis partem occupat. Et composita, quæ in pluribus consistit. Differentiæ simplicis sumuntur à quantitate aëris inspirati, vel spatij per quod currit thorax respirando, sed respiratio inæqualis duplex, in vna motione, id est, inspiratione & expiratione, vel in pluribus. Prior quadruplex est, facta initio citius, in fine tardius, vel e contra. Interrupta in medio breui quadam quiete. Offendens spiritus & intercidens respiratio. Ob musculorum thoracis conuulsionem, vel caloris copiam cogentis ægrum continentur inspirare, & expirare. Ad simplices differentias pertinent efflatio, sonora, & strepens. Ad compositas verò sonitus ille spiritalium partium qui anhelando hoc est inspirando & expirando fit, oregmon à Neotericis vocatus, qui forsan *ὄρυγμός*, id est, fremitus esset nuncupandus, *μύλαι* hoc est myssare, est labijs occlusis sonum naribus elicere.

Causa dyspnœæ, virium imbecillitas, aut viarum spiritus angustia, aut vehemens in corde ac pulmone calor. 4. de loc. aff. Dyspnœa ex imposito præcordiis refrigerante medicamento. 10. ther.

Asthmatis causa excrementum aut angustia eorum quæ sunt in pulmone ventriculorum, quæ fit repleto viscere ab his quæ desuper veniunt fluxionibus. 3. aphor. com. 26. vel à tuberculis aut à glibo. 6. apho. com. 46. Asthma & orthopnœa pro-

P 3 prie

priè nominantur, quæ non ab abscessu, sed à crassis & lentis fit humoribus. 7. *ἡλ Τόν.*

Orthopnoæ causa angustia magnarum in pulmone arteriarum. Angustia verò sequitur visceris inflammationem vel crudum tuberculum vel obstructio ex liquidis & crassis viscosisq; humoribus, scilicet, cumalatis in asperis & nō leuibus arteriis. 4. de loc. aff. Pituitosus viscosusq; succus bronchia obstruens pulmonis. 10. S. Calida, nitrosa, acrisq; ex capite fluxio. 4. r. a. com. 31.

Apnoæ causa paralyfis neruorum instrumentorum spirationis. 2. de ca. sy. fit etiam per dispositiones omnium partium communes, vt in apoplexia, comitiali, sopore, catalepsi. 4. de loc. aff.

Rhogmos in vltimo pectoris est resonans stridor, vt inquit Aurel. causa sputum quod non expurgatur, sed ob nimiam plenitudinem feruet in gutture. 2. progn. Ex multa frequenti q; spiratione sputum incoctum viscosumq; factum non procedit, sed in pulmonis meatibus retentum stertorem efficit. 1. r. a. *ῥέλω* sterto. rencosq; anhelos vulgus vocat. Si cū spirandi necessitate coniunctus sit stertor, certū est humorē in cartilaginibus pulmonis contineri: si verò sine stertore sit, in his nō esse, sed in venis, arteriis, ac in substātia pulmonis. 4. de loc. aff. Stertor accidit profundè dormiētibus apoplecticisq;. 6. apho. com. 51. stertere maximè solent,

lent, qui sonum gutture prominente capiunt. com.
3. de articul. Inferior maxilla non discedit à superiore, nisi aut ebrius, aut valde ignauus, aut defessus sit is qui dormit, stertor quoque propter hæc fieri solet, relaxata quidem inferiore maxilla, & supino iacente homine. Itaque supinum iacere & hiare cum stertore, aut exolutionis, aut ebrietatis, aut ignauiae sunt signa. 2. de motu muscul. stertoris in somno causa, vti refertur apud Auicennam prima tertij, est operculum oris cannae pulmonis, quare spiritus non egreditur nisi in voce humiditatis. Ad summam dyspnoearum omnium causa triplex est, necessitas, id est, vsus auctus vel imminutus, instrumenta inobedientia, & virtus offensa, id est, de dyspnoea. Cōstat autē quod nullo instrumentorū spiritaliū affecto, fieri minimē potest vt spiratio lēdatur.

Digno. Qui citra febrem densè respirant, dicuntur asthmatici, id est, anhelosi. Eosdem ob symptoma aliud orthopnoicos appellant, quod thorace recto spirare cogantur metu suffocationis. Minus est autem quod hi inspirant, quàm pro vsu respirationis, etiam si thorax ipsis plurimum dilatetur. Ex quo manifestum fit internam capacitatem coarctatam ipsis esse præter naturam, id quod Aegri etiam haud obscuro sensu percipiunt. Id etiam contingit purulētis, ob collectum inter thoracem & pulmones humorem, & peripneumonicis, ob

p 4 pulm

pulmonis inflammationem. Restant adhuc duæ affectiones, quæ angustiam faciunt in viis per quas aër inspiratur, quum aut humorum crassorum & viscidorum multitudo pulmonis bronchiis fuerit impacta, aut tumor abscessu similis in ipso constitit.

Præfag. tribus præfatis dyspnœæ causis convenientibus, proximum mortem timere oportet, ubi verò duæ fuerint, difficile est ægrum seruare. 4. de lo. aff. Dyspnœa diutius trahi potest. Asthma & orthopnœa acuti morbi esse consueuerunt, vt scribit Celsus. Asthma in pueris fit à rheumatismo, & cito eos interficit. 3. apho. com. 26. Nos tamen cum Dei Optimi Maximi auxilio Franciscum Christianissimū Galliarum & Scotiæ Regem in infantia asthma laborantem, persanauimus. Senibus asthma hyeme familiare est, vt inquit Gariop. Qui gibbi ex asthma aut tussi fiunt, ante pubertatem moriuntur. 6. apho. 46. Quum sputum incoctum viscosumq; factum non procedit, sed in pulmonis meatibus retentum stertorem efficit, magna ex parte mortiferum esse consuevit. primo. i. a.

Method. m. affectus prædicti motricis potentia sunt symptomata, motu difficili deprauato, vel deperdito, nam respirationē per thoracem cerebrum efficit, vt transpirationem cor per arterias. Horum autem sanatio, in causarum sublatione
con

consistit.

Curatio astmatis & orthopnoæ aliquid commune habet, aliquid priuatum, & alteri tantum proprium. Commune quidem vtrisque est, vt absumatur redundantia humoris affectiones gignentis, sed proprium affectioni viscidorum humorum est, vt per attenuantia & extergentia pharmaca dissipentur, modò non calfaciant, aut valde refrigerent, de quibus scillinum acetum & acetum multum maximè opitulantur. Ei verò quæ propter tumorem accidit, vt per attenuantia & exiccantia eadem consumptio fiat, qualia sunt aromata quæ & tenuium partium sunt, & resiccatoria præter hoc quod calfaciunt, quæ curatio rursus omnibus in profundo abscessibus communis existit, vt docet Galen. 7. *ὑπὲρ τὸν*.

Accessionis tempore cathartico materia non est agitanda, ne largius in pulmones fluat, & suffocet, sed blande sputum prouocare oportet, potu ptisanæ communis, vel aquæ ordeï in qua elixata sint passulæ, caricæ, strobili, hyssopus, iris, vel aqua ordeï pota cum penidiis & tragachanta gummi & succo rad. dulc. vel &. ammoniaci puri ℥.j. dissoluatur in aqua calida, colaturam tepidam potet cum oxymelle, vel sy. acetato. Insuper in vehemēti exacerbatione, dissolue parum de moscho in aqua calida, in qua elixum sit semen ocymi, & anhelus per

P § infu

infundibulum suffiatur, mox aquam bibat. In magna ficcitate resolue moschum in ptisana, vel in decocto tragachantæ & gummi calido, & suffumigabis, post da aquam in potu, vel iulep violatum iuiubinum aut adiantium. Cum his reuellenda est materia ad asperam arteriam ruentem, & suffocationis periculum afferentem, per frictiones & ligaturas extremorum dolituras, per sicyas inanes & cū scarificatione, in natibus & scapulis. sed Arculthoraci & spondylis affigere iubet, ad anhelitum dilatandum. Errhyna & apophlegmatismi in paroxysmo non placent Graduensi. caustica laudantur in coronali vel inio, aut secundum aures, vel in humeris affixa. Affiguntur autem ad latus musculi delchoidis, inter eum & musculum extendentem vuluam, & versus musculi delchoidis finem, vt decubitus nihil impediat. Itaque cauterium vesicas excitans post aures admotum, aut radici manus, ipsiq; palmæ, humorem illum defluentem vi magna reuellit. In maxima anhelationis difficultate opitulatur plurimum si anhelio exhibeatur gutta vna ammoniaci dissoluti cum modico oxymellite simplici. Vel ꝙ. oxymellis simpl. ꝑ. ij. ammoniaci puri guttæ iiij. misce, & propinetur. Anhelitus ablatio sternutatione iuuatur. 5. apho. com. 35.

Apparantia in causa calida sunt syr. violatus adiantinu, iuiubinus, de papauere, diluti ex decocto

Et radicis dulcis & passarum vel cum aqua tussilaginis.

In causa verò frigida. syr. de hyssopo, de prassio, de thymo, de calamento, oxymel simplex & compositum & scilliticum, qui diluuntur cum duplo aquarum fœniculi, hyssopi, & similium phoracicorum. Huc refer spectatas decoctiones Mansoris, Arnaldi, Sardi, Clementini, Vigonij. Deturbatur materia minus rebellis manna, cassia, hiera simpl. cum agarico. Ad crassam & viscosam conueniunt pilulæ de agarico, coccia. ℞. agari tro. ℥.ij. pil. elefang. ℥.j. cum syrupo de hyssopo f. pil. vij. sumat in aurora. ℞. atramenti cassia ℥.j. succi ireos depurati ℥.s. cum aqua hyssopi fiat potio. Ad idem ius galli optimum est, recipit autem hyssopi radicis dulcis, adianti rec. añ. m. s. passarum enucleatarum ℥.s. in ventre galli veteris & flagellati posita elixantur in aqua sufficiente, in fine decocti, adde thymi ℥.j. sumat ℥.v. actu calidas. ℞. electuarij Regum. M. ℥.iiij. diapenidion ℥.j. misce, teneat in ore, pectus detergit. ℞. loch de pino ℥.j. s. boliarmeni 3.j. cum syrupo de hyssopo fiat confectio solida sine igne, de qua subinde in ore contineat, arcet cattarrhum & materiam in pulmone exiccat & consumit. ℞. succi caulium, mellis añ. lib. s. bulliat mel semper despumando ad succi consumptionem. in fine adde pulmonis vulpis præparati ℥. s. f. elect. sumat

fumat 3. iij. mane, & in sero 3. ij. per horam ante
cœnā. Aliud. ℞. pul. pulmonis vulpis præparati, suc-
ci rad. dulcis, cōseruæ capil. vene. se. fœniculi dulcis
añ. 3. s. cum syrupo myrtino vel melle rosato fiat
electarium. ℞. pulueris radicū althææ 3. iij. mellis
cocti & despumati lib. s. penidiarium 3. ij. misce
fiat loch, quo vtatur frequenter, loch sanum & de
pino efficacia sunt, huic malo diabutyrum fauen-
tini erit remedio, & electarium sulphuris eiusdem.

Insuper hoc malum suffitus vel sanāt vel emen-
dant, fiunt autē ex aristolochia vel ex auripigmen-
to cum fimo bubulo ficcato. Aliud. ℞. thuris 3. j.
verniciis 3. s. sandarace 3. ij. zinz. 3. j. fiat pul. Aliud
Aetij quod anhelosas & suppuratas & pleuriticās
affectiones sanat. ℞. styracis, terebinthinæ, masti-
chæ, sandaracæ añ. 3. s. sciēdum quod plus officit
auripigmentum suffitum quàm ex mero potum,
vt innuit Galen. lib. de facile parab.

Ratio victus sit causæ contraria. Iusculum cau-
lium & hyssopi cōuenit, colatura furfuris sorbitio-
nes ex lacte amygdalarum dulcium, ex cremore
hordei cum zucharo & butyro, cremor cicerum
alborum, lomentum fabarum, caro columborum,
capi, gallinæ, elixata cum croco, lac, oua forbilia.
De fructibus passæ, palmulæ, caricæ, strobili, amy-
gdalæ.

Vini potus orthopnœæ & asthmatis competit
tenuis

tenuis temperaturæ, dilutus ex aqua saccharacea, sed omnis potus modicus esse debet in his, qui alibi abscessum habent. Multus contra in illis quibus viscidis & crassis succis sunt obturata brōchia: humectatione enim multa opus habent, quò crassi & lenti humores efferantur facile, vt 7. κατὰ τόπ. scribit Galen. Constat autem quod largior potus vias spiritus humectat, non quod per arteriam in pulmonem totus illabatur, vt explicat Macrobius, sed quod ipsius exile quippiam percolatur perpetuò per eādem arteriam in pulmones. 7. de v. part. Multus tamen potus incommodat, quia referto potu ventriculo diaphragma comprimitur. Ob id præstiterit parum potus & sæpius anhelis offerre.

Ad respirandi difficultatem exhibeatur ammoniaci ℥.j. cum oxymellite, vel formetur pilule tres, quas deglutiat cum oue sorbili, & statim liberabitur ex Rosarij & platearij sententia.

Ad omnē dyspnœam à causâ non calida. ℞. croci ℥.j. moschi granum medium, vini albi aromatici calfacti cyathum s. bibatur calidum. Ad orthopnœam trochiscos de arsenico suffumigat Myrep. Ad dypsnœam & tussim. ℞. foliorum viridum bardanæ & tussilaginis añ. ℥.iiij. cōtundantur, contusis insperge lenniæ sphargidis 3.ij. & patiens ore hiāti fumū hauriat mane & vespere. N. Alex. Ad asthma difficile Varig. propinat bolum armenum cum vi-

no

no tenui dilutum. Ad anhelos & suspiriosos. R. succi ocymi ꝑ. s. croci ꝑ. s. fiat potio. mirè confert. Rhogmo acetum scillinum opitulatur. Auic. teste.

De tussi & tussicula. CAP. VII.



Vlsis & tussicula differunt secundum Oribasiū: illa enim in alto nascitur, hæc verò in faucibus. Bñg id est tussedo, est motus expultricis vehementissimo spiritu expellens humores meatus obstruētes, ad expurgandas eas quæ sunt in pulmone asperas arterias, vti ea quæ in gutture infesta sunt homo propellat. Est motus motricis potentię deprauatus, accidens tamen est naturale, nam vt alias multas natura hominibus salutis gratia ingenitas indidit passionē, ad eundem modū tussim, vt ea quæ in gutture sunt molesta propellerent. Scholastici disputant, an tussis sit malus motus, pulmonis ne, ac pectoris sit passio. Eius differētiæ ducuntur ab essentiæ ratione: vnde fit tussis continens aut interpolata, vehemēs & exigua, laboriosa vel mitis. A tempore recens & inueterata, hæc pertussis à Seneca nominatur: est insuper quædam diurna & alia nocturna. A causa vel humida est, vel sicca.

Causa instrumentorum pneumaticorum affectus proprius, vt dyscrasia nuda vel cum materia, arteriæ asperæ inæqualitas. Inflammatio pulmonis vel

vel lateris. Empyema, Animacula, vermis, calculi, grandines, calli. Quod adnotarunt Alfaharanius Zoar. Trall. Beniuenius, Aegineta. Per consensum verò destillatio à capite, inflammatio hepatis, hydrops, lumbrici, acris humor, vuæ tumor.

Dignostica, dyscrasia sine materia tussi sicca arguitur. Materialis verò omnibus obuia est cognitio. In calida tussi frigidiorē aërem attrahere affectant, cuius attractione oblectantur magis quàm aquæ gelidæ sumptu. Cōtrarium in frigida euenit. Tussis ab intemperie frigida per crebras inspirationes irritatur, & per spiritus compressionem impeditur, & interdum sanatur. Tussis cum titillatione partium ab vtraque palati parte, ostendit fluxum à capite ad asperā arteriam, item ad pulmonem deferri, vt ait Aetius.

Prælagia. Boues tussi non vexantur, quia humoris materia his extra saliuari fluxu effertur. Tusses nec aquosos, tenuesve humores, nec crassos expurgare possunt. Nā qui aquosi sunt, & exquisitè tenues, aërem qui tussiendo extra emittitur, circumfluunt. Aër enim tanquàm manus quædam existit, quæ sursum crassos humores secum ferat, sed crassitiem talem esse oportet, vt ab aëre sursum ferri possit. Tussim vetustam testes si tumeant, sedant, & ècontra quandoque testes per tusses tument. 2. epi. Tussis sicca testes si tumeant discutitur. 6. epi.

Tuss

Tussientium qui manibus laborant, melius transigunt, inibi, per consensum id contingit: nam ad manus à superna thoracis parte nerui progrediuntur. Testiculorū cum thorace affinitas. 6. epi. Tusses laboriosæ læsa pertingunt, articulosq; ibidem. Pueri qui cum tussi dentiunt, diutius durant, lib. de pueri dentitione. Plurimum alius cita tussiculas ficas discutit, ibidē. Tusses siccae leuiter irritantes in febribus ardentibus non valde siticulosæ sunt, nec linguæ aridæ. 6. epi. & 4. apho. Senibus spirandi difficultas, distillationes cum tussi. 3. apho.

Method. m. Dyscrasiæ sine materia, sola alteratione sanantur. Asperitas membranæ per lenientia & mordacitatem arcentia sanantur.

Arteriaca dicuntur quòd medeantur affectibus qui in tunica arteriæ, vel in musculis qui in larynge habentur, proueniunt, quarum tres differentiæ. 7. *ἢ τὸ πῶς.*

Bechica maximè commoda sunt, quæ in ore vel sub lingua contineri citra nauseam possunt, ut eorum exile quippiam percolatur per arteriam in pulmonem. ex his fiunt hypoglottides eclegmata, linctus' ve, quas supinus quàm diutissimè in ore continere ægrotans debet. Influit enim sic sensim & paulatim de medicamento aliquid sensibilibiter & manifestè in arteriam. Quæ in thorace continentur superfluitates promptius euacuantur per guttur,

guttur, simul cum tussi. Tenuēs & viscosæ quia per tussim expurgari non possunt, alterandæ sunt, tenuēs, videlicet, inspissandæ, crassæ verò & viscosæ extenuantibus & incidentibus. Item oportet ad id quod superfluum transmittit omnem curam conferre, & de parte affecta tantisper esse sollicitum, ne quæ confluunt prompte recipiat.

Auxilia. Ad tussim calidam sunt sy. violatus, rosatus, iuiubinus, de papauere. Candum siue zucharum lucidum cum muccagine, sem. psyllij, in ore detentum, vel cum muccagine sem. cytoniorum. Opitulatur etiã diatragaganthum frig. & penidiæ. Pilulæ papaueris curant destillationem calidam & tussim puerorum. Recipiunt autem amyli, tragachantæ gummi, succi rad. dulcis añ. 3. j. croci ʒ. 8. se. papa. albi 3. ij. cum syrupo papaueris vel glycy. fiant pilulæ parue. Clemēs addit opij ʒ. j. ʒ. zuchari lucidi ʒ. j. boli armeni ori. 3. j. fiat puluis, de quo sumat ægrotans cochlear paruum quando it dormitum à cœna. ʒ. zuchari lucidi, amyli añ. ʒ. j. cum oleo amygd. dulcium recens factò & aqua rosarum fiat eclegma. ʒ. sem. portulacæ, lactucæ, papaueris, zuchari lucidi, penidiarum, tragachantæ infusæ añ. 3. j. opij, croci añ. ʒ. 8. fiant pilulæ, quæ arcent rheumatismum calidum. Materia verò acris & calida purgatur medulla calami dulc. manna, syru. rosato cathartico, electario rosato M. pilulis aureis. Pilulæ

To. II. Lib. I.

q

ad

ad tussim, asthma, empyema & phthisim Pent. recipiunt tamarindorum 3.j. succi liq. puri 3.s. sem. portulacæ, papa. albi & nigri añ. 3.s. pil. de hiera simplici vel elefang. 3.iiij. agarici tro. 3.ij. cum mucil. sem. psyllij ex aqua violarum extracta formetur pilulæ sex pro 3. datur vnica dietim quando it cubitum. Si verò tussis sit nimis molesta, adde opij grana iiij. & dentur cum distantia à cibo. Vnguentum resumptiuum, violatum, croceum, mucilaginum, vnguentum pinguedinum, thoraci illitum tussim siccam emendat. Intolerabilem tussim saliuæ equi ex aqua calida per triduum pota, sanat si credimus Valeriano. Ad tussim à catarrho & rauim vocis, globuli, siue hypoglottides N. Alexādri ni sunt opiteri, sed canon est, apud Trallianum & Mesuem, ante curare catarrhum quā ægritudines catarrales.

Ad tussim cum alui fluore. R. spodij, gummi arabici, boli armeni, myrti añ. 3.j. fiat puluis, sumat 3.ij. omni die, vt gustui sit gratus adde zuchari rosati solidi 3.ij.

Ad tussim frigidam salubria sunt syr. de hyssopo de liquiritia. capil. ven. sy. de præsio. Loc de caulibus, decoctum scabiosæ, quod accipit, radicis dulcis 3.j. passularum 3.x. sebestem, prunorū dulcium, iuiubarum añ. 3.j. tussilaginis M.j. scabiosę M.ij. caricarum pinguium 3.iiij. palmularū 3.j. cum aqua suff

sufficiēti fiat decoctio colata cum penidiis & melle
sumat ℥.v. in aurora, vel quando it dormitū. ℞. zin-
ziberis conditi ℥.j. cum zucharo rosato veteri fiat
conditum, de quo sumat instar castaneæ quando it
dormitum & superbibat pauxillum aquæ tepidæ
vel ptisanæ communis. Aliud. ℞. electarij trium pi-
perum 3.j. s. cimini 3.ij. cum syrupo de liquiritia
fiat loch, sumat 3.ij. ter vel quater in die per se, vel
solutum cum vino.

Ad tussim antiquam cum dolore pectoris.
℞. amygd. dulc. zuchari añ. ℥.ij. sem. fœniculi ℥.j. te-
re, & exhibeatur cum iulepo. M.

Amuleta, ad anhelos berillus. Alb. dyspnœæ lin-
gua aquilæ in panno lineo appensa, Kiranus. Ad
tussim fimus corui alligatus Sext. pes corui suspen-
sus. Raz. lapis spongiæ adalligatus. Nicolus.

De pleuritide seu costali.

CAP. VIII.

Pleuritis, id est, lateris compunctio. Ex-
quisita est inflammatio costas cingentis,
vel muscutorum illi cōtinuorum in par-
te intrinseca. Notha muscutorum extrin-
secæ partis est inflammatio. Vera secundum Aui-
cennam à spuria distinguitur ex qualitate fluxio-
nis & loci patsi. Magna ac parua dicitur ex quan-
titate inflammationis. Cocta cum sputo. Incocta
cum expuitionibus, nam sputum est quòd conco-

q 2 ctum

ctum existit. Expuitio quod caret coctione. Itaque incoctam indigitant quæ est sine sputis coloratis, & quæ omnino sine sputo est, proinde sicca & astricta cruda existit. Est autem sicca in qua nihil expurgatur. Ex quo liquet quid humida laxa ve sit. Oppositorum est enim eadem disciplina. Pestilentialis quæ vagans est & perniciofa, si quidem pestis, epidemia perniciofa est. 1. r. a. com. 9. Mitissima pleuritis est in qua cruenta sputa eiiciuntur. 6. epi. com. 3.

Pluritis falso putata triplex. Nempe dolor lateris cum vehementi spirandi difficultate, ac interdum cum febre, à copia crudorum humorum, qui repente in vacuum thoracis locum, aut in pulmonem se ingerunt, membranam subcingentem distendunt, & vias spiritus intercipiunt. Nec costalis dolor qui à flatibus efficitur, pluritis est, ut sentit Aui-cen. 10. tertij. Est etiam dolor lateris cum febre, nihil à sicca pluritide differens, nisi per tussim, qui pleuritis non est, ut ait Gale. 5. de loc. aff. Igitur non omnis πλευριτις πόνος & ut scribit Trallianus, pleuritis nuncupandus est.

Causa externa, aquilonia tempestas. Interna vero fluxio, sanguinis, flauæ bilis, vel atræ, vel pituitæ. 2. de crisi-bus, & 2. de loc. aff. omnis inflammatio ex affluente fit sanguine bilioso, pituitoso, melancholico, aut ipso sanguine, & 6. aph. com. 33. Pleuritis fieri potest à sanguine, & vtraque bile, ac pituita.

ta. A catarrho pleuritis non fit, vt autumat Bertu-
tius, à quo dissentit Hippo. lib. de loc. in hom. flu-
xio inquiēs de capite in thoracem pleuritidis causa
est. Inibiq; pleuritidē à pulmonis siccitate fieri af-
ferit, ex quo patet quòd de sicca inflammatione
pleuritis quandoque prædicatur.

Digno. scientifica est pleuritidis & dysenteriaë
agnitio, certis, videlicet, definitisq; notis compara-
ta, vt ait Galen. 12. ther. sunt autem quatuor notæ
secūdum Oribasium, quarum si vna desit, pleuriti-
cus dici nō potest, videlicet, tussis, respiratio diffi-
lis, febris & dolor acutus. Gal. verò numerat quinq;
inseparabilia accidentia, primum est dolor lateris
pungens. Alterum difficultas spirandi. Tertium
tussis. Quartum febris acuta, quæ non fuit insepa-
rabilis in Anaxione. In quo soluta fuit febris vige-
simo die, & pleuritis trigesimo quarto die, vt nar-
rat Hippo. 3. epi. Igitur aliquando exquisita pleu-
ritis sine febre. Quintum pulsus cum tensione du-
ra, præse fert neruosum locum patientem, qua verò
ferræ similis est, inflammationis affectum, qua ve-
lox & frequens & magnus, ad inflammationem se-
qui febrem.

Afficiatur ne magis cingens membrana, an
musculi ipsam contingentes, à pulsibus indicium
petere oportet, nanque musculi minus, cingens
verò membrana magis & tendit, & indurat arte-
riam.

riam. Inflammata interiore membrana decubitus in latere affecto minus est molestus quàm in opposito, quòd ægrotantibus pars inflammata pendeat. Exigua inflammatio in costarum medio fieri debet, ne in alteram partem dolorem afferat, vt magna in vtraque.

In spuria si exterior membrana phlegmone laboret facilius in oppositum latus reclinant, etenim in affectam partem decubitus compressionem affert, sed in externorum musculorum inflammatione, pressio inflammato loco, extrinsecus dolere sese fatentur, nec per sputum purgatur. In hac enim nec tussis vlla, neq; vllum reiicitur sputum, neque duriciem pulsus præsefert.

Fluxionis qualitas ex sputis dignoscitur, quòd enim spuro reiiciunt, necessariò colorabitur excrementi quod in inflammata parte continetur colore. Aliquando spumofum expuunt, sed raro.

Sputa spumosa & candida fluxum pituitosum ostēdunt, flaua biliosum impermistum. Rufa amarā bilem cum plurima serosa humiditate commistam, pallida multo ampliorem humiditatem cum bile commisceri significat. Nigra atræ bilis fluxum indicant. Nigra excreant nonnunquam fluxione exassata, siue sanguinea, siue biliosa fuerit. Rubida plurimum sanguinis, minimum autē amaræ bilis in eo, qui inflammationem efficit humore
con

contineri significant. Sputum spumans, floridum, pallidum, nigrum quatuor humorum nota est. 6. epi. Temporis cognitio ducitur à materiæ alteratione, & à sputis, prout verò febris quæ venosi generis passio est, ab vrina.

Præfagia. bona sunt facile perferre ægritudinem, bene spirare, & esse doloris expertem, & sputum facile expuere, corpus totum æqualiter calidum esse, & non habere sitim. Vrina, alui excrementa & somnūs, & sudores, hæc singula bona esse percipere, pleuritidis quæ concoquitur pulsus omnem paulatim alienam à natura mutationem deponit. Quando sputum statim apparet, morbum facit breuiorem, quum verò nullo modo educitur aut crudum, indicat morbum in longius debere protendi. In summa saluberrimum est facilis spiratio, & sputum quod celeriter facileq; secreatur cum cruore, vehementer misto, & quod dolorem placat. Non est tamen securitas in sputo si virtus fuerit debilis, vt notat Razes. 4. cont. Certè vnā salus pleuriticis, peripneumonicis tum synanchicis est virium robur. 10. ther.

Nec illud omiserim quod vrinæ bonæ in affectibus ventris & thoracis, pulmonis & neruorū parua salutis spem habent, licet multum valeant ad salutem. Contra si parua^{*}, amplificat simul ægri^{*} praua^{*} periculum.

Præſag. mala. dolor ad poſteriora dorſi, pleuritis in ſiniſtro latere deterior. Sputum malum quod tarde nec facile expectoratur, quodque dolorem non mitigat, exiguumq; eſt, malum quoque aquoſum, id eſt, album & tenue, ſpumofum, viſcoſum, coloratum, olidum, nigrum, & rotundum, rotundi enim materia eſt craſſities & tenacitas, effectrix verò loci caliditas. Orygmos quaſi fremitus qui anhelando fit, exitium ſolet portendere, nam & ſtertor lætalis nota eſt. Pulſus pleurito diſtenſus periculū minatur, præſertim ſi vires infirmæ ſunt. In pulſu inæqualis ſpecies quæ ſecantis modo percipitur cū imbecilli virtute præceps ſignificat periculum. Exitiale ſignum ſi pulſus ſit magnopere durus, paruius, creberrimus. Quum in maiorē crebritatem mutatur, aut peripneumoniam, aut ſyn- copem nunciat. Nunquam in pleuritide, & peripneumonia fit, vt caput non afficiatur, vt ait Gale. 4. de ca. pul.

Vigoris indicium eſt dolor aſſiduus qui nec à fomentis leuatur, nam cum principio alterationis materiæ, ſymptomatum ſtatus iungitur, quum verò finitur principium & concoctionis ſigna apparent, tunc ſymptomatum declinatio incipit, pleuritis & peripneumonia brevis temporis habent principium. In Anaxione tamen principium ad vndecimum uſque diem productum eſt. Terminatur

tur vt plurimum. i 4. die. aliquãdo. 20. ac 34. Item per sputum, sudorem, fluxum sanguinis narium, fluxum alui, & per vrinas, parotidas & suppurationem terminatur. Pleuritici si in. i 4. diebus non repurgantur, ad suppurationem veniunt.

Dolores quos neque sputi purgatio, neque soluta aluus, neque phlebotomia, neque medicamentum, neque victus ratio sedare potuit, ad suppurationem tendunt. In peripneumoniam transmutatio mala. An alui profluuium adueniens malum? Certè malum est, si hepar compatitur. Alioqui in mediocri pleuritide & pulmonia potest prodesse ratione euacuationis, & magis quum signa coctionis apparuerint. Pulmonis vomitam per vrinam, thoracis autem per intestina & aluum expurgari vidit Galen. Diocles etiam memorat apud Herodotum pectoris suppurationes interim simul cum vrinis excerni.

Metho. m. pleuritidi quæ in generatione adhuc est reuulsio & euacuatio competit. Illa ob causam quæ defluxio est, quæ itaque reuulsione curatur, hæc verò propter humoris in inflammatione contenti vacationem. Est enim omnis inflammatio immoderata affectæ partis repletio, eius igitur sanatio intentionem habebit ab euacuatione. Vnde patescit quòd fientis inflammationis curatio mista est, ex ea artis parte, quæ arcet malum, & ex ea

q s

quæ

quæ curat.

Hippocrates reuellit simul & euacuat sanguinis missione, si ad iugulum dolor extenditur, aut grauitas brachium, vel mammillâ, aut partes, quæ supra septum transuersum sunt, infestat, vel forti cathartico, si ad præcordia dolor pertigerit. sed Galenus vitandâ esse cathartici administrationem dicit, atque per sectionem venæ vacuandum magis, etiam si ad hypochondrium dolor finiatur. Galeni sententiæ accedunt Recetiores, qui omnibus pleuriticis venam incidunt, veriti turbationem quam purgatio solet accersire. Trallianus tamen contra Galenum ab Hippocrate stat. Razes quoque reliquiq; Arabes purgationem laudant, quos Neoterici secuti catharticis vtuntur, quæ nec valenter, nec astringendo, sed tantum leniendo purgant, qualia sunt manna, cassia nigra & rhabbarum.

*
Gall. Enfirme-
rie.
Innotatio. sci-
tu digna.
An verò talis purgatio sit phlebotomiæ præmit-
tenda? Razius testatur se frequenti experimento
in nosocomio comprobasse, pleureticos interisse,
quibus detractio sanguinis ante purgationem ad-
hibita fuisset, quorum rationem esse putat Auer-
rhois, quod in penitiori corpore succorum vitia-
torum copia immerfa latebat, quæ vbi mota agita-
taq; fuit, & in actum producta perniciem ægrotan-
tibus attulit, hoc periculum potu cassiæ vel man-
næ

na vitare possimus.

An sanguinis missio in omni pleuritide utilis? non semper videtur ex usu, præsertim vbi ætas reclamationat, nam & si in trimatu puero venam secare iusserit Auenzoar, vt refert Auerrhois. Nul-
 lus tamen, si Galeno credimus, vnquam mittere sanguinem ausus est, pleuriticis admodum senibus aut pueris. Idem quoque sanguinis missionem non probat, si lateris inflammatio biliosa, melancholica, aut pituitosa fuerit. Quinimo nec phlebotomen concedit in ea pleuritide, quæ in forti æstu in homine bilioso ex sanguine efficitur, vt narrat Moses 9. apho. Galenus etiam affirmat se pleuriticum sanasse absque sanguinis detractio-
lib. de sectis.
In quib⁹ sanguinis missio celebratur.

Itaque apud Hippocratem secandæ venæ impedimentum est, incruenta spuentibus, tempus anni contrarium, morbus lateralis, bilis. hæc enim abundans, & ora venarum aperiens purgatione est educenda, maximè quod satis constat sanguinem bilis frenū esse, & cacochymiam purgatione purgandam. Si verò sanguis tempore maturationis detrahatur, sputi maturationi officit, vt monet Razi-
6. epi. com.
3.
6. epi.
4. de tuen. sanat.
 zius, cui subscribit Valescus, nam à sanguinis detractio-
 ne abstinendum esse iure censet, quum sputum facile purgatur.

Verum vbi phlebotomia conuenit, internam cubiti venam diuidere iussit Hippocrates. In eo
 scilic

scilicet, latere quod dolore fuerit affectum, hæc nanque pertusa sanguinem ab affecta parte magis & velocius reuellit, & euacuat. Neque dubites, inquit, copiosum detrahere sanguinem, donec vel rubicundior multo, vel pro puro, rubidoque liuidus effluxerit. Talis enim sanguinis in colore & consistencia mutatio, sanguinis ex particula inflammata translationem sufficienter commonstrat, sicq; velle videtur Hippocrates vno saltu duos apros capere, id est, velociter vnica sanguinis detractione simul tum reuellere, tum abeuacuare.

4. primi.
4. de t. S.

libro de
curatione
per sanguinis missionem.


Quapropter euacuationem partiri non expedit, vt putant cum Brissoto sequaces. Iterata enim sanguinis missio sanguinem à latere affecto ocysissime & reuellere & euacuare haud potest, etenim iteratæ missionis sanguinis per quam intendimus attrahere terminus est, non solum vnus dies, vt autumat Auicenna, sed secundus, ac interdum tertius vt satis indicat Galen. Est etiam vbi ex inflammationis malignitate, quæ nihil remittit, sed vehementer affixa est, vel ex virium imbecillitate, non semper expectanda in sanguine coloris & consistentiæ mutatio, vt declarat Galen. & Paulus lib. 6.

Sunt rursus qui non ferunt, tam largam sanguinis missionem, vel propter ambientis constitutionem, aut ob laborantis ætatem, vel temperiem, aut corporis habitum. Nempe candidis, & his, in quib

quibus mollis teneraq; caro est, quales galli sunt, minus detrahere oportet, quā plenitudo imperat.

In prædictis omnibus præstaret (mea quidem sententia) reuulsionis duntaxat gratia internam incidere in gibbero patienti lateri opposito. Præcipue si plethoricū corpus sit, veluti magna ex parte esse solet, nam si in brachio quod recta ab inflammato latere procedit, vena tundatur, & minor sanguinis copia quā plethoræ conueniat & inflammationi detrahatur, nulla affectæ partis fiet inanitionio. Quin potius maior fluxio ad latus passum trahetur, quoniam quæ costas nutriunt venæ cum interna seu axillari colligantiam habere certum est, quando foras introq; spirabile totum corpus est, vt ait Hippo. Confirmare videtur opinionem nostram subterior geometrica demonstratio. 6.epi.

Sit dolor in latere sinistro, aperta indidem vena plus trahit à dextro in sinistrum, quā dextra incisa in sinistrum, plus enim humoris est inter circumferentiam dextram & doloris locum, quā inter eundem locum & circumferentiam sinistrum. Sit itaque pectus hominis A, B, C, D, medietas H, I, dolor E, vena galenica F, vena Arabum G, plus est humoris inter G, & E, quā inter E, & F, ergo incisa F, minus auferet, & plus attrahet facto motu.



Vesal

Vesalius excellens anatomicus contendit axillarem dextri cubiti secandam propter fibrarum re-
ctitudinem, & ferè æqualem vtriusque axillaris à
loco passo distantiam, quod ipse non negauerim, si
vena tundatur deriuationis ergo. Nam reuulsionis
gratia semper ab opposita parte sanguis detrahen-
dus est. Detrahimusq; à tali vena non propter di-
stantiam, sed vt declinemus fluxionem à loco ma-
le affecto, ad quem fieret attractio facto motu ab
incisa eiusdem lateris vena, ratione præfactæ colli-
gantiæ. Sane Aetius cum Archigene, Aretæus,
Auenzoar reliquis cum Arabibus, Manardus, re-
centioresq; plerique omnes, non hæmophobi, sed
prudentes & docti, qui verentur semel confertim
euacuare in pleuritidis principio contrariam pa-
tientis lateris venam in cubito fodere præcipiunt,
quorum institutū nusquàm Hippocrates, aut Ga-
len. improbarunt.

Præterea non desunt qui prius de parte oppo-
sita, mox de eadem sanguinem mittunt, quod ne-
cessarium haud est, sed molestum, si quidem facta
in pleuritidis initio auersiuua sanguinis missione,
quod reliquum inflammationis superest, per spu-
tum foeliciter magna ex parte expurgari solet, vt in
sexcentis annotauimus. Palamq; est, quod quæ in
cubito fit euacuatio deriuatiua, non iuuat in no-
tharum costarum phlegmone, quia vena quæ su-
peri

periores thoracis partes alit, sub corde emergit, vel teste Galeno.

Remedia. primum dolor sedandus, quum nihil sit, quod profluuium magis proritet, & phlegmonas augeat. Mitigatur auersione fluxionis, fomentisq; anodynis. Auertitur autem fluxio sanguinis missione, cucurbitulis natibus, hypochondriis, inguinibus affixis, ligaturis dolorificis, fotu artuum calido, purgatione præfata, clysmis mollibus, non item acribus, ne alui profluuium superueniat, & balanis.

Fomenta tepida & protinus in principio, & *Cautio.* postea conceduntur, sed vbi dolor his sedatus non est, non diutius calorificis vtendū, digredientia enim medicamenta, vbi redundantia in toto corpore subest, si particulis applicētur, implent potius quā educant. ergo in phlegmonarum curatione, nullo euaporante auxilio prius vtaris, quā totum purgaueris phlebotomia, aut pharmacis clementer laxantibus.

Afferunt autem fomenta vtilitatem, vel tãquàm signum ad dignotionem, vel tanquàm causa sanitatis: nam si nihil omnino influit, dissoluendo materiam sanant inflammationem, si verò adhuc influit, quum primum adhibētur suo calore, aliquod afferunt mediocre leuamen, sed paulo post dolorem augent, & tunc fit signum diagnosticum repletionis

tionis totius, quæ curari debet remediis supradictis, porro fomenta humida vel sicca sunt. Et singulis humoribus redundantibus, singulas fomentationes despicit Trallianus, sanguini ex millio & panico, pituitæ è salibus, bili ex aqua calida spongia imbuta & expressa. Atræ bili ex tritico & furfuribus elixis. ℞. chamæmeli, meliloti, anethi, sem. lini añ. m. j. f. decoctio in aqua fluuiali, & cum spongia imbuta fiat fots supra locum dolentem. fieri etiam potest per vesicam eodem decocto plenam. ℞. radicum althææ in foliis caulium sub cineribus coctarum & cribellatarum ℥. iij. sem. lini & fœnugræci, florum chamæmeli añ. ℥. s. elixentur omnia in decocto caricarum, addendo in fine adipis porci recentis ℥. j. fiat cataplasma quod dolori applicetur.

Contra diuturnos laterum dolores, virentes cauliculi brasicæ cum radice cremati & adipe porci vetusto excepti dolori imponuntur, butyrum sine sale cōfert. Ad idem optima est aqua cardui benedicti frequenter pota, vt ait Agricola. ℞. tussilaginis m. j. hordei denudati ℥. s. aquæ q. s. coque ad tertias, pleureticos confestim iuuat decoctio radicis phu. cum zucharo vel penidiis sumpta. ℞. pulueris foliorum papaueris rubei ℥. j. aquæ pimpinellæ vel scabiosæ ℥. iij. datur de tribus in tribus horis. Vel elixentur flores ligati in linteo raro ex aqua
scabiosæ

scabiosæ ad consumptionem medietatis, vtatur hac colatura vt priori, pleuritidem per sanat, si credimus Sardo.

An in pleuritide repellentia salubria sint, vt sentit Mesues, cui refragatur Gordonius, require Cōcil. diff. 191. Equidem reor quod post fluxionis auersionem adposita astringentia, vel citra astringentia, frigida cōducunt, sed ante auersionem admota sanguinem intro compellere ac venas quæ in alto sunt implere videntur. Recentiores vtuntur cærato ex oleo violato & amygd. dulcium, cum cæra alba. vel ℞. cribraturæ rad. althææ elixatarum ℥. iij. foliorum violarum florum chamæ. sem. lini añ. ℥. ij. farinæ ordeï ℥. iij. cum oleo violato & chamæmeli fiat cataplasma, applicatur actu calidum, repellit, digerit & dolorem sedat.

Apparatur materia calida iulepo violato & iuiubino syrupo ex succo cucurbitæ, sy. de cannis, sy. de granatis dulcibus. ℞. syrups violati ℥. j. sy. de iuiubis ℥. s. aquæ tusilaginis ℥. ij. buglossi ℥. j. Aliud. sy. ex succo cucurbitæ ℥. j. sy. radicis dulc. ℥. s. cum aqua hordei vel saccharacea dilutum sumat scrapium. ℞. iuiubarum sebestem añ. ℥. ij. florum violarum m. j. s. florū borrag. m. s. rad. buglossæ rec. ℥. j. sem. maluæ ℥. iij. sem. cytoniorum ℥. s. succi mali granati dulcis ℥. vj. cum zucharo albissimo & aqua sufficienti fiat iulepus.

To. II. Lib. I.

r

Mate

Materiam parti inflammatae affixam purgantia.
 ℞. medullae calami dulcis ℥.j. vel 3. x. rhabarbari
 optimi infusi in decocto thoracico, & mane ex-
 pressi 3. i. s. syrupi violati ℥.j. cum praedicta deco-
 ctione fiat potio. Aliud. ℞. mannae purae, medullae
 calsiae nigrae recens extractae añ. 3. vj. rhabarbari
 infusi, & expressi 3. iiii. cum decocto prunorum
 dulcium sebesten iuiubarum adianti albi florum
 trium & rad. dulcis fiat potio. Vitanda sunt scamo-
 neata & omnia myrobalanorum genera.

Sputum promouent in ore retenta, zucharum
 candum & violatum iulepi supra scripti, diatraga-
 canthū frig. pilulae albæ, syrupus rad. dulc. eclegma
 de pino per se, vel cum syrupo violato & diatraga-
 gantho exceptum. Aliud. ℞. zuchari candi violati
 3. x. penidiarum ℥.j. s. diatragaganthi frigidi ℥. iij.
 succi radiceis dulc. puri 3. vj. seminum communium
 frigidorum maiorum decorticatorum, strobilorum
 recentium praeparatorū añ. ℥.j. cum aqua scabiosae
 fiat loch seu linctus.

Dietae qualitas à morbi essentia sumitur, vnde
 frigida magis vel minus instituitur, semper tamen
 humida & laxans, quia morbus astrictus, eoq; actu
 frigida nocent. Adde quod frigida pectori inimica
 tussēs mouent. Non solum frigida aqua pota, sed
 etiam frigida respiratio noxia est, vt dicit Aretæus,
 & Celsus vtendum, inquit, cibis potibusq; calidis,
 scilic

scilicet, actu, vitandum frigus, & cuncta quæ bibenda exhibentur actu calida esse debent, quoniam semper aliquid insensibiliter aut per sudores resoluitur, & quia frigida poros densant, resolutionem potus frigidus arceret. Quantitas cibi præscribitur respectu virium, & prout morbus magis vel minus acutus est. Item ex particularibus accessionibus. Nam perquam modice additioni studendum est, ablationi verò in totum intendere sæpenumero prodest, modò sufficere possit Aegrotās. Itaque in principio in quo confluit materia, quæ omnino cruda est, symptomatum est status, quare tenuissimo victu utendum. Deinde remissis symptomatibus per materiæ coctionem, quo copiosior fuerit sputi purgatio, eo cibum oportet esse auctiorem, sed ordo particularis dietæ à cōsuetudine ducitur.

De potionibus aquam bilem nō generare contra Hippo. & Galen. astruit Trall. Iulepum Gord. quod nutrit, infrigidat & detergit. ℞. aquæ lib. j. mellis aceti añ. ℥. s. zuchari ℥. ij. Idem concedit vinum album pauciferum & dilutum. Et gallinæ non valde pinguis cum feminibus frigidis decoctum, vinumq; granatorum dulcium virium, scilicet infirmarum ratione. Mala tamen punica esse pectori hostilia scribit Tral. & Rases, quod de acerbis intelligendum. Auenzoar ab omni carne, & pane triticeo cauendum esse ait. Iuscula cōueniunt

ex cremore hordei, & auenæ, colatura furfuris, & ex lacte amygdalarum dulcium, & panatella vocata ex pane eloto. Somnus in omnibus internarum partium inflammationibus circa initia noxius est, quia sanguis per somnum ad interiora magis abit. Si dormiat æger in partem affectam phlegmones materia largior resoluetur, & indolentior erit decubitus, quo etiam facile sputum reddetur attestante Mesueo.

Empirica apud Leonellum. ℞. pulueris visci querni 3. j. datur ex vino. Item aqua cardi benedicti pota æque valet, opifera etiam est aqua pimpinellæ pota. Item. ℞. rasuræ dentis apri 3. j. plus minus, olei ex semine lini recens facti 3. j. sumat in potu. Aliud. Goneti pharmacopollæ. ℞. membranæ diuidentis nucleum nucis iuglandis, nucleorū glandium añ. 3. ij. radicum meu 3. iij. croci grana xij. f. puluis, dosis 3. j. vel ij. datur ex vino albo aquoso vel cum aqua salubri per sanat.

Si autem pleuritis suppuretur. ℞. muccaginis, sem. lini, fœnugij, sem. maluæ & althææ & radicum eius añ. 3. ij. florum chamæmeli & meliloti añ. 3. j. cum oleo amygd. dul. chamæmelino & butyro recēti & adipe gallinaceo fiat cataplasma, loch ad idē. ℞. butyri rec. sine sale 3. iij. muccaginis caricarum 3. ij. olei amygd. dulc. recens facti 3. j. cum zucharo misce & fiat eclegma de quo in ore contineat æger

æger lambendo.

Abcessum rumpet tussis frequens & vociferatio, vomitus, sternutatio, & vehemens corporis concussio. Ad idem. ℞. radicum althææ elixatarum ℥. iiij. pistis in mortario adde butyri ℥. j. mellis ℥. j. & fimi colubini ℥. ij. misce fiat empl. quod loco passio admoueat. Aliud. ℞. caricarum pinguium lib. j. tere. & cum adipe suo vel oleo amygdalarum dulcium fiat cataplasma addendo muccaginis gummi arabici ℥. j. Aqua deinde saccharata, vel hordei decoctum vlcus tergent, si verò febris sit remissior, etiam hydromeli. Vlcus postremo glutinabunt bolus armenia, terra lemnia ad ℥. j. & cætera in phthisi dicenda.

At si pleuritis notha sit, cucurbitulis & phœnigmon excitantibus foras magis trahatur, coquatur, rumpatur, tergeatur, glutinetur.

De peripneumonia inde pneumonici & pulmonarij dicti. CAP. IX.

Π *Ἐριπνευμονία* pulmonum inflammatio est cum febris acuta, & spirandi necessitate. Duplexq; est, vera & spuria, illa à sanguine fit, hæc verò ab aliis humoribus. Conciliator diff. 100. taxat Mesuem, qui exquisitam à pituita fieri autumat.

Causa. pulmonum imbecillitas, ob quam illi

1 3 promp

promptum est omnes suscipere humores, nā post glandulas ad excipiēdum fluxiones pulmo promptissimus, quod videlicet, hic tres facultates imbecillas habeat, corpusq; eius laxum, leue, rarum sit. Viscus quia laxum & molle, vndiq; à pituitosiore, atque crassiore inflammatur sanguine, vt scribit Galen. 4. de ca. pul. Et quemadmodum pleuritis à defluxione biliosa vt plurimum efficitur, sic pulmonia à pituitosa destillatione magna ex parte ortum habet. Item ab angina, à morbo laterali, ab asthma, aliis' ve morbis contrahitur.

Dignostica. Adest orthopnoea, id est, tāta spirandi difficultas tātaq; angustia, vt suffocari pneumonici videantur, ac erecti sedere conentur. In his ergo multo est opus spiritu, sed ob coartationem locorum parum inspiratur, quare densitas iacturam paruæ inspirationis restaurat, ob id horum spiritus est paruus & densus. Itaque omnes qui ob talem coartationem sufficienter inspirare non possunt, stertorosam faciunt respirationem, & in suffocationis periculum veniunt si decumbant, pulsus horum magnus, languidus, mollis cum multiformi inæqualitate. Insuper adest tussis, thoracis distentio & grauitas, absque dolore punctili. Malæ multo rubore suffuse, quod per sputa deicitur spumofum est. Quod si membranæ quæ secundum thoracis longitudinem sit connexæ inflammētur, etiam

etiam dolorem punctilem æger percipit. In summa pulmonia indicia sunt spirandi difficultas, cui & angustia & grauitas coniuncta est, cum acuta feбри. At si intolerabile incendium fuerit, angustia verò, grauitatisq; minor sensus, erysipelas egrotum vexare censendum est. Quum vtraque costarum latera dolitant pneumonia est, quum alterū tantū, pleuritis. Hippo. lib. de loc. in homine. Pulmonariis in vltimo pectoris adest rhogmos. Aurel.

Præfagia. pulmo si phlegmone arripiatur, letale. 6. epi. com. 2. A pleuritide pulmonia malū. A pulmonia phrenitis malum, periculosior peripneumonia est, quàm costalis, & biliosa deterior est. Mesueo teste. In pulmonia alui profluuium malū, hæc sanguinis fluxum non amat. Grauiissima est in qua nihil expuitur, & quàm rarissime spumosum expuunt. Non repente, sed paulatim strangulat. Eam sanat pleuritis superueniens. 6. epi. com. 6. Ea forti affligente si abscessus ad crura descendat, bonum. 2. prog. com. 67. Si suppuretur, in vtraq; thoracis parte colligitur pus, ibi com. 59. Si pulmonia materia ad urinæ vias terminetur, bono est, pneumonia ex angina nata, magna ex parte iugulat infra septimum diem, aut transit in phthisim.

Metho. m. In curationis initio è vena axillari dextra sanguinis detractio prodest, in calida, scilicet, affectione, nam sola ratione plethoræ, aut af-

r

4

flux

fluxuri humoris, vena pertusa in hoc affectu iuuat, nihil enim à pulmonibus, cordisq; dextro ventriculo venæ sectione educi potest. Sed vitanda sanguinis detractio est, dum ex aliis morbis pulmonia dependeat, & si in statu morbus fuerit. Topica nō solum parti anteriori sunt admouenda, sed etiam posteriori. In quibus maior esse debet in penetrando vis quàm in pleuritide, nā in penitiori loco affectio collocata est. Item omnia quæ in phlegmone pulmonis, thoracis, hepatis, ventriculi, renum, vteri, bibenda exhibentur, actu calida esse debent, quoniā semper aliquid per poros digeritur, aut per sudores resoluitur. Salubres sunt clysmi molles, glandes, & purgatio per cassiam nigrā & mannam. *R.* medullæ cassiæ *℥. j.* succi ireos depurati *℥. iij.* cum aqua hyssopi fiat potio. Aliud. *R.* mannæ *℥. ij.* succi ireos *℥. ij.* cum decocto thoracico f. potio. Ab his reliqua curatio iisdem quibus pleuritidi medemur tentanda est.

In causa frigida purgatur materia per pilulas coccias, vel ex agarico m. expectoratur verò per loch de scilla, loch ad asthma, loch sanum.

De empyemate.

CAP. X.



Eμπύημα est collectum in thorace pus. Empyisis, id est, purulentia est suppuratio thoracis in medio spatio inter pectus & pulmon

monem. Suppurationes dici ab Hippocrate quous abscessus in pus conuersos palam est. 7.aphor. com. 43. In empyis pus quod medio spatio inter pectus & pulmonem continetur, ex pulmone expuitur. Et suppurati dicuntur, qui in spatio inter thoracem & pulmones collectam habent puris multitudinem.

Causa. abscessus vel inflammatio partium thoracis, aut pulmonis, vti sunt peripneumonia, costalis, hæmoptysis, ab angina suppuratio. Suppurati citra febrem ex seroso aut pituitoso humore fiunt, ex reliquo corpore in vacuum thoracis delapso, illicq; putrefacto. A capite destillatio humoris in thoracem, qui inibi alteratur in pusq; vertitur. Puris enim generatio fit ab alteratione, quæ media est inter eam quæ est secundum naturam, & eam quæ præter naturam existit. Pus etiam efficitur ex partium spiritalium vlceribus, nam vlcerum excrementum tenuius sanies dicitur, crassum verò fordes, siue pus.

Dignost. suppurationis indicia tria sunt, rigor febris, & pondus. Eius ruptionem indicant dolor, difficultas spirandi, tussedo, scretioq;. 2. prog. Puerulentia causa phthoes, lib. de loc. in hom. febricitant pectore suppurati indefinenter hecticem, vt ait Aetius, horum pulsus est inæqualis & inordinatus, cum parua respiratione. Pus est crudo humori

r s calo

calore & crassitie simile, differens tamen odoris grauitate & lentore, nam iniectum carbonibus male olet.

Cur autem pus aquæ calidæ permistum descendit ad ima? An quod viscidum non sit, vt putat Nicolaus. An verò quod ob adustionem graue redditur, vt sentit Gord. Equidem reor quod à putrescentibus leuiora elementa citius exhalant, & ob id ipsum quæ putrescunt grauiora redduntur, sed contrarium euenire videmus, nam cadauera in aquis mersa tertio vel quarto die attolluntur, quum scilicet, putredinem sentiunt, putredo enim corpora leuiora facit, sciendum insuper quod à pure optimo non separata est putredo, licet huiusmodi pus à naturali fiat calore, sed non plane vincente, & quæ præter naturam fit alteratio, cum olida putrefactione efficitur.

Præfagia. Empyji nisi repurgentur, suffocationis periculum his imminet, ob crassorum lentorumque humorum copiam, asperæ arteriæ inhærentem. Quæ rumpuntur suppurationes sursum versus in vacuum thoracis locum, periculosiores sunt, quæ verò deorsum, in aluum & intestina atque in vesicam transfunduntur. Qui purulenti vruntur, aut secantur, si pus vniuersum effluerit, omnes intereunt: si fluxerit candidum, sine foetore seruantur, si subcruentum cœnosumve, pereunt.

Metho.

Metho. m. danda sunt medicamenta attenuantia quibus & viæ aperiantur, & quæ deferenda per eas sunt, dissecentur, præsertim quum vel crassæ substantiæ sunt vel glutinosæ, qualia in empyis sunt, humiditas quæ præter naturam continetur, curanda est omnimoda euacuatione. Itaque quæcunque in pulmone vel pectore cōtinentur superfluitates cum tussi educuntur, aut à medicaminibus extenuantibus. Materia coquenda est, vt nō putrescat, sed suppuretur, & in pus bonum vertatur. Concoquetur autem topicis vti oleis & emplastris. Si verò fuerit crassa & lenta detergentibus, & dissecantibus, hisq; detingibilibus, vt arteriacis & eclegmatis.

Remedia sunt diahyssopum, diapapauer, diaolibanum, diatragacanthum, eclegma de pino, lochsanum, linctus è pulmone vulpis, diapenidion, confectio alba Mesues cap. de tussi humida. ℞. butyri rec. ℥.iiij. mellis, zuchari añ. ℥.j. amygd. amararum decorticatarum ℥.s. misce f. mistura sumpta subinde expectorat saniem. ℞. amygd. decorticatarum pinearum añ. ℥.ij. sem. lini afsi, orobi passularum rad. dulc. añ. ℥.s. dactylorum numero iiij. succi glycyrr. puri 3.iiij. amygd. amaras iiij. cum melle & zucharo fiat loch, detergit pus, valet etiam in tabe. Aliud. ℞. pulmonis vulpis præparati succi rad. dul. conferuæ adianti albi, sem. sceniculi dulc. añ. ℥.s. cum

cum melle rosato vel syru. myrtino fiat linctus, abstergit, consolidat vlcera pulmonis & thoracis, & in phthisi præferendum est aliis remediis, vt asserit Clementinus.

Apud Malef. sic ē.

2. aq. capill. ven.

aq. rad petros. et

farnic. añ. ʒ. i. sacch.

ʒ. i. ʒ. i. fiat iulep.

cum vsu frut

cuius quidam

Montespuli.

℞. aquæ capil. veneris, radicum fœniculi & petro. añ. lib. ʒ. ʒ. i. zuchari lib. ʒ. ʒ. i. fiat iulepum. Ad idem syrupus expectorans pus in febre. ℞. tussilaginis adianti albi, anthos añ. m. j. sem. endiuie, citruli melonis añ. ʒ. j. iuiubarum passul. rad. dulcis rasæ añ. ʒ. ij. cum saccharo puro fiat. huc refer serapiū & emplastrum Gordonij & Bert.

℞. carnis cancrorum fluuialium elixatorum lib. j. pista & tusa & cum farina ordeï cōmista fiat emplastrum, maturat vomicam pulmonis. Ex pulmonibus exrrahunt difficiles excreationes leporis pili suffitu. Al. B. Aliud. ℞. styracis, terebinthinæ, sandaracæ, mastichæ añ. ʒ. j. misce, fiat suffitus ad tussim, asthma & empyema.

Qui suppurati plurimum habent pus, adeo vt desperent per sputum posse expurgari, ex loci angustia, difficultate anhelitus qua maximè infestantur. Tales secandi, aut vrendi sunt, modo in sectione caueamus vniuersam euacuationem, vt iubet Hippocrat. 6. aphoris. At fieri punctura debet inter secundā & tertiam costam, à nothis costis computando. Si verò purulentia in vtroque sit latere, necessaria erit vtriusque lateris sectio: quia à latere

vno

vno ad aliud materia fluere haud quit, propter membranas, quæ in duas partes totum thoracem intersepiunt, ex huiusmodi sectione deploratos aliquot pleuriticos seruauimus.

In victus ratione aër siccus salubris, panis siliginus seu semidalites: vtatur etiam vino albo non fumoso, carne gallinarum perdicum, vituli, hœdi, qua sorbilia recentia, lacte asinæ, & caprillo, butyro recenti cum zucharo. Iusculis carnis boni succi & facilis coctionis, iusculo hyssopi & brassicæ, colatura furfuris, cremore hordei, & auenæ, iure capicum croco, iusculo cicerum alborum conueniunt insuper strobili, amygdalæ, vux passæ, caricæ, dactyli, aqua hordei, ptisana vulgaris & aqua mulsa.

De hæmoptysi, inde hæmoptysici. CAP. XI.

Est sanguinis expuitio, vel reiectio, quæ à pulmone vel ab aspera arteria prouenit, sicut sanguinis excretio à stomacho, vt ait Herodotus. Sed differt sanguinis sputum à fluore, nam sputum dicitur quum pituitæ permiscetur, modicumq; excernitur, aut congestum, fluor autem quum sub qualitate multa sanguis expuitur rutilans non congestus, vt interpretatur Aurel.

Causa, rexis, anastomosis, diabrosis, id est, venarum ruptura, apertio, corrosio. Carne circa costas detrita

detrita aliquo modo, multi sanguinem expuerunt, lib. de articul. Vnde costa affecta, & pulmone nihil violato, sanguinis sputum apparet, quando sanguis in pectus ducitur, deinde in expiratione in asperam arteriam transfertur. Sæpe etiam inuiolata cute, quæ fracturam tegit, effunditur cruor, sic ut fascias impleat.

Dignost. Qui spumofum sanguinem expuunt, his à pulmone eductio fit.

Præfag. sputum sanguinis nisi in tabifico sit, omnino caret periculo. Qui euomunt sanguinem sine febre, salutare, cum febre malum. Sanguis per os effluens confert capitis dolori. Adolescentibus sanguinis expuitiones. Sanguis per os emissus qualicumque fuerit malus. Omnis sanguinis expulsio menstuis exceptis, est toto genere præternaturam. Omnium ægritudinum periculosissima est hæmoptysis, teste Tralliano. Sanguinis fluor maximè semper periculo copulatur. Maximum incommodum ex pulmone sanguinem reicientibus, ob medicamenta astringentia thoraci imposita accidit, lib. de const. ar. & v. ther.

Meth. m. Mora & dilatatio cum omnibus morbis nociua est, tum verò magis in sanguinis reiectione, ut ait Trallianus, à quo Galenus notatur, quòd calidis & siccis in hæmoptysi, quæ ab erosionem fit, vtatur. In sanguinis reiectione primum
peric

periculum est, ne immoderata eius euacuatio fiat. Proinde laboranti iniungendum est, vt nec respiratione vehementer, ac semper silentium agat. Venæ cubiti interna protinus incidenda, à qua bis, terq; postea sanguis est detrahendus, auertendi, scilicet gratia, tum artus omnes fricandi vinciēdiq; sunt. Ab his posca diluta tepida potui offerenda, vt si in viscere cruor concretus latitet, solutus expuatur; postea emplastica & astringentia ex posca, vel maiorum myrtorumq; decocto exhibenda sunt.

Vbi verò sanguis suppressus est, curatio eius quæ ex resecratione osculi alicuius vasis contingit, per obturationem fit osculi dilatati. At eius quæ est ex vasis ruptura, per conglutinationem, sicut eius quæ ex erosione fit, per erosorum renutritionem.

Obturatur autem os resecratum per astringentia, conglutinatur ruptum per eadem, & per resiccantia citra mordacitatem, & glutinosum quiddam habentia, velut lemnia terra, & samius aster. Renutrientur corrosa per pharmaca carnem gignentia, & per cibos boni succi. Circuncidimus omne nutrimentum si æger sit validus, sin aliter sorbitionis quod satis est, concedimus. Sed distributionis ratione, miscenda sunt astringentibus calida, & tenuium partium. Interdum etiam stupefacientia pharmacis congruentibus adduntur, tum quod sistunt sanguinem sua frigiditate, & somnum conciliant,

liant, sicq; tussim mitigant. In summa apertis vasis astringentia, ruptis glutinantia, exesis sarcotica, & boni succi alimenta remedio sunt.

Primum auertere sanguinē oportet à vena aperta vel rupta, secta cubiti vena interna, misso sanguine quoties necesse erit per epaphæresim. huc pertinent frictiones, & fots ex aqua calida partium infernarum, ligaturæ dolorificæ, sicyæ coxæ, nati- bus, & inguinibus affixæ. Mox biliosum sanguinem apparare oportet syrupo rosato, ex oxalidis succo ex omphacio, ex succo granatorum cydoniorum myrteo, cum duplo aquarum plantaginis portulacæ, solani.

Deinde bilis purganda syrupo rosato laxatiuo cum decocto corticum myrobol. citrearum. vel ~~æ~~. medullæ cassiæ nigræ ℥.j. rhabarbari 3.j. cū aqua plantaginis & solani fiat potio.

Glutinantia vlcus & quæ oris hiatum cōtrahunt sanguinem sistunt, vti sunt folia portulacæ cruda, in ore retenta, vel commansa, tro. de terra sigillata, & de carabe ex aqua portulacæ & plantaginis, cum 3.j. penidiarum poti. Aliud. ~~æ~~. diatrag. frigidi solidi ℥.j. boli armeni ori. 3.j. terræ sigillatæ 3.j. cum syrupo myrtino fiant globuli vel hypoglottides. Aliud. ~~æ~~. tro. de carabe 3.j. tro. de terra sigill. 3.ij. boli armeni 3.j. ~~s~~. lapidis hæmatitis loti ex aqua plantaginis 3.j. spodij 3.~~s~~. coriandrorum præpa-
ratorum

ratorum granum vnum, cum succo plantaginis fiat
massa ex qua formentur pilulæ vij. pro 3. sumat iij.
vel v. in aurora.

Aqua nasturcij pota sanguinis reiectionibus
prodest. Al. B. Alexis in suis arcanis laudat fimum
muris potum cum succo plant. & zucharo.

Cortex suberis tritus & ex aqua calida potus
sanguinem fluentem per inferna & superna sistit.

Eius cinis ex vino calido potus sanguinem ex-
creantibus maximo est auxilio, vt scripsit Leo-
nicerus.

℞. syr. myrtini & papaueris añ. ʒ. j. boliar. 3. s.
sumat in nocte, sanguinem sistit, & claudit orifi-
cium venæ ruptæ.

Et quia in hoc affectu minime à paruis inci-
piendum auxiliis est, sed statim vlcus glutinādum,
ob id, circa initia opiatam exhibemus, videlicet,
philonis perfici ʒ. j. vel athanasia 3. s. repetatur
remedium per iij. vel iiij. dies.

Ad hæmoptysin sine febre, purganda materia
per interualla diluto rhabarbari cum māna & cum
decocto fructuum iuiubarum sebesten tamarind.
& liq. & passul. Deinde sumat omni mane & ve-
speri ʒ. j. electarij sequentis, quod recipit tro. stellæ
3. vj. zuchari rosati veteris, lib. j. misce. After est ter-
ra Samia Tralliano. After Samius est talchum. Dio.
à quibusdam stella terræ vocatur, vim adstricto-

To. II. Lib. I.

s

riam

riam insignem habet.

Ratio victus refrigerans, siccans, & astringens conuenit, & tenuis. lac idoneum est, coctum variis modis propinare iubet Trial. Iuscula carnis, inquit, vlcera magis detergant, ventrem humectant, & febres intendunt, concedit mala, pyra, pepones, si febris, aut sitis affligat, de iusculis milium panicum oriza, cremor ordeï, pisces glutinosi extremitatesq; animalium, vinum austerum crassum dilutum aqua ferrata, aut calyбата. Vinum quoque mali punici. Quies corporis & animi, silentium & somnus fluxus omnes cohibent, sed rubeus color hæmoptysicis nocet, testibus Galeno, & Mose.

De phthisi seu tabe.

CAP. XII.



Abis tres sunt species apud Celsum, atrophia, cachexia, phthisis. Atrophia est affectus, in quo corpus non nutritur, quod sane intelligendum est, nam tandiu viuimus, quandiu nutrimur, vt est Aristotelis sententia 2. de anima φθίσις & φθοή, id est, tabes est totius corporis cum febre parua extenuatio. Tabidi etiam dicuntur non solum qui phthoëm patiuntur, sed illi quoque qui huic malo obnoxij sunt. 4. aphor. com. 8. φθίσις à verbo φθίνας dicta videtur.

Causa. tabes pulmonis vlcera insanabilia consequit

quitur. 7. apho. 16. Insuper efficitur à destillatione
falsæ pituitæ, à nimio labore, ab affectu spinæ, vt
vult Hippo. Destillatio à capite in pulmonem de-
scendēs maligna, tenuis, & corrodes. 6. epi. com. 3.
ab empyemate tabes. v. apho. 14.

*lib. de morb.
qui intus.*

Dignost. tabidi hectica febris laborât, nunquam
cessante, phthoe pulmonis vlcus est cum febricula.
7. apho. 16. ferinus affectus de maligno dicitur, vel
de tabe, quoniam in phthificis vngues incuruan-
tur, vt in feris. 6. epi. com. 2.

Præfag. Qui restricto sunt thorace, vt à tergo
in modum alarum promineant, Alati dicuntur.
1. epi. com. 1. Alati ad phthifim sunt expositi. 3.
epi. flatulentiq; sunt. 6. epi. Tabes maximè fit per
ætates ab anno. 18. ad 35. v. apho. 9. fit etiam in
autumno. 3. aph. 13. Tabidis autumnus malus, est
morbus contagiosus. Difficilis eius salus, aut nulla.
Tabitudo maximum difficilimumq; malū. 3. epi.
Si sputum graue olet, & capilli defluant, letale. Si
capilli defluant superueniente alui profluuio mo-
riuntur. v. apho. A puris sputo phthisis & fluxio,
quum verò sputum retinetur strangulati moriun-
tur. 7. apho. 16.

Metho. m. consistit in causarum abolitione,
primum si adest plethora, si per vires licet, sanguis
detrahatur, si verò cacochymia purganda est. Insu-
per in tabe tria mala sunt, vlcus, sanies, aut pus, &

S 2 con

consumptio seu marcor, vlceri conuenit conglutinationo, saniei puriꝑ; deterfio, maciei verò analeptice, quæ per cibos coctu faciles, boni & multi alimenti emaciatum instaurat, hæc omnia præsidia lacti optimo insunt, nam serosa sui parte detergit, casosa ducit ad cicatricem & butyro nutrit, & reparat.

Vinum quoque album, aquosum, defecatum subdulce, cibus est, potus & medicina, siquidem nutrit, sitim sedat, abstergit. Adde quod velociter in calorem naturalem & spiritus conuertitur, sed vinum cum lacte non bibatur, ne in ventriculo lac cogatur.

Salubris etiam hordei ptisana est, quia nutrit, infrigidat, abstergit.

Ad hæc tria sunt, quæ cibi & medicamenti habent facultates, nempe mel, caro caudarū, & chelorum, cancrorum fluuialium in aqua hordei elixatarum, & zuccharum rosatum, cuius vsu plurimos persanatos affirmat Auicen. recens potentius tergit, ad glutinandum vetus datur cum bolo armeni, vel sanguine draconis.

Ad idē. ℞. saccari rosati veteris ℥.vj. carabæ margaritarum non perforatarum, ossis de corde cerui sang. dra. añ. 3.ij. macis opij añ. ʒ. & misce f. elect. de quo sumat omni mane, & vesp̄eri 3.ij. & superbibat modicū de lacte asinæ vel capræ, vel aquam deco

decoctionis hordei, & myrti.

Huc spectat syr. Gordonij, syr. electarium, & puluis Valesci duo Salyceti remedia.

Electarium de pimpinella Sardi, fit autem ex puluere foliorum cum melle vel saccharo, de quo sumat omni mane 3.ij. cum 3.iiij. aquæ pimpinellæ, recens extillatæ.

Aliud. R. hyssopum caricæ & carnem cochlearum, quæ extillentur in balneo Manè sumat huius liquoris 3.iiij. sy. violati 3.j. s. misce pro vna dosi, repetatur, confert etiam hecticis.

Aliud. R. sanguinis hominis sani, vel suilli, lib. j. carnis cochlearum & pistarum, lib. ij. cinamomi 3. s. croci 3.ij. extillentur in meta vitrea in duplici vase, dosi 3.ij. cum zucharo rosato.

R. Carnis cancrorum fluuialium in aqua hordei coctorū, strobilorum recētium, pistaceorū, præpar. amygd. dulc. decorticatarum passiarum sine gigartis sem. cucumeris satiui & melopeponis purgati, q. s. singula separatim conterito, quibus adde penidiarum zucchari albissimi, q. satis sit, ex aqua cochlearum destillata ad vnitatem redigito.

Pulmonaria in cibo sumpta vel pota peculiari est remedio, consiligo putatur. Radix, inquit Vegetius, bibi debet ex aqua, haberiq; in ore assidue sub lingua. Suum & pecorum pulmonum vitio laborantium remedium præsens est, vel traiecta tan-

s 3 tum

tum in auricula radix, vt tradit Plin. Vnde patescit, quòd magnus est consensus inter aures, & pulmonem, vt innuit Aristoteles in problematis, surdorumq; pulmones vitiatos esse putat.

An consiligo illa sit herba, quæ pecudum pulmonis vlcera ducit ad cicatricem, cuius meminit Auenzoar. i. therfir.

De tergentibus etiam sunt serapia de rad. dulci, de hyssopo, de prassio, syru. adiantinus, cum aqua scabiosæ dupla, vel cum decocto pectorali, decoctum myrti & hordei cum puluere boli armenæ, ficeat & ducit ad cicatricem. Ad idem pollet aqua boli arm. extilata, dosi 3. j. cum vncia vna aquæ pimpinellæ pota per tres horas ante prædium, benefacit etiam aqua vitæ cum bolo armenia pota. Quibusdam placet oleum de vitriolo cum aqua adianti potum. R. pulmonis vulpis præparati boli armeni añ. 3. s. capiat cum luteo oui sorbilis. Opitulatur terebinthinæ vsus frequens, quæ exhibetur cum ouo sorbii, huc refer tro. de camphora, sumendi omni die cum aqua pimpinellæ. Ex inspiratione aëris ficci vt mulieri fornariæ contingit, vlcus occaluit. In diuturnis malis terram commutare vtile. 6. epi. maximè vbi ad ambientem contrarium delatio fit, vt ad tabidas, s. ther. In Aegyptum quosdā nauigasse prodit memoriæ Plin. Sed syluæ quæ picis resinæq; gratia raduntur, salubriores sunt quàm nauig

naugatio Aegyptia, & plusquàm lactis herbidos per montium æstiuâ potus, vt ait Ruell. Lac vt dictum iam est, & præcipue humanum, asinæ & caprillum competit tabidis, nisi adeò febriant. 5.apho. Tabidos cauentes ad superiores purgationes. 4.apho. 8.

De cordis affectibus præter naturam. CAP. XIII.

IN corde duplex facultas; animosa, & pulsatilis, vtræque sub vitali continetur. Animosæ actio est animi constantia, & firmitas, cuius offensæ sunt animus ablatu, vt in syncope, animus diminutus seu cadens, vt in exolutione. Corruptus velut in ira. Auctus vt in audacia. Nam functiones semper, aut auferuntur, aut diminuuntur à causâ frigida, corrumpuntur verò à calida. Materia frigida & humida plerūque & aufert & diminuit, non tamen perpetuum, vt pater in suffocatione, & conuulsionibus à causâ frigida. At pulsatilis facultatis offensæ sunt ἀσφυξία ἢ κακασφυξία, id est, pulsus abolitiones, deprauationesq; . huc etiam pertinent pulsus exigui ac diminuti, ita vt in pulsuum actione tria reperiātur symptomata. Noscuntur autem cordis affectus ex eius tum difficultatis spirandi formis, tum palpitatione, præterea ex pulsibus & eius & arteriarum, ex animi quoque concitatione, & demissione, ex febris,

s 4 bus,

bus, perfrictionibus, colorum differentiis & doloribus. Spiratio, magna celeris & frequens cordis calidum affectū significat, parua verò, tarda ac rara frigidum, pulsus tum cordis tum arteriarum: magnus celer, & frequens calidum, contrarius frigidū: Mollis humidum, durus siccum. Languidus permanens imbecillitatem. Sin modo languidus, modo validus apparet, plenitudinem instrumentum degrauantem indicat.

De exolutione, lypothymia, & syncope.

Inde syncopati.

CAP. XIII.

Eκλυσις, id est, exolutio, ἀποψυχίη animæ defectio, λειποθυμία siue λειποθυμία, hoc est animi deliquium, pro vna eademq; re, hæc nomina sunt vsitata, vt colligitur. 1. ad Glauconē, & 2. apho. 26. Συγκοπή verò est præceps virium lapsus. 1 2. ther. vniuersarum, scilicet, ruina subita, vt Paulus interpretatur. Cuius differentiæ ducuntur à causis. Vnde dicitur cardiaca, quæ cordis, & stomachica, quæ oris ventriculi proprios affectus sequitur. 5. de loc. aff.

Causa. exolutionis gemina manifesta & interna. 2. apho. 41. Qui sano sunt corpore per medicamenta purgati celeriter exoluuntur, atque etiam qui prauo vtuntur cibo. 2. aph. 36. Exolutio sequitur stomachi & imbecillitatem, & sensum plurimum.

mun. Vnde quibusdam in balneo accidit post longum ieiunium, & nisi prius aliquid panis assument. Nonnullis etiam euenit propter longam in balneo moram, cui vitiosa lingua succendebantur. Sequitur etiam virtutis animalis imbecillitatem, & vteri affectus, vt in locis prius citatis narrat Galen. Item à tuberculi intus ruptione fit exolutio, propter vitalis spiritus excretionem. 7.apho. 8.

Sciendum tamen quod si cerebro patienti cor non cōsentiāt, anima quidem citra syncopem deficere potest, sin cōdolescat, antecedit syncopem animi adfectus vt 1. ad Glauconem scriptum reliquit elegans in scriptis amicus noster Acakias.

Sed aliter Aetius, nec fieri potest, inquit, vt animi deliquium citra cordis consensum ingruat.

Lipopsychia, lypothymia' ve, quia passio est magis intensa, easdem relatas, sed fortiores habet causas, his autem vehementiores sunt syncopis occasiones, quod ex Galeno elicitur. 12. ther. Crudorū copia, inquit, si vires premat, & exiguos animalis meatus quibus perspiratio agitur, obstruat, syncopem affert, si verò nec oneret nec obstruat, non syncopem, sed animi deliquia infert.

Per intemperiem partium similarium non accidit mors subita, sed per dyscrasiam instrumentalium talis contingit. 5. de loc. aff.

In summa, syncopæ duplex causa, videlicet et, spiritu

§ §

ritu

rituum, aut membrorum alteratio, & resolutio. Virium enim essentia quibus corpus regitur in certa spirituum, & solidorum quantitate, & temperamento consistit. Idcirco virium infirmitas, aut lapsus non nisi ex illorum substantiæ resolutione, aut temperamēti alteratione euenire potest, si rectum sui & obliqui index sit & regula.

Alteratur autem spiritus à causâ externa, vt aëris corruptela, punctione, morfuq; ferarum, & veneni assumptione.

Interna veluti timore, & gaudio, præfocatione. Extinctio animæ pathematis naturam sequitur, ob refrigerationem eueniens, suffocatio verò quum vniuersus sanguis ad principiū cōfluit, deferturq;. 2. de ca. sy. vasorumq; repletionem calor nativus præfocatur. 1. apho. com. 3.

Itaque vt dictum iam est, spiritus resoluuntur ob animi affectus, vti gaudio, ira, dolore, aliisve perturbationibus. Quibus enim vitale robur infirmū est, animi verò affectiones fortes, his animæ essentia facilè dissolui potest, præ gaudio nōnulli pusillanimes mortui, id est, mors ex pericharia, syncope ex dolore. 1. ad Glau. & 1 2. ther. plures irati animo defecerūt. 1. ad Glau. tamē ex iratis nemo mortuus est. 2. de ca. sy. Qui diu in carcere, aut loco obscuro detenti subito ad aërem luminosum veniunt, in syncopam incidūt, testibus Rabi, Mose, & Nicolo.

Membr

Membra alterantur dyscrasia inæquali vehemēter calida, aut frigida. Digeruntur atrophiam, extensione morborum chronicorum. Intensione acutorum, omniq; immodica euacuatione, sed in his humorum quoque vitia compræhenduntur, quippe illorum penuria spiritus, & membra dissipantur, copia verò, & qualitate præfocantur, alteranturq;. Inde syncopa ab humorum crudorum copia, ab eorum prætenuitate, ab erodente humore.

Dignosc. præfatæ passiones semper contingunt interseptis sensibus, & non liberis, siue cerebrum solum patiatur, non consentiente corde, vt in exolutione, & animi defectu, siue cor primo affectum sit, hoc enim faciliè in sympathiâ iecur, & cerebrū trahit, simul enim cum corde, omnes vitiatur partes. 5. de loc. aff. Animi deliquium differt à syncopa, quòd illud absque sudore prosternebat hominem, hæc verò cum sudoribus omnino, quos vocant syncopticos Aetius.

Sudores resoluti interdum corporis habitu proueniunt, vocaturq; hoc malum syncope. 3. de ca. sy. Remissio pulsus adhæret syncopi.

Fernelius in lipopsychia ægrotantem putat loqui posse, audire, videre, agnoscereq; præsentem, quum in syncopa omnes internæ functiones interceptæ appareant.

Sed

Sed verò consentaneum nō videtur, quod ait Fernelius, si quidem in suffocatione ab vtero, qui minor est affectus quàm lipopsychia, immobiles quædam iacent, sine sensu, & cum obscuro pulsu, & respiratu.

Præfagia. Morbi qui à corporis membrorum validissimo proficiscuntur, gravissimi sunt, vt sentit Hippocrates, lib. de nat. hum. Syncope his quibus ventris os inflammatur, procliuis est, lib. introd. pulsus intermittens non ita pernicialis senibus, & pueris, vt iuuenibus. 2. de præf. ex pul. Ea quæ fit animi defectio vacuationis ratione, est mensura euacuationis, & in maximis inflammationibus, & in adurentibus febribus, & vehementissimis doloribus. 1. apho. com. 2 3. Sanguis confluere prohibetur, propter animi deliquium. 5. ther.

Quum animus deficit, omnia quæ supersunt tenuia, ad ventrem currunt. com. 2. lib. de art.

Cor quicquid purulentum ac tenax habet, per os, & nasum euaporatoria propellit, authore Nemesio. Qui crebro, & vehementer citra manifestam causam exoluuntur, ij celeriter moriuntur. 2. apho. 41.

Metho. m. symptomatum curatio, causarum à quibus fiunt sublatio existit. 1 2. ther. sed indicationes non simpliciter à morbis, & symptomatibus, sed etiam à causis petuntur. 1. ad Glauconem. Vir-

tus

tus tot modis subleuatur, corroboratur'ue, quot modis labitur ac infirmatur. Causæ etiam quæ robur facultatis augent, & opprimunt, primo de præ- sag. ex pul. numerantur. Robur itaque soluitur alimenti penuria, morborum peruicacia, animi perturbationum vehementia, dolorum magnitudine, vel longitudine, & vacuationibus immoderatis. Grauatür materiæ copia, instrumentariarum partium vitiis, vt pote, inflammationibus, scirris, tumoribus, abscessibus, & corruptelis diuersis. Virtus soluta exiguum languidum crebrumq; pulsus efficit. Opressa inæqualem, & inordinatum. Velox studium esse debet in curatione affectuum cordis.

Quinimo saluberrimum est in omni affectu præter naturam corroborare, quum illud origo sit, totius vitalis potentiæ. Repletiones cordis nō sunt nisi à sanguine, vel à vapore. At sanguinis repletio, basilicæ dextræ sectione curatur, vaporosa verò, basilicæ sinistri, cubiti phlebotomia.

Notandum insuper quod medicinæ cordiales cathartici consociandæ sunt, & in tota curatione istis roborandum cor est, harum quædam calidæ, nonnullæ frigidæ, sed commistas natura discernit. Medicina omnis odorifera cordialis est, vt asserit Auicē. i i. phen tertij. Quoniam verò cathartica omnia vētriculum vitiant, præcipueq; os ipsius, quòd maximè sit neruosum & sensile, odoratorum mixtu

mixtura commodè excogitata est, ne, videlicet sola, ac syncera ipsorum facultas os vetriculi attingat.

Virtus vitalis gaudet cordialibus, animalis sensibilibus blandis, naturalis calidis, & siccis, vt sentit Arnal. secus Capella, spiritus, inquit, animalis odoribus, naturalis dulcibus, vitalis vtrorumque, medius, vtrisque odoribus, scilicet, & dulcibus fouetur. Cor odore recreatum à se quæ nocent repellit, sanè suffimentum grati odoris *ἰσχυρὸν ἰαμα* recte dicitur, id est, animi medela, & solatium, quòd languescens eo recreatur.

Notandum tamen, quod non protinus quod odoratum est, suaue est, quia non omne, id spiritui in cerebri ventriculis contento familiare est, sunt enim odores grati & suaues cerebri spiritui familiares. Ingrati verò, & insuaues, non, familiares, vt docet Gal. 4. S. Inde palam fit, quod odoris proprium est virtutem, aut recreare, aut prosterne, quòd recta feratur ad cerebrum, & spiritum, in quo animæ opus elucescit, sed animam magis recreare videntur frigidi odores, quàm calidi, ob id, quod cerebrum calore ob motus assiduos infestatur.

In syncopes paroxysmo spirituum in partibus externis paucorum resolutio prohibenda est, aqua frigida, aut rosata faciei & aliis partibus nudis im-
 sperfa, nisi syncope sit à causa frigida, vel ab alui
 fluore, quem frigidamateries intro comprimens.

au

augeret.

Si verò spiritus intro conculcati sunt, foras sunt euocandi frictionibus partium extremarum, ligaturis dolorificis, vellendo nasum, auriculas, pilos, ficyis in coxis, & spathulis affixis. Sanè cum multa flāma ficya in sinistrū armū admota, reuocat ad vitā deploratos in omni cordis passione, nam obstructa itinera spiritibus patefacit, & liberam virtutem reddit pluma galinæ acri aceto imbuta intra nares posita statim reuocat syncopatos, panis assus cum aceto pistus, pulsibus adalligatus in panno lineo, hoc symptoma leuat.

Si autem syncope est ob magnam spirituum inanitionem, & penuriam, frictionibus, & dictis nunc remediis abstinendum, quietiq; æger permitendus, hausto vino, vel pane tosto vino imbuto, & odoribus suauibus admotis.

In syncopa ab æstu, aut febris incendio resolutis spiritibus, saluberrimum est aquam frigidam, aut rosaceā per se, vel cum aceto faciē rigare, & spiritus nutrire odoribus bonis, & non solum odoribus, & vino aromatico instaurandi sunt, sed etiam ouis sorbilibus, carnibus bonis quales sunt pullo- rum gallinaceorum capi, gallinæ, phasidis perdi- cum turdi. Aqua capi extillata cū buglossa in bal- neo Mariæ optima. Caro accipitris cum succo maioranæ esitata confert Razis, & ex his iusculo intritis

intritis contufis. concretis, analepticis. Ad hæc lac acetofum butyro extracto potum confert, bractæ auri, & argēti margaritæ, hyacinthus, corallus, acor cytri, & limonis, fuccus mali punici, poma, pyra, cytonia, perfica non folum efitata, fed & olfacta, olfactu etiam fanat cucumer magnus, huic malo medentur etiam myrobolani citreæ, & ferapia frigida nota.

In caufa frigida ratio victus calida, & ficca benefacit de cibis caro columborum, iufcula ex melliffa, menta hyffopo, fceniculo, roremarino, vinum aromaticum vinosum dilutum aqua in qua aurum extinctum fit, gary. nux moschata, crocus, cinamomum, aromaticum moschatum conditum de citro, electarium de gemmis, elect. letificans diambra. Cor olfactu roborat ambarum, carnabū, ocyum, gallia moschata. Aqua bugloffæ cum xyloaloe fumpta. vel confperfa in facie, vel in nares iniecta valet in omni fyncopa ex frigore.

Hæc etiam ad fyncopam à crudis humoribus ortam benefaciunt, optimaq; eft aqua vitæ pota, & panis affus optimo vino imbutus infperfus puluere ex cinamomo, & faccharo compofitus.

Ad fyncopam ex ventriculi repletionē falubris eft vomitus, & in ventris diftentione, clyfmus.

Ad fyncopam ex inanitione inftauratrix, & alatrix victus ratio debetur, vt pote ex cibis boni
fucci

succi concoctu facilibus vti sunt iuscula carnis salubris, aqua carnis, & succus eius, quæ parum nutriunt. Appositio enim celeris non est diuturna, ob id frequenter, & in quantitate exigua propinanda sunt. Quicumq; citissima adiectione indigent humidum remediũ ad recuperandas vires optimum est, vbi adhuc citius per odoratum, vt docet Hippoc. lib. de alim.

De cordis palpitatione.

CAP. XV.

QVando cor non potest liberè distendi, & constringi, tremere, palpitareq; sentitur, si quidẽ ad vtrunque motum festinat, & neutrum bene peragit. Sic tremulus anhelitus fit, vbi suffocationis causa adest. Nam festinans ad vtrunq; respirationis, & expirationis motum, neutrum perficere potest. In partibus etiam nervosis deprauatus motus accidit, virtutis animalis, & morbi per cõtrariorum motuum successum partem nunc dimittentium, & nunc attollentium.

Est igitur *παλμὸς*, id est, cordis tremor, creber, & velox motus palpitationi similis, qui etiam vocatur *καρδιαγμός*. 4. aph. com. 6 §. Sed motus cordis qui in pulsibus fit, secundum naturam operatio est. Contra quæ in palpitationibus fit motio, non est secundum naturam, sed affectio. 6. de plac. Motus enim cordis naturalis triplici fibrarum genere,

To. II. Lib. I.

t

ex

ex quibus caro eius cōflata est, à natura perficitur.
7. de v. part. & de anato. admin.

Differentiæ palpitationis quædam cōtinua est, alia interpollata periodica, & nō periodica, typica, & non habens accessiones ordinatas, palpitationis cordis à tremore differt, secundum Tornamiram, & saltus cordis ab utroque, ut retur Montag.

Causa externa. aër pestilens, morsus ferarum, haustus veneni, efus fungorum, spes & timor. Cor homini animalium vni palpitat: quia homo solus spe rei futuræ mouetur, ut ait Arist. 3. de par. anim.

Interna verò vel est proprius cordis affectus, nempe dyscrasia inæqualis simplex, aut composita sine, vel cum materia, ex qua cor infirmum imbecillum ve redditur. Nam palpitationis repletio cordis est à sanguine, vel à vapore, ut sentit Auic.

Præterea palpitationis incidit per consensum totius, ut in febre pestilenti, per consensum pulmonis, ventriculi, splenis, intestinorum vterique. hinc est quod cachecticæ virgines omnes ferè cordis palpitatione vexantur, nā vbi ventris torpedio, inibi vaporum turbatio. 6. epi. palpitationis à flatu in pericardio contento, apud Torn. qui cor ne attollatur impedire potest, haud dispariliter fieri potest à tumore pericardij aqueo, ut in simia, vel carneo, ut in gallo, aut à sanguine, ut in iuvene quæ sanauit Gal. sanguinis detractione, ut plurimum palpitationis fit à calo

calore, & raro à dyscrafia humida, vt scribit Razes in diuif. Nos vidimus cordis magnum tremorem cum exolutione ex magna copia pituitæ vitreæ in ventriculo coaceruata, in nobili à Turnone Comitiffa, vterū gerēte, quæ operula nostra cum Dei auxilio fanata est.

Dignostica, ab essentiæ ratione suprascripta sunt petēda, palpitatio sentitur cum pulſu inæquali, at inæqualis non euenit ex vſu immutato, ſed ob offenſam facultatis vel inſtrumentorum. Cor ſi laboret inæquali dyscrafia, pulſus vniuerſos variè inæquales efficit. Macies præcedit, vel cōſociatur, vt in ſimia & gallo. 5. de loc. aff. Si cauſa calida ſit, tremor eſt cū febris, ſin frigida, febre vacat. 9. Manſoris. Cordis dyscraſiæ protinus cæteris partibus communicantur, earumq; comes eſt, imbecillitas.

Præſagia. cordis tremor pluribus ſanis ſine alio accidente euenire viſus eſt, & omnes ante ſenectutem morte præuenti ſunt. 5. de loc. aff. In febribus cardiogmos *καρδιόμος*. per cardiogmon nonnulli palpitationem intellexerunt. 4. apho. com. 6 5. panniculus cor ambiens quomodocunque affectus, nulum affert periculum, niſi ipſo inflammatione affecto, cor conſortij lege afficiatur. 5. de loc. aff.

Metho. m. Curatio fieri debet per ſingularum cauſarum ſublationem. Aëris ratio præcipua eſt habenda, vt qui inſpiratus ad cor, mox penetret,

citoq; iuuert, vel noceat. Magna ex parte fit à calida occasione, ob id Mansor ab axillari vena sanguinē detrahare iubet, & tro. de camphora succo malorum acidorum leuigatos in potu præbet, & lac ex quo butyrum pressum est, ne forte continuus trochiscorum vsus noceat, superbibere consulit. Mediana vena cardiaca dicitur, quoniam per eius incisionem plus spiritus, & caloris innati educitur, quàm per basilicæ sectionem, si credimus Valesco.

Micationi cordis ab occasione calida confert syr. acetatus simplex, syr. de acore citri, sy. de limonibus de oxalide, sy. de pomis, sy. de punicis acetosis, de omphacio, cum duplo aquarū intybi. nymphaeæ, violarum, borraginis, buglossæ, zuccharum salubre est rosatum, buglossatum, borraginatum, violatum. Succinum potum cōfert in omni cordis tremore in calido cū aqua acetosæ, in frigido cum aqua melissæ. ℞. margaritarum 3. j. s. hyacinthorū 3. s. cinamomi, gary. macis añ. ℥. j. folia auri, & argenti añ. numero decem, zucchari soluti in aqua ros. & buglossi q. s. fiat electarium. Aliud. ℞. smaragdi, carabæ añ. ℥. s. hyacinthorum, se. ocymi añ. ℥. j. formentur pilulæ v. dentur in vehementi accensione. ℞. ossis cordis ceruini pisti 3. s. foliorum auri ℥. j. sumat ex aqua buglossæ, vel ex vino albo oligophoro.

In causa frigida opitulantur electarium de gemmis

mis lætificans Almenforis de citro, & aliud Regum, diamargariton, & electarium Cōcil. ad omnē cordis passionem calidam & frigidam optimum, quod recipit succi pomorum dulcium, & buglossæ añ. ʒ. v. doronici corticum citri, florum bor. rosarū, been albi, & rub. coralli, rasuræ eboris añ. ʒ. s. spodij, macis, galliæ mosch. carabæ, ofsis cordis cerui, fantali rubri añ. 3. ij. sem. ocymi folij sem. myrti, & melissæ coriandrorum, cinamomi cubebæ, cardamomi, galangæ, zedoariæ, nardi xyloal. setæ minutim incisæ, croci añ. 3. ij. omnium myrobol. ʒ. iiij. marg. ambarū añ. 3. ij. hyacinthorum berillorum, smarag. sardiorum saphi. granatorum añ. 3. j. ambari, & canforæ añ. ʒ. ij. moschi ʒ. s. zucchini q. s. fiat confectio.

Aliud nostrum minus operosum in causa calida. R. margaritarum ambarum añ. 3. ij. coralli 3. j. hyacinthorū 3. j. s. succini albi 3. ij. spodij 3. j. s. rasuræ eboris 3. ij. ofsis cordis ceruini numero iij. fantali albi, & rub. been albi, & rub. añ. 3. j. rasuræ cornus Monocerotis ʒ. s. ambari ʒ. j. camphoræ 3. j. folia auri xij. folia argenti iiij. zucchini rosati solidi q. s. ad bonum gustum fiat pul. dosis 3. j. ex vino albo diluto aqua in qua aurum candens obrizum extinctū sit. Aliud. Conseruæ viol. bor. buglossæ nenuffaris rosarū añ. ʒ. s. marg. 3. ij. hyacinthorū, smaragdi, saphiri, le. acetosæ & citri coralli añ. 3. j. fantali albi, & rub.

t 3

rub.

rub. spodij been añ. 3. s. ofsis cordis ceruini 3. j. doronici 3. s. coriand. præpa. 3. s. cum zuccharo f. conditum auro coopertum.

Aliud nostrum in occasione frigida. R. pul. aromati rosati moschati, garyophyllati, & Gabrielis, añ. 3. j. pul. diambrae 3. s. spodij 3. j. s. fantali albi, & rubei añ. 3. s. carabæ 3. iij. xyloaloes 3. ij. fiat puluis, & cum conserua rosarum borraginis, & radicum buglossæ fiat conditum deauratum, de quo sumat instar castaneæ, poterit superbibere 3. j. syrupi de succo borraginis. R. fragmentorū smaragdi carabæ añ. 3. s. sem. ocymi hyacinthorum añ. 3. j. rasuræ cornus Monocerotis 3. s. fiat pul. de quo sumat per se. vel cum sy. de buglossa. Aliud. succini 3. j. smaragdi grana iij. folia auri octo propinetur cum aqua buglossæ, & vino.

Gemmarum vltus in assumendis non placent Alb. B. crocus displicet Rasio, quia vermes generat. Sicya inter spathulas affixa laudatur à Rasio, sed nō probatur Auicennæ, quia stomachum debilitat, sicq; cordis tremorem generat.

Curatio palpitationis in ipsa accessione. Materia à corde ad partes ignobiles auertēda est, frictio- nibus partium extremarum ligaturis dolorificis cucurbitulis, clysmis, & phlebotomia, secare venā malleoli consulit Gatti. vtilissimaq; est venæ inter- næ sectio in gibero dextro in cordis repletionē san- guinea,

dextro.

guinea, vel in sinistro in repletionem vaporosa. Victo-
rius consulit affigere sicyā in cordis regione eamq;
ibi finire per horulam. Cor etiam roborandum est
per assumpta, & admota.

℞. aquæ rosarum ℥.iiij. aquæ mēthæ ℥.ij. pul. fo-
liorum rosarum rub. spodij santalorum omnium
añ. ℥.ij. moschi ambari añ. grana. ij. aceti optimi ℥.j.
vini maluatici ℥.s. misceantur omnia puluera cum
liquoribus in ampulla vitrea stricti orificij perga-
meno pertuso operculata, olfaciat, & inspergatur
vultus, his enim odoramentis seruatur vires. ℞. ro-
sarum rub. ℥.ij. florum borrag. ℥.j. s. sem. melissæ
℥.ij. maioranæ, mēthæ añ. 3. j. spice ℥.j. spodij 3. j. s.
carabæ 3. ij. serici vsti 3. s. fantali albi, & rub. folio-
rum citri añ. 3. ij. pul. diamarg. frigid. 3. ij. marg. 3. s.
xyloaloes maceris cinamomi nucis mos. añ. 3. s. pa-
nis vsti in vino macerati ℥.v. cū aqua ros. moscha-
ta, & succo borrh. fiat massa, ex qua fiant emplastra
cordi admouenda, & sæpius permutanda. huc etiā
pertinent malagmata, cerotaria, vnguenta, & epi-
themata cordialia.

℞. pul. diamargariti frigid. 3. j. s. carabæ 3. j. been
albi, & rub. añ. 3. s. pul. laticantis Razis 3. j. s. ce-
ræ albæ puræ q. s. fiat ceratum pro corde.

℞. olei nymphææ ℥.iiij. pul. florum nymphææ lu- *Gamerij*
teorum 3. ij. fantali rubei se. acetosæ corall. añ. ℥.j. *vng. opt.*
marg. ofsis cordis ceruini añ. ℥.s. camphoræ gra- *ca. ca. lio.*

na iij. cum cera alba, & rosaceo odorifico f. vngu. pro corde, in affectu calido.

℞. pul. lætificantis Rasis, elec. de gemmis, diamargar. frigidi añ. 3. s. pul. diamoschi dul. ʒ. j. fragmentorum omnium hoc est hyacinthi granati, rubini, sapphyri smaragdi, añ. ʒ. j. vini maluatici ʒ. iiii. aquæ rosarum, acetosæ, nenupharis, buglossæ añ. ʒ. iij. misce fiat epithema.

℞. panis bis cocti, asii, macerati in acri aceto, & pisti lib. j. fiat malagma, quod pulsibus brachiorum applicetur.

Aliud. panis infusi in vino optimo ʒ. ij. maiora-næ 3. ij. macis 3. j. s. moschi ʒ. j. fantali albi & rubei añ. 3. ij. coralli albi, & rub. rosarum añ. 3. j. cum aqua ros. & succo buglo. fiat empl. pro corde.

℞. ambari xyloal. añ. ʒ. s. ossis de corde cerui ʒ. ij. carabæ ʒ. j. f. puluis, & bibatur ex aqua ros.

Aliud. ℞. fragmentorum gemmarum añ. 3. s. corall. amborū añ. 3. j. ossis cord. cerui, spodij, carabæ añ. 3. ij. xyloal. croci añ. ʒ. s. ambari grana. ij. crystalli 3. s. cinamomi 3. ij. zucchari rosati solidi ʒ. j. vtatur in eduliis, & cibariis.

Aliud. fragmentorum rubini granati, hyacinthi, smaragdi, sapphiri, margaritarum, añ. ʒ. j. corallorū ʒ. s. ossis de corde cerui vnicornu añ. ʒ. s. moschi grana. ij. ambari grana. iij. foliorum auri, & argenti añ. gra. vj. fiat puluis.

Ad

Ad tremorem in quo non est excellens caliditas, aut frigiditas. ℞. carabæ margaritarum, corallij añ. 3. iij. ocymigaryophyllati xyloa. añ. 3. s. coriād. præpa. 3. ij. s. fiat puluis, sumat 3. j. cum syru. cytoniorum.

Aliud. ℞. margaritarum, spodij, granatorum añ. 3. j. santalorum omnium rasuræ eboris vnicornu añ. 3. j. hyacinthorū sapphiri coralli albi, & rub. carabæ añ. 3. s. ofsis cordis cerui 3. s. moschi grana ij. ambari gra. iij. folia auri v. sacchari albisimi dissoluti in aqua rosarū & buglossæ q. sufficit. fiat electarium in rombis, sumat 3. ij. s. pro dosi. Ad palpitationem syncopam, & omnem cordis affectionē. ℞. limaturæ auri 3. j. been albi, & rubei añ. 3. s. margaritarum perforatarum, & integrarum añ. 3. j. ofsis cordis cerui 3. s. fiat puluis, vtatur in cibo, & potu. Confert etiam puluis blatae byzantiæ potus ex syrupo borraginis. Os cordis cerui ex vino cum aqua ros. vel buglossæ potus purgat atram bilem à pericardio, corq; roborat, teste Rosario. ℞. pul. cordis simiæ asii, & siccati 3. j. sumptus cum melicrato roborat cor, auget audaciam, & tremorem sanat, atque epilepsiæ cōfert, vt refert Razes, & Varig. laudant etiam indusium rebus odoris suffitum, & gestatum.

Os cord. cerui

Cor Simiæ?

De his quæ letitiam dant, & gaudium

℞

cum

cumulant.

CAP. XVI.

DE assumendis, botrago, buglossa, nepenthes homerica, crocus, citrum, aurum, hyacinthus, margaritæ, melissa, vinum odoriferum, lactis potio, aurum, ambarum, confectio Alkermes, sena, myrobolani, conditum de pomis, diamargariton, dianthos, electarium de gemmis, lætificans Rasis, diasenæ.

Periapta. & amuleta, Adamas lapis iram domat, Andromeda lapis sedat animos calētes. Idem præstat Aleætorius, ex lapidario, & Alberto. Alkyon auis in domo sita, seditiones, & lites auertit, Kiranus. Berillus mitem facit in moribus. Chelidonium niger regum mitigat iras. Corneolus in anulo gestatus reprimit iracundiam corā iudice in causa litis, lapis genosia mitigat iras, lapis selenitas amorem conciliat, omnia hæc sumpta sunt ex lapidario & Alberto. Enulam iram aufert, xyloaloes secundum Auic. Idem pollet, sed onyx collo vel digito suspensus tristitiam animi; imbecillitatem inducit. Serapio, & Albertus. Carbūculus, balagius, rubinus, granatus cor reficiunt, vt ait Rueus, Sannè in confesso est apud hiatraleptas, medicos philosophosq; omnes, gēmas lapillosq; pretiosos vim quandam ad quædam medicamēta, & ad morbos retinere. Nec est quod rideat Volaterranus, in achate castitatem, in Sarda lætitiam, in topacio securita

curitatem si in sinistro brachio fuerit, quoniã gem-
mæ earumq; occultæ facultates, à cælo sunt, & sola
experientia innotescunt. Quid quod idem fidem
impendit periaptis amuletisq; , vtpote crystallo,
succino, corallio, smaragdo, adamanti, chrysolitho,
Topatio, & iaspidi.

De mammillarum affectibus. CAP. XVII.

LActis defectus infantibus magis quàm
mulieribus grauis est, vt ait Aetius. Acci-
dit autẽ propter siccam mammillarum,
aut totius corporis intemperiem, vel ob
sanguinis boni paucitatem, vel ob id quòd infans
imbecillus non probe ex mammis fugit, quanto
enim plus fugendo ex illis adimit, tanto magis san-
guis attrahitur, vt refert Aegineta. Itaque oppletis
venis communibus, quæ à mammis pertingunt ad
vteros, lac plurimum gignitur, teste Gale. 5. apho.
com. 5 2.

Metho. m. est causas auferre, & ratione vi-
ctus boni succi, & moderata vti. Lactis enim, &
feminis effectrices facultates sunt partim in me-
dicamentis tantum, partim in alimentis. In medi-
camentis quidem, quum succos pituitosos excal-
facientes in sanguinem vertimus. In alimentis ve-
rò vbi videlicet, boni succi sunt, & humida ac tepi-
do calida, ceu & ipsum lac.

Reme

Remedia. sanguinis ad mamas attractio fit earum frictione, exuctione, fotu calido, & humido, phœnigmo, ficya inani, seu leui ad radices mammillarum admota. R. pulueris sem. anisi 3. ij. s. ex iusculo caulium bibat quando it dormitum. Vel R. sem. anisi, fiseleos añ. 3. s. crystalli 3. j. cum zucchero, & vino albo fiat potio, pro duabus dosibus. Confert aqua ordeï cum sem. fœniculi pota. Item pulueris sem. viticis decorticati pisti 3. j. cum decocto anethi exhibetur: benefacit & serpyllū potum. R. sem. psylli integri 3. j. s. sumat in potu ex vino omni die, multum lac generat. Idem præstat cinis vnguis capræ potus, vt prodidit Raz. Angel. Cato medicus, & Archiepiscopus Viennensis laudat cinerem linguæ vaccæ, ex iusculo, vel vino potum. Ad idem facit decoctum hyperici bibitum, & oua perdicis sorbilia pota: Item illita māmīs cum adipe anseris remediānt. Quandidros lapis vbera lacte replet. Et sapphirus illitus idem pollet. Et galactites pro amuleto adalligatus. Alb. lapi. Aetius.

De lactis abundantia.

CAP. XVIII.

Σ Γαλακτωσις est lactis abundantia, quæ à boni sanguinis copia efficitur. Indeque mammæ fiunt turgentes, sui que lactis impatientes.

Curanda est igitur veluti plethora, hoc autem est

est sanguinis missione, inedia, & digerentibus medicamentis. Sanguinis missio in diuersionem fieri debet ex saphea. In hoc etiam pubi admouetur ficcy, & infernæ fricantur partes. Ab his repellentibus vtendum, quæ papillis illinuntur, vel applicantur mammarum basi, ex succo plantaginis, solani cum rosaceo, folia lapathi maioris superposita iuant, efficax est cicuta pista admota, postremo adponuntur digerentia, siue siccantia medicamenta ex millio sale & farina fabarū, & chamæmeli. Item lac auertes emplastro facto ex farina fabarum, & fœnugræci cum oliuo. Valet insuper apiū appositum, basilicum maius, & ocymum, fecem vini non vstam cum aceto perunctam commendat Dio. Lac trahunt ampullæ in aqua calfactæ papillis appensæ.

Ad thrombosim.

CAP. XIX.

Ρόμβωσις siue lactis grumescentia, quæ magna ex parte sequitur sparganosim.

Q Causa, à caliditate fit tenuem lactis partem digerente, & quod reliquum est, exsiccante. Idem à frigiditate congelante accidere potest, vt disputat Auic. 12. tertij.

In principio leuiter reprimentibus vtendum est, velut est sponsia poscha pura imbuta, furfures cum aceto cocti salubriter imponuntur mammis

appo

apposita mentha non finit lac densari. Apium viride impositum prohibet ne lac in grumos coeat, grumosq; factos dissoluit. Cæræ albæ grana decem millij magnitudine quotidie hausta, lac in lactantibus non patitur coagulari. Dio. Grumescentiã item dissoluit ammoniacum cum assa foetida cæra, & oleo ad formam emplastri redactum.

Ad excrecentes mammas. CAP. XX.

Olia epimedij cum oleo trita, & imposita mammas virginum cohibent, idem efficit cicuta cum coma trita & imposita. E cote naxia quod exacuendo ferro deteritur, illitum crassitiem arcet. Dio. huc pertinet vnguentum vespertilionis Pandec. Epithema cum succo acacitiæ. Serap. Epithema ex succo foliorum, & semine lapathi. Aliud ex pulvere libani cum aceto, plat. Obline cruore porcelli, lib. de fac. para. ℞. aluminis, cerusæ, plumbi vsti, lentis tostæ añ. ℥. j. cum succo plantag. fiat epithema. ℞. lomēti fabarum, lib. 8. olei rosati ℥. ij. succi cichoreæ & plantaginis añ. ℥. j. pulueris putaminis ouorū perdicis ℥. j. fiat emplastrum, lac arcet, māmās erigit. & prohibet eas increfcere.

Ad pendulas, & rugosas ex putamine ouorum perdicis, & cæra fiat cæratum vel illitio, eas erigit. Aliud. ℞. radicū liliorum alborum cum cæra, & oleo

oleo fiat cæratum. Epimedium vberibus illitum ea recta seruire potest.

Mammarum duritias emolliunt, & discutiunt empla. diachylum, & corigiola tusa cum butyro recenti mista, imposita. Ad rhagades siue rimas, illine papillas ex amylo soluto in aqua rosarum. Aliud. ℞. corticis interioris sambuci albi 3. ij. adipis gallinæ ceræ albæ añ. 3. s. fiat linimentum. Duritias antiquas vberum, & testiculorum crysinum iuuat.

Ad abscessus mammarum, intestina terræ cum polenta terito, & imposito. Vel ex foliis lapathi cum adipe porcino simul coctis fiat cataplasma.

Ad mammillarum vlcera. ℞. lutea ouorum vij. mellis despumati, lib. s. vini nigri, lib. j. s. bulliant lento igne agitando spatula, vsque ad spissitudinē, vsus erit in linamentis, & spleniis. Detergens sine morfu, & repellens in vlceribus. ℞. mellis rosati colati, terebinthinæ lotæ cum vino albo añ. 3. s. rosacei 3. ij. bulliant vnica ebullitione, vltimo ponendo mel. Aliud. ℞. conus cupressi cassiæ lignæ, gal-larū añ. 3. ij. aloes thuris añ. 3. j. lithargyri 3. iij. fiat puluis qui maceratur in vino claro per tres dies, deinde bulliant ad mellis crassitiem.

Ad fistulā mammillarum Gord. laudat vnguentum de assā foetida, & lotionē eius ex vino in quo myrrha bullierit, mox imponatur linamentum illitum vnguento quod recipit sarcocollæ, aloes añ. 3. iij.

iiij. cum melle fiat. Aliud Salyceti. ℞. hyssopi iridis radicis dulcis, añ. ʒ. i. croci ʒ. j. fiat puluis de quo summat omni mane ʒ. j. cum vino calido detergit fistulam potus.

In corruptione vberū. ℞. boliarmeni ʒ. ij. camphoræ grana. iiii. cum aquato oui misce, & in gossipio imposita māmæ applicantur, arcet enim vberis necrosim.

Sciendum autem est, quod mammilla ex vlcere affecta raro ad sanitatem reducitur, nisi altera sana à lacte exsicceetur. Exsiccabitur autem lac, si Aegra pusioni lac sugendum nō dederit. Mammillæ substantia quia mollis, & spongiosa, si exulceretur pus contentum non libere effluit, ob id variis in locis incidunt vlcera. Mamme tenues penuriam sanguinis indicant, vt duræ illius multitudinem. Solidæ in prægnantibus sunt omnium commendatissimæ, vtpote, existentes mediæ inter flaccidas, & renitentes, his plus humoris ad conficiendum lac influit. 8. & 9. mense conceptionis, quando oppletæ sunt venæ communes mammillarum, & vteri.

De morbo pilari.

CAP. XXI.



Orbus pilaris est dolor in mammis, si poculo pilum forte hauserit mulier, nec sedatur dolor, donec pilus vel pressus exeat sponte, vel cum lacte exugatur, vt adnotauit

notauit Aristot. 7. de nat. animalium, huic subscribit Alfarahauius. 1 4. practicæ. Ad hunc morbum illinitur cæcer fluuiatilis, aut marinus pistus. Aut carnes muricum, seu conchyliorū illitæ. Plin. lib. 3 2.

De cancro in mammilla.

CAP. XXII.

Cancer est tumor durus, inæqualis, rotundus venosus, id est, venas habens in circuitu turgidas, & exaltatas, liuescens siue fuscus, & colore magis quàm inflammationes nigricans, calidus, sed nō adeo, vt inflammationes, subito accrescens, ægros maximè fatigans, & perpetuo ferè dolore affligens, licet Paulo sit indolens, Græcè *καρκίνος* & *καρκίνωμα* dicitur.

Causa. gignitur ex atra bile. 1 4. ther. & lib. de tumor. præter nat. & lib. de atra bile. Si verò humor fuerit mitior, occultum cancrum sine vlcere efficit. Contra si acrior, maligniorq; materia fuerit, cutim erodit, & carcinoma facit cum vlcere. In cancro futuram exulcerationem portendunt vehemens caliditas, & pulsatio.

Præfag. Cancros latentes eos non curare præstat. 6. apho. 3 8. iuxta illud Poëtæ.

Curando fieri quædam maiora videmus

Vulnera, quæ melius non tetigisse fuit.

An morbus insanabilis carcinoma? Gal. fatetur cancrum tumorem in mammilla cuiusdam mu-

To. II. Lib. I.

v

lieris

lieris ortum sanasse, valenter & crebrò illi atram-
bilem expurgans in vere, & autumnò. 7. aph. com.
47. nanque.

*Temporibus medicina valet, data tempore profunt
Et data non apto tempore, vna nocent.*

Nec dissimili curatione, nos quoque nobilissi-
mam quandam Comitissam à carcinomate mam-
mam occupate liberauimus. Id nondum inuetera-
tum erat.

Metho. m. primùm, oportet humoris melan-
cholici generationē prohibere, proba victus ratio-
ne humectante ac refrigerante. Mox succum atra-
bilarem per totum corpus dispersum purgare, hu-
moremque qui locū affectū occupat regerere omni-
no, vel digerere. Ab his particulæ laboranti robur
adferre, ne quid humorum redundantia ad eam
confluat.

Remedia. In redundantia melancholica detra-
ctio sanguinis conuenit non modo secta in cubito
vena, sed etiā ex saphea, vel è vena poplitis, & per
hæmorrhoidum euacuationem. Deinde medica-
mento nigros humores per inferiores partes, &
pessum purgantibus vtendum: quia humor melan-
cholicus grauis est. ℞. syrupi de epithymo ℥. j. sy. de
pomis simpl. ℥. s. aquæ acetosæ ℥. j. aquæ buglossi
℥. ij. misce pro vna dosi repetatur pro tribus, sumat
mane. vel ℞. syr. de fumaria maioris ℥. j. syr. violati
℥. s.

℥.ss. aquæ acetosæ lupuli, & borrag. añ. ℥.j. misce.

De melanogogis clementioribus sunt diacatholicum, diamanna. vel ℞. mannæ, medullæ cassiæ nigræ añ. 3. vj. confect. Amec 3. ij. syr. viol. ℥.j. cum decocto florum & fruct. cord. fiat potio. Aliud. sumariæ, thymi, senæ ori. añ. 3. j. polypodij ℥.j. vuarū passarum ℥.j. bulliāt in lib. j. iusculi galli decrepiti, vel gallinarum, sumat pro dosi ℥.v. vel sex istius iuris colati. Aliud. ℞. senæ ori, folliculorum eius añ. ℥.ss. zinziberis ℥.3. ss. florum borrag. buglo. violarum, & rosarum añ. 3. j. polypodij electi ℥.j. passarum sine gigartis 3. vj. sebesten rec. numero x. pruna dama. sex, in aqua sufficienti. fiat decoctio colata, sumat huius ℥.v. cui licebit addere ℥.j. syru. rosati cum rhabarbaro, vel tantundem mellis rosati colati, fortiora sunt sequentia. Tamen Aetius cremor, inquit, in quo veratrum maceratum est, datur senibus, & pueris, pariter, & eius decoctum exhibetur. Aliud. ℞. ellebori nigri 3. j. rhabarbari 3. iiij. zinziberis, cinamomi, piperis, gary. nucis muschatæ añ. 3. ss. masti, croci, epithymi añ. 3. ss. rad. dulcis rasæ ℥. iiij. pista macerentur in vino mustaceo, & bulliant ad consumptionem medietatis, colatura seruetur in ampulla obturata, dosi ℥. iiij. vel. iiij. sumat semel vel bis in hebdomada. Aliud. ℞. corticū myrobal. nigrarum ℥. ij. citrearum ℥. j. chebularum ℥. ss. polypodij ℥. j. senæ ori. 3. iiij. agrimonix eupatorij

torij florum viol. bor. & buglossæ añ. p. j. bulliant simul omnia in feri lactis lib. iij. ad consump. med. in fine adde epithymi ℥. j. in qua ellebori nigri 3. j. cōfricetur, mox coletur, & fiat apozema, dosis ℥. iij. vel iij. Salubria etiā sunt serapia de elleboro. Neocomensis, Catanei, & Amati, & catapotia inda, & de lapide lazuli. M. & pul. diatriasantali 3. ij. diarrhodij 3. j. fragmentorum smaragdi, & hyacinthi añ. 3. j. margaritarum 3. j. S. zucchini soluti in aqua buglossæ q. s. fiat electariū in tabulis deauratum, sumat 3. ij. S. pro dosi, per tres horas ante prādiū, utile etiā est zucharū rosatū, violatū, buglossatū, borraginatū, cōditū de cydoncis, poma, & pyra cōdita.

De admouendis in non vlcerato subteriora vtilia sunt, succus cancrorum fluuialiū pistorum illitus per se, vel cū rosaceo, plumbi massa illinatur oleo, & cum altera plumbea massa, confricetur, liquor inde emanans mammæ illitus plurimū opitulatur, Brassic. folia folia brassicæ cruda trita bis in die apponūtur, post vlceris ablutionem ex vino, folia lilij tusa, imposita. Pentaphyll. Pētaphyllū cum adipe suis pistum impositū. Chære. foliū. folium cum melle tritū superpositū curat ipsum, vt asserit Macer. & Arnaldus, puluis stibij seu antimoniij cancro corrodenti inspersus, optimus est, teste Plateario. Caricæ cū adipe recenti pistæ appositæ salubres sunt in non vlcerato. Vnguentum arabicum M. cancos curat. cap. 100.

FINIS TOMI SECVNDI.

ANASCEVES
MORBORVM
TOMI TERTII,
LIBER I.



De cholera morbo.

CAP. I.



χολέρα numero singulari significat bilem, & plurali adfectum, ut ait Volaterranus, χολέρα χολερῶν est ventris vitium malum, & præceps mirifice, ut scribit Valerianus. Cholera dicitur: quia materia per ventrem defertur ex intestinis, quæ cholades dicuntur, teste Tralliano. Cholericæ passio est solutio stomachi, & ventris intestinorumq; cum celerrimo periculo. A fluore fellis nomen habet, ut retur Aurelianus. Cui subscribere videtur Orbasius, cholera, inquit, affectus ab humore nomen accipit, quoniam supra, infraq; bilis erumpit. Estq; duplex, humida, & sicca. In priori vehemens

To. III. Lib. I.

v 3

est

est excretio bilis supra, infraq; erumpit, intestina torquentur, accedunt conuulsiones, sæpe etiam crurum furæ contrahuntur. Posterior ab eadem prouenit causa, at citra ventris fluorem, & vomitum, vt explicuit Herodotus. Arida cholera ventrem inflat, strepitum, & dolorem tum laterū, tum lumborum excitat. Alius nihil deiicit, sed astringitur, vt refertur apud Hippo. 4. r. a.

Causa. expultrix facultas irritata à re mordaci, aut aggrauante, etenim quum duo sint ventriculo hostiola, ad quodlibet horum deriuetur id quod infestat, illo ad expulsionem vtitur. Quòd si vtriusq; huiusmodi affectus superuenerit, vtrunq; simul hostium ad hunc vsum accommodabit, vt in cholera videre est. Porcelli carnes choleram pariūt, & turbationē, quia humidæ, & acres, eoq; choleraceæ. 4. r. a. Choleraceorum eduliorum communis est malitia, quum & humida, & acria fuerint, ibidem. Peponum esus choleram generat. 2. de alim. Lascerpitij caulis siccam generat choleram. Vt cholera humida ex acribus oritur humoribus, qui ex esorum ingestione prodierunt, sic arida ex spiritu flatuoso acri.

Dignostica. ab essentiæ ratione petenda. Ciborum cruditas apparet, quæ nonnunquam ex magna alimentorum prauitate, interim ex vitiosorum humorum superfluo trahit originē, vt vult Paulus.

Præ

Præſagia. paſſio eſt acuta, ſæpe anima deficit, teſte Celſo, quia ſtomachi paſſio, vt inquit Caſſius, qui natura neruoſus eſt. Cholera omnibus acutis ægritudinibus velocior eſt, vt ſentit Theodorus Priſcianus. Eſt grauis, & periculosa paſſio, quæ nunquam cum febris fit, Aureliano teſte. Nulli morbo, vt inquit Celſus, minori momento ſuccurritur, & pars ſanitatis eſt, vomitū eſſe ſuppreſſum. Quibusdam diarrhœæ, & cholere certis interuallis omnem corporis redundantiam educunt. 7. ther. & 3. nat. vir.

*ſi febris
comitetur
agri-
pſimo -
ſunt loco.*

Metho. m. Dilatio in omnibus acutis morbis nociua eſt, in hoc autem affectu, etiam exigua curandi mora haud ſimplicem offenſam, ſed etiam abſolutam ſubinde tabem conciliat, ſi Tralliano credimus. Quæ ſupra, infraq; erumpunt inutilia quum ſint, euacuatione opus habent, quare conuenit ſi non ſponte ferantur, oportune ea purgare per vomitum vel per ſedē, per vomitus enim vomitus ſoluitur, & ceſſat, vt poſt Hippo. & Galenum tradunt Aetius, & Auic.

Remedia. principio quæ efferuntur cohibenda non ſunt. Imo ſi natura vomitu ſe expurgare contendat, iuuanda eſt, potu aquæ egelidæ, vt cōſulit Paul. vel copioſiſſime tepentis aquæ crebrò propinata, vt præſcribit Almanſor, muſſam propinare iubet Trall. & veratrum profuiſſe datum pro-

dit Hippo. §. epi. quod non probat, & merito Aurelianus, sed potum, inquit, dari debet tepidè, vt quod immutatum corruptione est, tanquam veneni materia per vomitum depurgetur. Sunt qui ad saporis gratiam tepidè adiungant pauxillum serapij acetati simplicis, vel oxymellitidos. Eadem ratione si materia serosa, aut biliosa, aut corrupta, & maligna fuerit, ad intestina repat, purgari debet clysmis mollibus, aut cathartico idoneo, & clementiori, qualia sunt rhabarbarum, myrobalani, micleta.

At vbi materia maiori ex parte fuerit euacuata, quod in viginti quatuor horis plerunque euenit, aut fuerit benigna, auertenda tunc est, præsertim si morbus remitti cœperit, balneo dulcis aque calentis ad superficiem trahente, vt consulit Mansor, aut ligaturis dolorificis, & frictionibus. Ab his cohibitionem fluxionis incipere, & ventriculum roborare licebit, tum assumptis, tum admotis. Assumuntur, autem in hoc syrupus rosatus, de acore citri, de limonibus myrtinus, è malo punico, è cotoneo, aqua cocta diluti, saccharum rosatum cum margaritis. Item micella ex conferva rosarum, oxalidis, cytonoato cum syrupo myrobal. emblicarum, puluis quoque vtilissimus est, qui efficitur ex corallis, margaritis, bolo armeno, ori. crystallo, semine citri cum radice heptaphylli, salubrior erit si addas rasuram

ram cornus asini indici. Aliud. ℞. fragmenti smaragdini, margaritarum, coralli añ. 3. j. zucarum rosati solidi ℥. j. S. fiat puluis. Aliud lapidis berilli puluerati ℥. ij. detur ex aqua in omni fluxu conuenit. Nicolo teste. Ad mouentur præcordiis, oleum cotoneorum, mastichinum, myrtinum. Emplastrum de crusta panis Mont. epithema diaocnantes Tralliani.

Præter hæc curanda sunt quæ vrgent symptomatica. sunt autem vomitio immoderata, animi deliquium, conuulsio. Ad vomitum cōfert thus commanducare, vel tro. de thure, cum puniceo succo discocto leuigatos sumere. Et extremas brachiorum, & fœmorum partes circa inguina vincire, & aquam frigidam, vt iubet Almanzor, vel calidam, vt vult Paulus cruribus, & pedibus ex alto instillare. Et ventri superaccommodare astringentia, sub forma unguentorum, epithematum, emplastrorum, malagmatum. Optimum est cataplasma ex palmulis cum floribus labruscæ cum acacia, hypocistide, & puniceo succo, plurimum etiam auxiliatur ficaria magna cum multa flamma fundi ventriculi affixa, ac vi abstracta, eaq; secundo ac tertio agglutinata.

Ad exolutionem, quæ dissolutis spiritibus contingit moschum hordei grani instar leuigatum ex vino dare prodest. Item carniū hœdorum, & pulloꝝ expressum cum vino commixtum vtiliter porrigitur. Ad conuulsionem ex inanitione, con-

uenit litus, vel fatus, vel balneum ex oleis violato, si causa est calida, liliaceo si frigida.

Victus ratio tenuissima sit, si quidem peracuta affectio est. At si virium prostratio impendat, odoribus bonis spiritus instauretur, aut cibus detur paucus boni succi, & concoctu facilis. Qualis est aqua carnium pullorum perdicis, phasidis, vituli, hœdi, oua sorbilia cum succo limonum, vua pensilis siccata, potus sit vinū punicorum. Sed in frigida causa concedunt vinum generosum odoriferum, istud enim recolligit vires celeriter, vt scribit Gale. 12. ther. A cibatione somnus cōciliandus in aëre temperato, nam frigus prohibet substantiæ defluuium, quia densat, cogit, astringit, ob id meatus protrudit, ex ipsius corporis habitu intro ad ventrem. Calor etiam nocet quod rarefaciat, liquat, tenuat, & digerat. Lux quoque fluxum reddit magis exorbitantem, nam splendores discriminandi, & discutiendi vim plurimam habent.

Ab hoc periculosissimo affectu Henricus Delphinus Lugduni correptus, Dei auxilio sanatus fuit, nostraq; operula, forma fuit eximia, & per omnes ætatis gradus venustissima, regnauit aliquot annis, vt Christianissimum Regem decet, ambulauitq; cum Deo, & lanceatus sublatu est. Hoc vnū populos solatur, quod natos reliquit venustissimos, qui per omnium gradus virtutum parentis vestigia

gia imitantur, vt ad eos respicientes Virgilianum illud omnes vno ore pronuntient.

Vno auulso non deficit alter

Aureus, & simili frondescit virga metallo.

Amuleta. quæ in profluuiis ventriculi, & intesti-
norum laudantur, sunt, Smaragdus, Topazius, Co-
rallus de collo suspensi. Rubiam minorem supra
ventriculum, & ventrem gestare. Sumach siue rhus
gestata, vt perhibet Nicolus.

De gulæ seu meri affectibus.

CAP. II.

Gula quæ œsophagus stomachusq; dici-
tur vna est in posteriori parte semita, ve-
luti canaliculus per quē cibus, & potus
defertur: habet enim duplicē tunicam,
altera ad cibi, & potus deglutionem vtitur, altera
ad eam quæ vomendo fit, expulsionem. Eius ergo
geminus vsus, quod sit via eorum quæ deuorantur,
& quod circa viam actionem quandam efficere
videtur, tum deuorando quæ ab ore ad ventrem
deferuntur, tum quæ ab hoc, ad hos eleuantur reii-
ciendo.

An motus deglutionis sit naturalis? deglutio se-
cundum Auicem. completur duabus virtutibus at-
tractiua, videlicet, naturali, & voluntaria, sed gula
non habet musculos, igitur deglutio non est motus
voluntarius, sed mere naturalis, factus virtute vilo-

rum

rum gulæ, qui deglutionis tempore in se contrahuntur, & ea cessante relaxantur. Galenus tamen ostendit deglutionem fieri per facultatem ventriculi attractiuam virtute vilorum, licet gulam inuoluant quatuor muscoli, duo in parte anteriori, & in posteriori versus colli vertebrae duo, quorū inflammatio peruertere collum facit, vt vix possit gula deuorare. In summa, gula est ciborum ad ventriculum via. trahit per gulam ventriculus cibos, quos etiam per eandem euomit, & ideo facilius est deglutire, quàm vomere, quòd deglutiatur ambabus ventris tunicis operantibus, vomatur autem altera tantum.

Gula afficitur imbecillitate, resolutione, inflammatione, vlcere. Deglutio læditur ob eius imbecillitatē, & paralyfim: vnde attractio aboletur. Item ob viæ angustiam, vti illa est, quæ fit à carneo gulæ tuberculo, totam ciborum viam occupante, vel à re crassa, & lenta. Aut à tumore, seu inflammatione muscutorum gulam inuoluentium, vel à luxata colli vertebra, aut à gulæ vlcere.

Digno. quoties in meatu est angustia, deglutio est inæqualis. Et si magna fuerit angustia, potus deuorari tentatus, sæpe ad nares regurgitat. In his dolet spina colli, aut metaphreni, quòd gula ei infidet, inhæreatq;. Est autem deglutio erectis facilius, supinis cōtra difficilius. Gula ab imbecillitate affecta,

sta, cibi transitus per eam tardus, sed deglutio indolens, & æqualis.

Præfagia. gula patitur ex humiditate cerebri. 6. apho. com. 2. Gula perfrigerata ob frigida potū, quam nemo sanare potuit. 7. ther. hanc culpam Galeno impingit Arnaldus, sed perperam, scribit enim Galenus quod ex frigida potu gula imbecilla valde offenditur. Gulae vlcus in iunioribus vix curatur, in natu maioribus fere insanabile. Si deglutio sine gula resoluta fuerit, perniciem inducit, vt ait Aetius, tandiu enim viuimus quandiu nutrimur, vt Aristoteli placet. *Contra Arnald.*

Metho. m. gula laborante, cataplasma spinæ apponendum, si quidē spinæ gula superiacet per collum, & pectus vsque ad ventrem porrecta gula habet consensum cum spinali medulla. Remedia applicari debent collo inter duas scapulas. Curatio earum quæ intemperiem efficiunt causarū fit per euacuationem. Ipse verò intemperaturæ sola alteratione sanantur.

An repellentia in gulæ inflammationibus conueniant, disputat Valescus. Cui gula exulcerata est non semel nec tota simul adsumenda, sed paulatim & assidue, ratio à positu, & figura indicatur, quādo ex transitu & contactu vulneribus vtilitas accidit ex continendo, & diutius herendo. Eadem ratione remedia assumenda crassiora, & magis lenta sunt adhib

adhibenda, talia enim adhærere, & vndiq; quasi cōcrescere, & agglutinari possunt. Igitur assumenda medicamenta esse debēt viscosa, vel lentis permista, vt in transitu adhæreant, quæ sæpissime lambendo sumantur, vt ait Nicolus.

Remedia. abolita deglutitione fame ne quis pereat, clysmis nutrientibus sustentatur. Isq; niti debet, vt recentium & crudorum ouorum, vel sorbilibus albumina absorbeat. Mox vitellos deglutire conetur, & ita paulatim solidioribus assuescere, his remediis à gulæ vlcere sanata fuit Marchionissa Mantuæ à Cermisone vt testatur Sauanorola. Deglutiendos cibos appetentia præcedit. Itaque longæ ceruicis animalia deglutire solent inclinato capite. Insuper ne quis fame periclitetur, quidam inclinare iubet totum corpus aquato ouorum conleuato, & in aquam verso. Deinde ægrotans, aquam ex gallina extillatam cum saccharo bibat, vel vinū potet in quo gallina, vel capus vsque ad partium dissolutionem elixatus fuerit, cui licet addere ouiluteum, & parum recoquere.

An clysmus nutrire queat? Clyster qui nutriendo est, ab intestino ad intestinum vsque in ventriculum attrahitur, vt asserit Auenzoar. Verū per clysterem infusa omnino ad ieiunum vsq; ascendere non possunt, vt credidit Galenus, de infusis, scilicet, medicamentosis, non item de infusis alimentis


Galenus locus
xplicatus.

mentariis. Quanquàm nonnullis clysteres etiam medicinales adeò ascenderunt, vt vomitione reicerentur, vt idem narrat. Ventriculus enim male affectus etiam ab infernis partibus aliquid assumit, non quod trahat, sed suscipit duntaxat ea, quæ ab intestinorum compressione violenter sursum feruntur. Igitur alimentum per clysteres in ventriculum ipsum conscendere potest: famemq; arcet stenosin, cutisve astricta. Nam animalia in latebris delitescunt sine cibo perdurant. quoniam per desidiã, & torporem in quo versantur, astrictamq; cutem, nihil ab eorum corpore exhalat, quod cibo instaurari postulet, sed raritas cutis euacuat, quam si frigore, & quiete densaueris, nihil incommodi ex fame expectandum, quod in libello nostro de salubritate annotauimus. Quidã Venetiis quadraginta diebus continuis ieiunus fuit, vt testatur Al. B. non dissimili forsan ratione. Ad vlcus gulæ. ℞. hyssopi, absynthij pontici añ. m. ꝯ. radicis dulcis rasæ, passarum iuiubarum añ. ʒ. ꝯ. tragachantæ, gummi arab. añ. 3. j. sem. myrti 3. iij. sem. cytoniorum 3. j. mellis ʒ. iij. cum aqua sufficienti fiat decoctum, ex quo colluat os, & gargariset. Aliud. ℞. lactis calybatu lib. ꝯ. mellis 3. vj. misce pro gargarismo. Aliud. ℞. diatragacanti frigidi tabulati ʒ. j. boli armeni ori. 3. j. terantur simul in mortario, & cū syrupo myrtino fiat massa ex qua formentur hypoglottides.

De

De cardiaca passione.

CAP. III.

 Ardialgia est cordis dolor, dicitur etiam de tremore cordis, deq; oris ventriculi morfu, quod prisce cor nominabant. Vocatur etiā relatus affectus *καρδίαγος, καρδίαος, καὶ καρδίαη*. In summa Cardialgia est oris ventriculi mordicatio. In ventre, inquit, Galen. non solum morsus, sed etiam alij affectus, tum qui nauseam in eo excitāt, tum qui cardiogmi vocantur, expultricem irritant. Inde innuere videtur cardiogmon oris vētris morsum esse. Vtunque tamen satis constat quod verbum *καρδίαοση* significat symptoma, quod mordicationi stomachi succedit. 2. de alimen. cap. de piris, & punicis. Os ventris primum est quod in cardiacis afficitur, per consensum vehemēter oblædens cor ipsum, propter vicinitatem.

Causa. cardialgia stomachi dolor acutissimus ab humorum acrium secūdum plurimum morfu oritur. Molestus stomachi dolor, morsus, & punctura à succis mordacibus oritur, & ad sentiendi vim pertinet, nam sensus oris ventris, quā vlli reliquarum partium acutior est, propter nervorum magnitudinem à cerebro ad os ventris descendentium, per quos sentit.

Digno. febris acuta æstuosa cum pulsu denso, & obscuro, extremarū partium frigiditate, sudoribus
circa

circa faciẽm, & pectus glutinosis, & odore corporis tetro. Ad hæc accedunt desperatio ægri, angor animi & corporis iactatio. (Vitioso humore partes ad cardiam, id est, os ventris attinentes imbuent) Mulier erat nauseabunda, cardialgiaq; torquebatur. 2. de alim. Os ventris: quia in consensum sui affectus animam adducit, quum incaluerit, iracundos facit, si verò in frigidatum fuerit, ad intelligendum, & agendum tardiores homines, reddit. 6. epi. com. 4.

Præfag. In febribus cordis dolor malum. 4. apho. 65. Autumno ferinum, cordis dolores, horridum, & atra bilis. 6. epi. Tristitia affectis, exercitatisq; valentius in ventriculum flava bilis confluit. 2. de plac. Lipothymia aliquando incidit ob stomachi debilitatem, nonnunquam ob vitiosos humores os ventris rodentes. Act.

Meth. m. symptomata causarum sublatione curanda sunt. Si quis febrem non habens abstineat à cibo, & cordis morsum patitur, purgatione se egere per superiora significat. Si ad oris ventris dolorem subuersio, erosio, & nausea à causa calida sequatur, aqua tepida pota vomitum prouocare iubet Mansor, & si hoc inualidum fuerit, impactum succum per aluum hiera picra purgare, laborantemq; cibare pane, vino austero, vel mali punici succo, vel serapio cotoneorum acidorum macera-

10. At si dolor sit ab inflammatione, inter curatio-
nis initia detrahare sanguinem ex axillari dextra.
Et dolenti loco accommodare epithemata ex fan-
talis rosis, & camphora cotoneorum succo leuiga-
ta. Et præter ptisanam nullum cibum offerre, nisi
corroborandi gratia, punicorum acidorum succum,
& similiū, qui frigidam, & astringentem vim pos-
sident. Actus vehementia remissa atramentū cala-
mi dulcis intybi succo dissolutum, & simul cum eo
decoctum ægro offerre.

Mulier, inquit, Hippo. 2. epid. cardialgia torque-
batur, nec prius malum est sedatum quam polenta
succo punici asperso semel in die vteretur, reliquis
cibis abstinens. Liquet ergo mulierem ex eo quod
pravis humoribus os ventris præmaderet, ac flu-
ctuaret, nausea, & stomachi mordicatione seu car-
dialgia vexatam fuisse. Illum igitur humorem sic-
cavit polenta, succus verò vnà sumptus ventricu-
lum roborauit, vt posset humorem tunicis obhæ-
rentem excutere, atque exturbare.

Cardiacos Aetius curat aëris frigidi admissione,
& ventilatione, faciei aspergine, ex spongia posca
frigida imbuta, fomentis ad caput frigidis, qualia
ad phrēniticos scribuntur. Cordi adhibet epithe-
mata ex omphacio, & similem facultatem haben-
tibus, partibus exundantibus, vtpote, collo, thora-
ci, & locis sub alis, & inguinibus, ea quæ reprimunt
sudo

sudores, vt myrtus malicorium, galla, gummi, amy-
lum, māna thuris, candido oui excepta, oleū myr-
tinū, ænanthinum, rosatum melinū. Extremas par-
tes refrigeratas calfacit frictionibus, & gracilibus
lindeolis circumpositis, oleis calidis illitis, vel syna-
pi, pyretro, & phenigmis. Reficit eos pane ex aqua
frigida, vel vino albo oligophoro diluto, quo vtē-
dum est, donec pulsus subtremulus esse desinat, ro-
bustiorq; fiat. Odoramenta etiam varia offerre cō-
sultat, vti sunt malum cotoneum, pulegium, cucu-
mer, & similia. Seruandæ vires odoramētis sunt, vt
ait Aurel. hæc enim sensim quodam nutrimento
reficiunt, sicut ratio probat, & Democriti dilata
mortis exemplum fama vulgatum, sed mediocriter
cibandum, nam virtus ex immodicis nutrimentis
opprimitur. Et si omnis spes fuerit absumpta, per
clysterem cibum iniicere cōsultat, vultq; Cardiacos
iacere in locis refrigerantibus, & vmbrosis, & ob-
scuris, qualia sunt hypogea ad aquilonē conclusa,
conuenit etiam neque maiora esse loca: quia solu-
tis sudore, plurimus aër noxius. Angusta quoque
insalubria: quia præfocabilia, & quæ facile feruorē
ex ingressu hominum concipiant.

De naturali cibi appetentia. CAP. IIII.

Ris ventriculi est appetere, & non conco-
quere. At talis cupiditas qua cibum po-
tum

tumq; appetit, animale officium est, secundum Gal.
sed fames Aetio naturale opus, & non animale di-
citur, fames etiam pro defectu ciborum accipitur,
proq; suctionis sensu.

*rubium in
definitione
aristotelis.*

Esuries cur definitur appetitus calidi, & sicci,
2. Aristotelis de anima, non video, quum animalia
calidis, frigidis, humidis, & siccis nutriantur omnia,
fames Drusiano dispositio inter naturalem, & prae-
ter naturam media est, nam licet duabus facultati-
bus perficiatur, videlicet attractrice, & sensili, ta-
men nec ad cibos accedimus, ut inquit Gal. plane
secundum naturam affecti. Eorum enim qui cibum
desiderant inanitum corpus est. Est etiam fames
cum, & sine appetitu. 2. apho. com. 2 1.

Causa partium inanitio subditarum. Inanitarum
partium naturalis appetentia. hanc sequitur ven-
triculi suction, deinde suctionis sensus, postremo ipsa
animalis appetentia omnium ultima, fame secundum
plurimum est à superfluitate coloris in toto corpo-
re, & extremitatibus eius, ut loquitur Auicen. fri-
gus famem suscitatur, quod vacua reddat corpora, &
ipsorum tunicas cogat, constringatq;. Itaque appe-
tentia per aestatem deiicitur, quod liquati nimio
calore succi partes impleant, modicaq; tum suction
fiat, iuvante ad id nimio potu, quo tunc affatim
implemur. Contra per hiemem fames valida fit:
quia frigido inanite partes valentius trahunt.

Vent

Ventriculus est humidus, si lingua est humida. Recipit humores biliosos, si quis sanus ieiunet. Impletur superfluitatibus magnis, mœroribus atque doloribus.

Digno. fames vera & falsa, veræ esuritionis signū eximius ciborum defectus, seu subtilis in ore diæta, hoc est, tenuis in ore victus. Ventriculus incalescit, aut refrigeratur ex manuum, & pedum calfactione aut refrigeratione, vt §. contin. ait Razius

Præfagia. ex fame cacochymia. Ephemera feb. vertigo, vomitus, fames corpora siccant, humores attenuat: quia calor naturalis carens alimento in quod agat, ad humores conuertitur, stomachum malis replet humoribus. Senes facillime ieiunium ferunt, secundo loco qui ætatem consistentem habent, minus adolēcentes, omnium minime pueri, famem non tolerant senes debiles, & infantes, vt ait Auicē.

Famem sustinere non est signum fortitudinis naturæ, sed sitim sustinere bonum signum esse, autumat Rasiu. §. apho. fames aduersatur his qui mordaces humores collegerint, in ore ventriculi.

Est nonnunquam quo minus animal esuriat causa, nutrimenti abundantia in hepate, nam venter si melius paratum nutrimentum habet, externum non postulat, sin aliquando postulat, neque eius copia datur, excrementis variis impletur, quæ

x 3

trah

tra henti, iecur illi remittit. Quæ in latibulis iacent animalia, nihil vel parum dissoluuntur, vt quæ neque extrinsecus calefiant, & neq; intrinsecus. Ideo nonnulla eorum neque egent alimento, nonnulla verò paucissimo omnino. Nos de inedia in compendiolo nostro de sanitatis tutela, paucis differuimus.

De lesa cibi appetentia.

CAP. V.

Est autem non triplex modo, vt vult Galenus, sed quadruplex, videlicet debilis, deperdita, vehemens & deprauata.

Causa. debilis est corporis exigua inanitio, per fluorem substantiæ. Debilis stomachi functio, vel suctionis sensus, copia quæ in hepate est, causa est non esuriendi, scilicet, vt plurimum. Nam vt glossematarij doctores asserunt, quod vera appetentia inesse potest plethoricis, & athleticis, quorum habitus bonis abundat humoribus. Quod mihi videtur dissonum à Galeni sententia.

Præfagia. animalia venenata fame nō intereunt, teste Plinio. Inediā longissime ferunt, quibus corpus crudis succis abundat, fames calidis, & siccis naturis aduersatur, quare insalubris in causis biliosis, fames conuenit carnes habentibus humidis, corpora enim siccant. Inedia euacuat, sed longo tēpore, & cum periculo. Euacuat autē ex accidenti,

&

& vires prostermit, quoniam cibandi scopus est, virtutis vitalis custodia. Ex longa inedia foetus in utero destituitur. Ad euacuandas inflammationes inedia vacuare non potest, vt sentit Gale. nullumq; vnquam perisse ob inopiam ciborum. Alioqui latentia animalia absque cibo non durarent, quæ tamen durant. Sanè multos diu vixisse citra vllum omnino cibum testatur Albertus cognomento Magnus. 7. de animalibus. Idem asserunt Pogius, Valescus, & Rodoginus. Inedia homini, vt ait Plinius, & ante eum Hippo. ante diem septimum letalis non est.

Metho. m. Curatio est causarum sublatio. Cibis nō impleri appetentiā facit. 5. epi. Cibi appetentiā inducūt labor, & longior peregrinatio, vt ait Aegineta. Aqua & vigiliacibi appetentiā faciunt. 6. epi. illa ratione frigiditatis, quæ facit appetere, hæc verò quod digerat, trahatq; humores ad exteriora.

De apositia siue inadpetentia. CAP. VI.

Anosia est oblita appetentia, qua adfectus à Tralliano ἀνοξία dicitur.

Causa. corpus non inanitum per fluorem substantiæ, suctio stomachi non facta, suctionis sensus in stomacho non factus. Aut ex intemperie, aut humoribus in stomacho contentis excitatur. Immoderata quoque frigiditas fa-

stidij causa est, quando vires corporis emortuas reddit, & præcipue oris ventriculi, cuius est appetere, & non concoquere. Ciborum fastidium interim ob os ventriculi oritur, ab aliqua humorum aliena qualitate infestatum. Interim propter extinctionem facultatis appetitricis. 3. epi. com. 1. fastidium per sæpe est coniunctum ardentibus febribus inibi com. 3. fastidium in grauidis fit, eadē quæ pica ratione, læso nempe ore ventriculi.

Prælag. cibi fastidium recidiuam nunciat. Appetitus perditio periculo non vacat, si accesserit in declinatione morbi, aut in diuturna imbecillitate, aut viribus debilitatis, aut ex immodica euacuatione, vt prodit Aetius. In quouis morbo mente constare, & bene se habere ad illa quæ offeruntur bonum, contra verò se habere malū. Hesiodi carmen in ergis est, quo in fame plurimum crassescere, aut extumere pedes ait, eum locum, nec satis explicat Proclus, nec ipte Aristoteles in problematis. An quia natium calorem inedia conuellit, vnde flatus, crurum pedumq; œdemata consurgunt, Vetus tum adagiū, fames & morabile nasum cōciunt.

Metho. m. necesse est vnum è tribus perficere, aut humores euacuare, aut contemperare, aut mutare, & si ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos, aut vomitu, aut per aluum euacuabis. Attamen fastidium habentibus, molestæ sunt
purg

purgationes quarta primi. Omnia quę exhibentur, eiusmodi esse conuenit, vt facîle deuorari possint, quę enim multa commanducatione indigent, appetentiam auertunt.

Remedia. purgãtia sunt aloe, myrobalani, manna, in causa calida. ℞. absynthij pontici m. j. corticum myrobal. citrearum 3. v. macerentur in aqua calida per 12. horas, colaturę adde hierę simplicis 3. s. vel 3. j. opitulatur decoctum absynthij potum. Item decoctum myrobal. cum melle aëreo, pilulę ex aloe lota. Noxios humores qui in ventre coierunt, deiicit, & appetentiam inuitat oxyphœnicum, diamelon seu diacydoniũ, & diarhodum laxatiua. Caucalis ex aceto mulso mansa, & vomitione reddita ventrem purgat, appetentiam inuitat. huc refer lactucam cum aceto, oxalidem. De fructibus myrobalani conditę, pyra, poma acetosa, cytonea, persica, chrysomila, punica mala, mora acetosa, pruna damascena, acor citri, & limonis melca, posca, acetum. ℞. limaturę chalybis præparatę 3. j. cum saccharo rosato fiat conditum, appetitum incitat sumptum.

Ad fastidia ex occasione frigida, purgat omnes humores, roborat ventriculum, & appetentiam inuitat decoctum myrobal. ex vino. Kebuli belirici, & emblici laudantur, pilulę stomaticę M. De alterantibus, & digerentibus sunt mithridatium, the-

x 5 riac

riaca, puluis Salyceti, ex cardamomo. Aromaticum rosatum, Acetum scillinum. De cibis, condimentis, ac opsoniis, iusculum columbæ, cæpa ex aceto, Rafani appetentiam fastidiosus inuitant, sal, piper, cinamomum, origanum, mentha, melissa, nasturcium. Cari, & zedoaria in intinctus, & embammata, seu immersiones in quibus panem vel obsonium intingimus, pisces falsi, oliuæ, & cappares. Condimentum ex aqua, & melle cum pipere, & cinamomo, Gingidium cum aceto mansum collapsam appetentiam excitat, vinum merum optimum.

Appetentiæ officiunt cerebrum animalium, medulla, crocus, cucurbita, ficus, lactarea, portulaca, pruna, sisamum, secacul cõditum, zuccharum violatū, gluten, albotim seu terebinthina, dacridium.

De vehementi appetentia, inexplibili fame. CAP. VII.

VEhemens & sedari contumax ciborum appetentia canina fames dicitur, quæ est deprauatus cibi adpetitus, quo qui vexatur assatim implent se cibis, quos paulo post, aut euomunt, aut fluore deiiciunt.

Causa. vna est acidorum humorum vitium. Altera plurima per totum corpus inanitio. Accidit per primum, vt eorum quæ fuerunt ingesta, multa fiat deiectio, per secundum verò, vt ob exactam habitus

bitus inanitionem cibus per corpus digeratur. So-
let fieri vel propter dyscrasiam frigidiorē, vel pro-
pter humores acidos, quos exforbuit os ventricu-
li, & apud Trallianum vermis etiā duodecim cu-
bitorum insatiabilis famis causa fuit. Indefinenter
famescunt, famescuntibus autem labor malus.

Metho. m. curatio fieri debet per causarum sub-
tractionem, ἄλμα nuncupant pharmaca, quæ fa-
mem obrepere prohibent. Nam est & alimos her-
ba, quam gustantes famescere nesciunt. huic malo
etiam medetur diaciminum, diapipereon, electua-
rium aggregationis Auicen. hieralogodium, & ele-
ctarium de scoria ferri. Ali. theriacam laudat Sera-
pio, famem thorixis, id est, vini potio soluit, & pin-
guia oleaginea q; edulia, ossa panis vino imbuta ie-
iuno stomacho sumpta, conseruat hominem satu-
rum. Insuper oryza ægro vtiliter edenda porrigi-
tur, cui sanies ab agno in fornace asilo emanās pin-
guedinis loco cōmista sit. Cande, & agnorum pe-
des, & qui his viscositate, & pinguedine respondēt,
cibi accommodè offeruntur, vinum quoq; vetus
haustū optime facit, his deuoratis, vt ingesta euo-
mat præcipiendum. Sin verò à cibo nulla mole-
stia carnes bubulæ, & alia concoctu peruicacia
edulia porrigenda sunt, vt est triticum pultis instar
elixum, & oryza cum lacte decocta accommodè
exhibetur.

De

De bulimia quæ, & cenangia dicitur. CAP. VIII.

Bulimum ingentem publicam famem significare ait Plutarchus. 6. sympo. ac ibi bubo stris vehemens fames interpretatur. Bulimus est fames Saguntina apud Trallianum, est fames magna subiecti ratione: quia mēbra infestat omnia, quanquā stomacho fastidiēte, proinde vniuersa dicitur fames, sicuti fames canina particularis, quæ plerunque præcedit vniuersalem.

Est igitur bulimus membrorum inedia, cum stomachi satietate, insigniter quippe alimento indigent, quanquā id reiiciente stomacho. Est symptoma osculi ventriculi, vbi penuria, imbecillitate atque refrigeratione afficitur. Est casus potentię ex frigiditate exteriori, qui à fame quidem inchoauit, sed non habet eam amplius adiunctam deleta, scilicet sentiendi potentia à frigiditate exteriori, vt definit Galenus, proinde differt à lupina, canina vē fame, in qua perpetuo fames vrget. Certè vt rectè ait Plutarchus loco præcitato, bulimos non est fames, sed ventriculi affectus, qui animi deliquium propter concursum famis inuehat, fidē facit, quod in iumētis vsu venit de ficuum, & pomorum odore, qui non famem, sed potius oris ventriculi mordicationem facit.

Cam

Causa. perniciem iter facientes canina famæ,
vel bulimia imperantur. hanc etiã incurrunt equi
& asini quando ficus recentes, aut mala baiulant, si
credimus Plutarcho. Quum os ventris simul, & pe-
nuria ob cibi defectum, & imbecillitate ob intem-
periem vehemẽtem laborat, ea affectio est βόλιμος
siue βολιμία, frigiditas, scilicet, iuncta siccitati,
Trallianus eam nasci retur ex calore nimio ad in-
tima coacto cum imbecillitate stomachi, cui sub-
scribere videtur Auicen.

Præfagia. bulimia præuiam habet caninam esu-
ritionem. Nonnunquam ad syncopem deducitur.

Metho. m. bulimum non aliter atque ex vehe-
menti refrigeratione defectiones curat Galen. i.
ad Glauco. In hoc malo quia vires sunt debiles cu-
ratio statim est adhibenda, vitales, & naturales ci-
bis boni succi facilisq; concoctionis refouebimus,
animales verò reuocabimus aceto, aut pulegio ad
odorandum exhibito. Item pomis ac aliis qui in-
ueniri possunt fructibus. ℞. aquæ rosarum, lib. s.
nenupharis, & buglossæ añ. ℥. ij. aquæ menthæ ℥. j.
santalorum omnium añ. 3. j. spodij 3. s. violarum
florum p. vnum, cinamomi caryophyllorū añ. 3.
s. moschi grana. ij. ex hoc liquore facies asperga-
tur. Auxiliatur, & panis recēs, vel assus naribus ad-
motus, caro suilla assata, & in vniuersum quod ni-
dorosum ac probe conditum habet odorem, his
enim

enim vt plurimum multi refocillantur. Insuper extremæ eorum partes fasciis constringendæ sunt, vt docet Aetius, manuumq; ac pedum summitates calidæ aquæ imponendæ, & ipsi quoque stimulis eorum maxillis, crinibusq; ac auribus vellicatis excitandi. Reuocatis ab exolutione panem ex vino diluto offeremus, aut alia quæ aceruatim vires reparare possunt, vt sunt iuscula, aqua, & succus carnis oua sorbilia, halica cum vino, compendiosissimum ex cibo auxilium est.

Recetiores in causa calida apparant materiain cum vino punicorum, vel oxylachara simplici, & eam deturbant decocto myrobalanorum citrinarum, vel ex rhabarbaro manna, & tamarindis cum decocto prunorum. In causa frigida datur acetum scillinum bis in die, dilutum aqua buglossæ, & materia expurgatur hiera simplici cum decocto myrob. chebularum, & emblicarum, opitulatur etiam balneum in occasione calida ex decocto rosarum myrtilorum scariolæ, à balneo illinunt ventriculum cū toto corpore, ex miscella rosacei cum oleo myrtino. Bulimiam etiam sanat à frigida occasione ortam, panis olei amurca inebriatus, & sumptus cum vino dulci crasso mox epoto. Idem polet adipis vaccini olei dul. añ. lib. j. liquata simul comedat. R. rosarū 3. j. galliæ mos. xyl. añ. 3. j. cāph. ʒ. 8. croci, ʒ. ij. moschi ʒ. j. cū aq. myrti & ros. f. emp. p. corde.

De

De ciborum dissipatioe. CAP. IX.

Ciborum dissipatio est affectus diabetei perquam similis, & quidem à multis cibis, qui neq; coquuntur, neq; per aluum deiiciuntur, neque plenitudinem efficiunt, neque etiam probe alere possunt, sed dissipantur, discutiunturq;.

Causa. hunc affectum referre videtur Mansor ad caninam famem, quæ oritur ab immoderata transpiratione, aut à calido sicco, omnibus partibus attractricem atque ei cognatam facultatē (quæ appetentia vocatur) seruantibus. Vt crebrior est huius affectus quàm dipsaci euentus, ita faciliorem admittit curationem, vt ait Galen. Nos doctorem medicum vidimus incredibilem ciborum copiam deuorantem, qui tanquam sanus suo munere foelicitate utebatur.

Metho. m. in causarum sublatione cōsistit. Itaq; appetentia deiicitur si suctionis sensus perit, aut suction non fit, vel cū sensus obscurus hebesq; est, &c.

De malacia, siue corrupta appetentia. CAP. X.

Κίττα καὶ λίθιαις, id est, pica. Etymon seu nominis ratio à Paulo explicatur, sed aliter ab Aetio, est adpetitus prauæ qualitatis, vt definiuit Aristoteles 7. de histo.

histor. animalium, absurdus est appetitus. 2. alim. Est oris ventriculi affectus, nam vt scribit Gal. ventriculi os læsum efficit fastidium in prægnantibus, & grauidas *λεῖψας*.


Causa. *πρὸς τὴν αἰτίαν*, id est, varia in stomacho recrementa, vel quando ventris tunicæ prauo excremento sunt imbutæ. Incidit etiam ob suppressos menses, siue humoris sanguinei redundantiam, vt cum Aetio sentit Aliab. In summa aliena stomachus appetit, ob malos humores in eius tunicis retentos, pro quorum varietate varia appetuntur.

Digno. ab essentia ratione parescunt, *μαλακία* est cum stomachi languore, & nausea, & auersione ciborum, bilis, & pituitæ vomitum inducens, consequuntur etiam assiduæ expuitiones, orisq; ventris morsus. Vētriculi morsus denotant choleram, similiter, & oris amaritudo.

Prælag. *μαλακία* solet infestare prægnantes circa 40. diem à conceptu, vel tertio à conceptu mense, & tunc foetus imbecillior alimētum nequit consumere. Inde fit, vt varia ex eo recrementa in stomacho grauidæ redundant, ex quo varia, & absurda appetat. Quæ citta laborant mulieres, quiq; impleti sunt, & quibus exolutus est stomachus, acerba degustare appetunt, alioqui si esuriant, contra respuunt acerba, & acida, expetunt autem ac sumunt quæ dulcia sunt, & pingua. hisq; expleri desider

desiderant. Cibi facit appetentiam labor, & longior peregrinatio. Cibi boni succi exhibeantur, & si aliquid ardentem desideret, etiam si non conueniat, non prorsus denegandum. Vinum propinetur maturum non album, utatur fructibus maturis astringentibus. Licebit etiam humores in ventriculo noxios deturbare atramento calami dulcis, melle aereo, & rhabarbaro: a purgatione utatur ieiuna utraq; diamargariti confectio. Vtile quoque erit deferre aetatem in brachio adalligatum, & de pretiosis lapillis saphirum, hyacinthum, corallium, iaspide, adamantem, & id genus alia.

Appendix de appetentia ex Galeno. CAP. XI.

ppetentia duplex est, vna naturalis altera animalis, naturalis animalem praecedit. Animal enim assidue per cutis spiracula in ambientem aerem dissipatur, primoque partes cuti subiectae vacuantur, vacuatae ex vicinis partibus alimentum ad se trahunt, ut quod inane est repleant: mox illae rursus ex sibi vicinis, rursusque haec ex aliis sibi propinquis. Itaque ex proxima quaque parte facto semper celeri tractu, venae quae ad ventriculum perueniunt, tandem inanes euadunt, quae & consuerunt, & possunt cibum ex ventriculo ad se conuellere, veluti stirpium radices ex terra viginem. haec actio quum animalis non sit, sed naturalis, haud aliter in animalibus

To. III. Lib. I.

y

quam

quàm in plantis perficitur. Ventriculi autem inanitionem sequitur suctionis sensus, quam animalis appetentia, hoc est fames sequitur. Primum igitur antecedit inanitio, quam sequitur naturalis appetentia, deinde ventriculi suction, postea suctionis sensus, tandem verò animalis appetentia, sed facultatem qua cibi penuriam sentimus ventriculo indidit natura, ut ad cibum capeffendum animal excitaret. Reliquæ autem partes quum semper præsentem cibum habeant, quem attrahunt, hac sentiendi vi carent. Solus venter cibi penuriam sentit, ut animal ad cibum excitet. famem auget ventris frigus, ut quod illius substantiam stringat, & premendo inanit, è diuerso hæc minuit calor: quia solidas partes laxat ac soluit, proinde ad attrahendū, ventrem reddit inhabiliorem, humidam quoque substantiam liquat, spatiaq; vacua replet. Ita calidus venter minus appetit quàm concoquit.

De siti curiosa, seu de lesa potus appetentia.

CAP. XII.

IN potus appetentia triplex noxa, debilis, deprauata, abolita. Exigua gignitur quum proximus est frigoris, & humoris excessus, quum ventriculus prope est, ut nō sentiat suum pathos. Immoderata, deprauataq; efficitur vbi plurima in ventriculo flaua bilis contine

tinetur, vel vbi congesta est in ventre falsi humoris copia, vt in hydropicis. Abolita, aut nulla sitis si frigoris ac humoris excessus adsit, frigus enim sensum consopit, humor verò præsens non desideratur, quando accidēs sitis humidi frigidiq; est appetentia. Sitis in rigore fit, quia calor intro colligitur. In principio etiam exacerbationis febrilis contingit, quoniam humores ad profundum declinant.

Dignost. si potu aquæ calidæ sitis sedatur, causa sitis, est pituita salsa, cuius crassitiem, & lentorem aqua suo calore disgregat, attenuat, & incidit, & humiditate, ac dulcedine salsedinem remittit, modo potus largus sit, vt loquitur Auicen.

Præfag. Minus sitim quàm famem tolerare possumus. 28. probl. Quidam inexhausta siti enecti. 1. de ea. fy. Vehementi siti laborantis quatuor accidentium periculum à potione subire solent, vnum est vomitio, alterum velox per aluum excretio, tertium quòd potus diutius quàm par est, in ventriculo manet, quartum vrinæ fluor. Qui noctu bibere appetunt, his admodum sitientibus, si super dormierint bonum. 5. apho.

Ατονος est stomachi vitium quod cum siccitate, & ardore fit, & inextinguibili siti consistit, quem affectum largus hiera Pacchij sanat. Libycæ feræ æstate non bibunt, hyeme potui indulgent. sitim non sentiunt quibus sunt ossa concreta. Rodog.

y 2 Me

Metho. m. Siti leui ex vigilia somnus remedium
 est, ei verò qui ex somno, vigilia. 6. epi. sitim arcet
 continere os, tacere, auram cum potu frigidam in-
 ducere inibi. sitim magis sedat vinum dilutum quā
 aqua sola, quoniam vinum adiuvat aquam ad pe-
 natrandum, vt dicit Galen. 1. simpl. & Aristot. 2. 7.
 probl. & sunt pharmaca quæ sitim obrepere
 prohibent, vt ait Plut. in sympo. Sitis à causa calida
 & humida, quæ in aquæ inter cutem affusionibus
 aliquando prouenit, optima medella acetum, si ve-
 rò causa calida, & sicca fuerit acetum aqua dilutum
 optimum remediū est. 1. simpl. Sitim à pituita falsa
 per falsos cibos Tral. ianus curat. Gordonius verò
 cum Auicen. potu aquæ dulcis calidissimæ. Sera-
 pio. allio vel semine anisi epoto. Ad sitim à causa
 calida salubria sunt sequētia, medulla cassiæ nigræ,
 manna, tamarindi pruna, mala punica, syrpus de
 acore citri, de granatis, de persicis, de cannis, de
 portulaca, decytoniis de agresta, de pomis, de pru-
 nis, de nenuphare, acetosis alteraniabim, spodiū
 cū aqua, & zuccharo sumptū, fermentū in aqua dis-
 solutū in siti febrili potū sitim extinguit, vt prodit
 Serap. aqua sit quadrupla ad iulepum, vt sitim ex-
 tinguat vt monet Nicolus. R. se. portulacei citru-
 li añ. 3. j. tragachantæ 3. s. cum albo oui vel muc-
 cagine sem. cytoniorum fiāt hypoglottides, quarū
 succus paulatim deglutiatur. Aliud sem. portulacæ
 virid

viridis, sem. cucumeris tragachantæ añ 3. s. radicis
dulc. 3. ij. fiant tro. cum syrupo portulacæ. Aliud. se.
portu. sem. papa. succi radicis dulc. tragachantæ añ.
3. j. cum syr. cyton. fiant globuli, quos in ore detine-
re oportet, spartanā in ore habentes sitim famemq;
non sentiunt, si Plinio credimus. Quæ in ore de-
tenta, sitim sedant, sunt crySTALLUS, acates, alecto-
rius, hyacinthus.

De nausea.

CAP. XIII.

Nausea est stomachi, siue oris ventris af-
fectus, sicuti singultus. Et deprauatus ex-
pultricis motus, veluti, & vomitus: sed
nausea irritat tantum, & perturbat nul-
lum humorem euacuans. Itaque nauscabundum
animal esse, est ventrem impetum capeffere, vt per
vomitum euacuetur. Vnde nausea duplex, vna ci-
tra vomitum, altera cum vomitu.

Causa. vehementioribus corporis aduenit mo-
tionibus. Nauseæ fiunt si cibus non placet. Causa
interna res noxia ventriculo, nempe humor gra-
uens vel mordens. Item nauseat necessario ventri-
culus phlegmone obsessus.

Fastidiosi ægri fiunt bifariā, primo modo quum
virtus à corpore grauatur, nullamq; figuram facile
sustinent, & hi perniciose afficiuntur. Altero modo
quum os ventris à prauis mordetur humoribus, &

y 3 hi

hi nauseabundi sunt.

Digno. nausea sine vomitu significat humorem in ventris tunicis contineri. Inanis indicat calidum succum imbibitum ventriculi tunicis.

Præfag. nausea præcedit vomitum. Ex ieiunio intestino aliquid per nauseam educitur. 7. de comp. med. *ἡ γὰρ* hinc scienter colligit Valleriola pylorum ventriculi, & non intestini esse partem: quia per meatum inferius ad pylorum ventriculus sese expurgat, ex quo consequitur ventriculum intestini ieiuni partem esse.

Metho. m. nausea dupliciter curatur, vno modo si humores gignētes vacuauerimus, alio si eos concoxerimus reduxerimusq; ad temperiem optimā. Nauseam discutit foeniculus, trago. & pulegium squinantum, lupini dulcorati sumpti cum aceto, sumach, castanea nauseam & vomitum curat. Absynthiū nauseas maris arcet nauigantibus. Diaolibanum nauseam aufert.

De vomitione.

CAP. XIII.

Emetos, id est, vomitus, est expultricis motus, id quod triste est, in ventriculo egerētis, fit enim vomitus è gula, & ventriculo. Est affectus similis diarrhœis superioris ventris vel multitudine grauati, vel ciborum excrementorumq; qualitatem non ferentis, vom

vomitus est violentus, nam si ad demittendum cibos comparatus est ventriculus, vbi non deiciet, sed reiiciet, violenter agere videtur, est enim vomitus deglutioni contrarius.

Videtur tamen naturalis, quia fit per instrumenta naturalia, nulla arte adhibita, vt naturam iuuat, etenim si agens, instrumenta, finis natura est, naturalis erit affectio, sed Galen. lib. de motibus liquidis mistum posuit, tam à vi voluntaria quàm à naturali, sed quia à sola naturali vi aliquando perficitur verè mistus dici nequit, vt opinatur Scal. Neq; sequitur ab vtraq; , Vi fieri potest, ergo mistus, sicut densatio è frigore, & calore potest euenire, non tamen mista affectio est, nam voluntaria actio in membris mera nulla est, habet enim instrumenta naturalia. At naturales duplices sunt, aliæ meræ, vt concoctio, aliæ coherentes voluntati, sed nō semper, vt anhelitus. Quare mista actio dici nō debet, sed indifferens quod in præcedētibus iam est adnotatum. Sciendum quod aliqua quamuis etiam toto genere præter naturam sint, veluti vomitus, vel sanguinis profusio: tamen præter naturam adhuc nō esse, fatetur Gal. si modo tempestiue fiant. fiūt autē tempestiue quum id quod cōtristat expellitur. Vomitionum plures differētiae, vomitio permista ex pituita, & bile, quæ utilis est, syncerior quæ est deterior, porracea, liuida, nigra, quæ mala est,

omnium colorum exitialis. Liuida si graue olet
ocyssimam indicat abolitionem, sanè in vomitu
foetidus odor, malus est. In his notandum quòd vo-
mitus æruginosus differt ab æruginè euomita.

Causa vomitum facit nauigatio, & solus motus,
& quantitas cibi, & potus ventriculum grauans,
qualitas mordacis rei, vt medicamenti, cibi, vel
excrementorum in vètriculo natorum, vel ex cor-
pore in eo deriuatorum. Interdum nec grauiā nec
mordacia, sed in ventriculo contēta præter naturā
quæ cocta nutrire non possunt, vomere faciunt, vti
est pituita acida, salsa, & dulcis, in ea consistens, &
sanguis in eum effusus.

Digno os vomituris sputo tenui plenum esse vi-
detur, propter membranæ tenuitatem, quæ ori to-
ti interno continua est, faucibusq;, & stomacho, &
ventriculo, hinc fit vt labrum inferius interdum
concurtiatur, ventris ore ad vomitum excitato.

Futurus in febre non letali bis vomitus indi-
catur, ex capitis, & ventriculi dolore, ex visis tene-
bricosis, & si æger horruerit, & inferiores præcor-
diorum partes frigore afficiantur.

Qui ventriculi venis vomitur sanguis, cōcretus
non est, nec inde magna sanguinis eruptio potest
contingere, quòd graciles ventris venæ sint. Ali-
quando tamen qui euomitur sanguis, ab aliis par-
ticulis in ventriculum defertur.

Præ

Præſag. ventrem non ſolutum vomitus ſoluit, ſolutumq; nimis ſiſtit. hūc ſiccans illum madefaciēs, fluxum ventris vomitus ſpontaneus curat. Capitis profluuium vomitus confert. Diarrhœa diutina deſtento vomitus ſponte ſuperueniens tollit fluorem. Quæ recte ſunt à natura Medicus imitari debet, & vtilitas auerſionis ratione ſubſequetur. Natura ita fert, ne humor locis pluribus ſimul erumpere ſolet. In perturbationibus ventris & vomitibus ſpontinis, ſi talia purgentur, qualia purgari oportet, confert. In quocunque morbo incipiente, ſi atra bilis vel ſupra vel infra exierit, lætale. Ab ileo vomitus, aut ſingultus malum. A vomitu ſingultus, & oculorum rubor malum. A ſanguinis vomitu tabes & puris purgatio ſupra. Qui euomunt ſanguinem ſine febre, ſalutare: ſi cum febre, malū. De vomitu admirabili ex veneficiis libro de abditis ſcripſit Anto. Beniuenius, & Alc. B.

Metho. m. Curatio conſiſtit in his quæ noxios humores in ventriculo contentos euacuant, aut concoquant, aut contemperent, hoc autem eſt, in cauſarum ſublacione, parce detrahatur ſanguis, idq; repetitis vicibus in vomitu ſanguineo. Vomitus vomitum curat, diarrhœaq; diarrhœam, non per ſe, nam contraria ſola primo, & per ſe contrariorum ſunt remedia, ſed ex accidētī, quia cauſam excidit, idq; bifariam, humores ſcilicet euacuādo,

y 5 aut

aut eos concoquendo, & in optimam qualitatem mutando, aut contemperando. Curatio propria fit reuulsione, & deriuatione, vel per sanguinis missionem & sicyas, vt in sanguinis vomitu, vel per clysmos, & cathartica deiectoria, vt in cacochymico, sudores etiam quia vacuant per cutem, reuellunt à centro ad circumferentiam, præterea vomitiones cohibent ante cibum sumpta adstringentia, & styptica, & huiusmodi admota. Item quies, & somnus prolixus.

Remedia. Ad sanguinis vomitum intrinsecus sumpta & extrinsecus applicata astringentia benefaciunt, confert myrtus, & syrupus ex myrto, syrupus, & loch de papauere, loch de spodio Auicennæ bolus armena cum gummi arabico, & succo plantaginis sumpta, tro. de camphora, tro. de spodio cum sem. acetosæ, philoniũ rom. Athanasia, lotira.

Ad biliosum utilis erit purgatio per rhabarbarum pulueratum mixtum cum medulla cassiæ nigrae, vel per decoctum myrob. citrinarum. salubria item sunt acacia, balaustium, bistorta, citri succus, cydonium, miua cyto. pyra, & poma astringentia, mala punica saccharum rosatum cum mastiche, & cary. portulaca, rhus, syru. de pomis, de fructibus Auicennæ. sy. de nenuphare Ali. vernix cum ouo forbili sumpta, empl. ex olibano, & aquato oui. Aliud de crusta panis Montagnanæ. & pulueris mororum

rum Celsi nondum maturorum, & siccatorum in
 umbra 3.ij.umat cum syrupo myrtino, vel syr. ro-
 sato ex rosis siccis diluto aqua plantaginis, statim
 persanat. Aliud. succi cytoniorum lib. j. corallorum
 rub. sem. ros. rub. añ. 3. j. hypocistidis acacię añ. 3. s.
 rhabarbari 3. j. omnia contusa buliant in prædicto
 succo ad consumptionē tertię partis succi, deinde
 colentur, de colaturaumat mane, & vesperi ante
 pastum 3. j. R. carnis vnius cytonij cocti sub cine-
 ribus corallorum rub. rosarum rub. añ. 3. j. contun-
 dantur omnia in mortario, & fiat empl. pro stoma-
 cho. R. zucchini rosati violati añ. 3. j. ambari 3. s.
 olei nenuphari 3. s. misce, vtatur ieiunus, sanat vē-
 triculi ardorem. Raz.

Ad vomitum pituitosum. R. oxymellis simpl. sy.
 de mentha, mellis rosati colati añ. 3. s. aquę fœni-
 culi betonicę añ. 3. j. s. misce pro vna dosi. repe-
 tatur. Deinde materia in ventriculo contenta de-
 turbetur his cathartice electario, indo, diapheni-
 co, hiera picra simplici, aut cōposita, & pilulis ele-
 phanginis, & mastichinis, agarico tro. pii. stoma-
 chicis. R. theriacę 3. j. cū zuccharo fiat bolus pro
 die sequenti purgationem. R. mīuę cytoniorum
 aromatizata 3. iij. syr. de mentha 3. j. misceumat
 ieiuno stomacho tria cochlearia. Opitulatur etiam
 aromaticum rosatum, scheenanthum cum pipere,
 gallia moschata, Alipta moschata, Empl. emēdans
 vitia

vitia stomachi. M.

Ad vomitum atrabilarium, purgatio conuenit ex diasena, diacatholico, vel diamanna.

Ad vomitum à carthartico factum, gummi arabicum sumptum illum sanat, vinum quoque cum oleo potum illum sedat, vt ait Serap. & vitellum oui rec. mellis cochlearia duo, masti. grana decem, coquantur simul in putamine ouis super cineres calidos,umat tribus vicibus, persanat illum, cui nō remanet cibus in ventriculo. Aza. his qui cibum non retinent, confert ficys ventri admota. & corticis citri xyloaloes, mastic. coriand. preparat, sem. portulacæ santali citrini añ. 3. j. fiat puluis, quo vtatur in cibus, valet in omni vomitu, teste Gord. auri ad vomitum vsum docet Alex. B. & furnibulum odoratum æneum, aut argenteum.

De eructuatione.

CAP. XV.

Eructio, id est, ructus, est motus expultrici, vapores in ventriculo natos expellentis. Est autem duplex eructuatio, acida, & fumosa.

Causa. cibi & humores pituitosi, ab imbecillo calore in vapores resoluti. Acida efficitur à causa frigida, fumosa à calida. Acida tamen non ad frigus tantum, sed ad calorem suam scaturiginem refert Trallianus contra Galenum. Tralliano subscribere vide

videtur Auicen. Auerrhois & Rogerius. Certe ructus fumosus igneum vetriculi calorem significat.

Præfagia. Ructus est flatus per gulam excussus flatulentumq; spiritum in superiori ventre generari significat. Excitatur etiã ructus à causa externa, nempe bibentibus ex angusti orificij vasculis. Ructus acidi haudquaquã vbi nulla prorsum facta in ventre est ciborum alteratio, prouenire solent, ceu nec vbi optime cocti, sed tantum vbi semicocti fuerint. Nõ semper ex cruditate cibi deuorati ventriculus afficitur. In longis dysenterijs si ructus acidus fiat, qui prius non erat, signum bonum. Qui acida ructant, non admodum costali morbo laborant. Os ventris infirmum per eructuationes, tantum per propriam exercitationem roboratur. ructu ædito fumoso vel acido quid agendum cõsiderandum ve, ad vniuscuiusq; causam peruestigandam docet Galen. i. de loc. aff.

Metho. m. curatur ex causarum abolitione, cari commansum flatus discutit.

De singultu.

CAP. XVI.

ΣΥΓΓΩΣ, id est, singultus est pulmonis passio, vt retur Aristoteles. 33. probl. sed singultum Gale. oris ventriculi affectum dicit, imo totius ventriculi passionem, est motus præter naturam eiusdem cum vomitu

gene

*Singultus
differt à
spasmo.*

generis, sed eo vehementior, singultus est talis affectus stomacho, qualis conuulsio musculis, proinde singultum esse conuulsionē oris ventriculi scripsit Hippo. forsan ob id, quod singultus fit à plenitudine vel inanitione, quemadmodū cōuulsio. Alioqui singultus variis modis differt à spasmo, vt omittam quod conuulsio solis musculis inesse solet. Miscentur interdum, & morbi, & symptomata tum retentricis, tum expultricis, vt in singultu. Item per singultum vētricus praue cibos amplectitur, conaturq; deprauato conuulsuoq; motu, etiam molesta expellere. singultus fit à natura recrementorum expellendorum gratia. 6. epi.

Causa. quum ventriculus ciborum mole grauatur, aut vbi à corruptis cibis mordicus infestatur, singultu corripitur. Imo verò acris humor ventriculum mordicans non singultum modo, sed conuulsionem etiam per vniuersum corpus excitat.

Fit aliquando citra plenitudinem, & inanitionē, à morfu, videlicet acrium humorum, vel piperis ex vino poti. Item à cibo in mordacem qualitatem corrupto, à rigore, & frigiditate oris vētrici, quæ prohibent difflationem in neruosis corporibus, ac proinde ea implens, singultiunt pueri crebro, tum ob alimenti corruptionem in ventre, tum ob partis frigiditatem. Epithema frigidum ventriculo applicatum fuit singultus causa, teste Nicolo. Singul-

tus

tus propter fletum pueris accidit: quia materia descendit ad stomachum. Singultus ab inflammatione hepatis, ore ventris per consortium affecto.

Præſagia. singultus sedatur eiectionis per vomitum humoribus ventriculum infestantibus. quod si à vomitu perſtet, significat vel cerebrum vel ventriculum haud mediocri inflammatione torqueri. Ex nimia purgatione conuulsio, aut singultus malum, singultus sanatur superueniente sternutatione, quando scilicet à plenitudine fit. In hepatis inflammatione singultus malum, singultus in sopore alto, aut animi deliquio, aut tetanis, obortus, mortem non longe abesse præſagit, singultus ab inanitione orti, ferè incurabiles, sed rarius contingunt.

Metho. m. singultus curationem suscipit variam pro causa varia. Vomitus est sufficiens medela eorum qui ob copiam, aut mordicationem singultiunt, ut caliditas eorum qui ob frigiditatem, singultus per ea quæ infracta secant, absterguntque; sanantur medicamenta.

Cur validæ animi perturbationes sanant singultum, quod affirmant Auic. & Viaticus. An est quod expultricem facultatem à suo munere auertunt. Attamen qui timent singultiunt. 33. probl. 13. An quia per animi affectus vehementes fiunt motus spiritus, ad exteriora, ut in gaudio, ira, verecundia, sicque singultus à causa calida curatur. Contra à frig

frigida occasione singultus sanatur, per motū spirituum ad interna, vt per tristitiam, & cætera. Materia frigida apparatus melle rosato oxymellite, aceto scillino cum aquis fœniculi, betonicæ, menthæ, hyssopi, purgatur verò per hieram picram, pilulas aloeticas. ℞. diagalangæ ʒ. j. s. diatrium pipercon ʒ. ij. pul. aromatici rosati ʒ. j. cum syr. de mentha fiat electuarium, sumat instar nucis, mane & vesperi, zinziber viride instar amygdalæ sumptum cum vino maluatico, citissine sanare aiunt. huc pertinet electarium à Gordonio mire laudatū. In causa calida conueniunt sy. acetatus simplex, oxyfacchar. sy. rosaceus. Materia purgatur per hieram picram cum rhabarbaro, manna, & medulla cassiæ nigræ cum decocto myrob. citrearum. Insuper semen anethi assum, & olfactum pellit singultum. Alyssum herbam contractantes à singultu liberantur, vt asserunt Diosc. & Plutarchus, singultum abigit aqua in ore retenta, teste Clementino. ℞. croci costi. ros. rec. mastichæ spice añ. ʒ. ij. assari ʒ. j. aloes opij añ. ʒ. s. cum muccagine sem. psylli fiat massa, ex qua formetur tro. sumat de his. Confer in aquam calidam manus mittere, & diu in ea continere. Ad singultum ex repletionē datur ʒ. j. sem. anethi.

Amuleta. Castoreum adalligatum cito singultum finit, si credimus Tralliano, qui & plura præscribit

scribit amuleta. Annulum ex sinistra manu in longissimum dextrę digitum transferre, singultum statim compescit, teste Plinio.

Singultus ex inanitione curatur victus ratione resumptiua, videlicet iusculis, & sorbitionibus, aqua, & succo carnis boni succi, & facilis coctionis, vino, ouis forbilibus, lacte caprino vel asinæ, & balneo aquæ dulcis. Confert etiam collum, & dorsi spinam illinire, oleo amygdalarum dul. cum oleo violato.

Ad lac in ventre coagulatum, acetum simplex, & scillinum potum dissoluit. Ad idem cera instar granorum milij sumitur. Coagulum cum vino vel aqua potum, succusq; ebuli potus persanant. Eadem remedia conueniunt concreto sanguini in ventriculo.

Sanguisugis œsophago adhærentibus remedio sunt, acetum deglutitū, gargarisma ex assa, & aceto. Aliud ex butyro cum aceto, succus ebuli vel salicis potus. Allium cōmansum eas extrahit, vt ait Auic.

Ad aurum, aut æs, aut ferrum, deglutitum, maluæ, aut seminis lini succus multus in potu exhibitus intestinorum obortam asperitatem leniet, & labi faciet deglutitum. Item ea quæ fortiter purgāt pharmaca sunt ex vsu. Istis præfidiis à periculo iussu Henrici Christianissimi Regis liberauimus Morionem, qui in Ludo gladiatorio coram Rege, &

To. III. Lib. I.

z

nobis

nobis videntibus cuspidem ensis fracti acutissimam, & dodrantalem arreptam, confestim deglutiuit.

De supinitate ventriculi.

CAP. XVII.

Ventriculi propria actio est concoctio, proinde eius imbecillitas nihil aliud est quàm concoctionis infirmitas. Venter imbecillus, vt inquit Galenus, probè non concoquit, quo imbecillo non solùm cibi, sed & potionis diuturna in eo est mora. Est autem imbecillitatis occasio, ametria vel intemperies: hæc verò contrariis corrigenda est. Venter enim imbecillus nisi corroboretur cibo, recipit totius excrementa corporis. Isq; imbecillus in concoquendis cibis omnium corporis affectuum est causa.


Ad intemperaturam calidam. Ventriculus si corrodat ab humoribus acris, in primis vomitum prouocamus, dein extrinsecus aliquid astringens odoratumq; admouemus, eosq; cibos offerimus qui sunt boni succi, & nō facile corrumpuntur, habeantq; nonnihil astringens.

Ventriculū imbecillum à causa calida roborant sy. de pyris, sy. de pomis, de cytoneis, de granatis, rosatus, myrtinus, de oxalide, de agresta, de absinthio, de fumo terre maior, sy. acetosus tereniabim. Materia expurgatur vomitu vel deiectione, medulla cassiæ

siæ nigræ cum manna, diluto rhabarbari, decocto
 myrobal. pilulis assaieret cū rhabarbaro, hiera sim-
 plici Galeno falso attributa. De electariis benefa-
 ciunt diatriasantalum, diarrhodium, saccharum ro-
 sarum. ℞. conseruæ rosarum ℥. iij. carnis cytoniorū
 conditæ ℥. ij. coralli ℥. j. fiat conditum. vel ℞. pul-
 triasantali, diarrhodij añ. 3. j. sacchari soluti in aqua
 ros. q. s. fiat elect. in rombis, sumat horis tribus ante
 pastum. Per admota quoque ventriculus est fir-
 mādus. ℞. olei rosati, cydoniorum, myrtini añ. ℥. j.
 pul foliorū, rosarum, spodij, coralli añ. 3. s. ambari
 grana. ij. ceræ albæ puræ q. s. fiat vng. quod ventri-
 culo illinatur, nō tepidum. In occasione frigida ad-
 mouentur palma manus carnosæ, catulus meliteus
 pinguis, pueri carnosī non facile sudantis venter.
 vel ℞. olei nardini ℥. ij. gary. galliæ moschatae añ.
 3. j. ceræ albæ q. s. fiat vng. In penuria galliæ adde
 pul. aromati. rosati 3. j. Aliud. ℞. mastichæ ℥. ij. solua-
 tur in oleo nardino, & cum cera fiat ceratum ad-
 dendo pulueris diambrae ℥. s. pul. foliorum rosarū
 ℥. j. Apparatur materia syrupo de mentha, de thy-
 mo, de eupatorio M. secaniabim de radicibus, se-
 caniabim de calamento, mellicratum conditum,
 acetum scillinum. Expurgatur verò infusione, de
 hiera, pilulis elefanginis, pilulis stomachicis, pil. ag-
 gregatiuis minoribus. Ab his firmandus est ventri-
 culus per assumenda, videlicet electario de aroma-
 tibus

tibus elec. de citro, aromatico rosato, garyophylato, nardino, & emblicis conditis. Ventris imbecillitas ab intemperie sicca, curatur vti febris hectica, humectantibus, vt lacte, balneo ex decocto maluę, violę nigrę, lactuę, capitibus, & intestinis veruecum, & aliis remediis in halosi febrium à nobis præscriptis.

De ventriculi dolore. CAP. XVIII.

 Ausa calida deturbanda est sequenti portione. R. rhabarbari 3. j. s. spicę nardi gra. ij. diacatholici 3. vj. elec. rosati M. 3. ij. cum decocto prunorum tamarindorum florum, cord. liq. passarum fiat potio, quam sumat in aurora. R. vini punicorum mesorum, aquę plantag. añ. 3. iij. medullę panis furfuracei 3. ij. misceantur, mox fiat fortis expressio, quę ægrotanti exhibeatur, confestim dolorem sedat. R. syrupi acoris citri, sy. rosati simpli. añ. 3. vj. sy. de absynthio 3. j. aquarum acetosę, cichoreę, buglossę añ. 3. j. misce pro vna dosi, sed repetatur. Materia concocta expurgari debet bolo sequenti. R. medullę calami dulcis traictę per setacium 3. j. rhab. 3. j. cum saccharo fiat bolus. R. cotoneati conseruę rosarum añ. 3. j. syr. acoris citri 3. s. sy. de absynthio 3. j. misce, sumat de hac mixtura cochlear vnum ieiuno stomacho. Insuper Fauētinus cōsulit in vehemēti do

ti dolore sanguinis missionem ex vena interna lateris dextri, quæ, vt inquit, mirabilis est in forti dolore, non solum ventriculi, sed etiã omnium membrorum naturalium, forsan confert ob id, quia reuellit fluxionem à loco passo, alioqui insalubris foret, quoniam sanguis est frænum bilis. Si verò his remediis dolor non tollitur, narcotica exhibenda sunt, electarium de succo rosarum cum ℥.j. philonij romani. Aliud. ℞. sy. rosati, sy. de cichorea añ. ℥.j. s. opij granum vnum, iusculi gallinæ ℥.iij. misce, & detur ægroto. Si bilis ex hepate in vêtrem confluat, reuelli debet per sicyam in regione iocinoris adapplicatam. Ventriculus quoque firmandus est illitione sequenti. ℞. olei cytoniorũ, & rosacei añ. ℥.j. olei nenupharis ℥.s. spodij 3. j. corallorum 3. s. cæræ puræ q. s. fiat vng. huc refer vng. rosatũ M. & cæratum santalinum.

Dolor etiam fit à materia frigida, quæ apparatus medicamentis incidētibus, tenuātibus, tergentibus, veluti sunt acetũ scillinum, mel rosatũ, oxymel. Deturbatur verò, aloëticis, quales sunt pil. ex hiera simplici, & composita, elephanginæ, mastichinæ, hiera picra, diaphenico, electario indo. Intemperiem abigunt assumenda, veluti sunt aromaticum rosatum, aromaticum gary. aromat. nardinũ melicratum de citro, cōfectio de cinamomo, cōfectio ex galanga, secacul conditum, cōfectio de


z 3

zinz

zinzibere, dianifum, & huiusmodi sexcenta.

Dolor à flatibus si qua ipsos materia fouet appa-
randa, & vacuanda, dein flatus dissoluēdi primum
clementioribus temperatè calidis, vt chamæmelo,
meliloto: deinde valentioribus, vt baccis lauri, ani-
so, cumino, galanga cum vino aromatite, aut creti-
co dulci, diacumino, diagalanga, dianiso, & valen-
tiore his cōfectione ex baccis lauri. ℞. diagalangæ,
diacumini añ. 3. ij. philonij Romani 3. j. misce. fiat
bolus, sumptus sopit dolorem. Amatus narrat in-
gentem ventriculi dolorem illico sanatum vomি-
torio ex veratro: alioq; vomitorio vētriculi dolorē
à bile præsina cum febre, & anxietatibus fugauit.

De inflammatione ventriculi. CAP. XIX.

 Vratur, vt phlegmone pulmonis, &
phrenitidis. Curandi enim ratio à repel-
lentibus, & auertentibus materiam au-
spicanda est, vt sanguinis missione ex
axillari dextra, vel per sanguisugas hæmorrhoi-
dibus affixas. Mox imponitur vētriculo quæ astrin-
gunt, & reprimunt, vti ℞. olei cotoneorum ʒ. iij.
mastichę, santali albi, & rubei, rosarum añ. 3. s. cum
farina ordeï fiat emplastrum. Aliud. ℞. rosacei ʒ. j.
olei myrtini, cotoneorum añ. ʒ. s. succi plantagi-
nis 3. ij. santali rubei, mastichę bistortæ, rosarum añ.
3. j. boli armenię ʒ. j. hypocyssidis, acatiæ, sanguinis
drac.

drac. añ. ʒ. j. ceræ q. s. fiat vng. Aestus vehementia remissa vsu syruporum, medullam cassiæ nigræ cū manna, & rhabarbaro ægro offerre conducit. Si verò nihil amplius affluit, nec repelli quod in laborante particula continetur potest, solis discutientibus medicamentis vtendū, sed illis semper astringentia, partem roborantia, consocianda sunt. Si vero inflammatio resolui non potest, quod tamen est longè optatius, coquentibus est suppuranda, & vlcus vbi abscessus erumpit tergendum, siccandum, carne implendum, cicatrice tegendum. Itaq; ventriculi pus tutius expurgatur deiectione quàm vomitu. Detergunt vlcus, & siccant oxymel, aqua ordeï pota cum melle rosato, terebinthina lota sumpta. Aliud. ʒ. vini cretici ʒ. s. aquæ endiuïæ ʒ. iij. olei vitreoli guttas duasumat per sex dies continuos, quod consulit Victorius experiens vir, & doctus.

De iocinoris affectibus. CAP. XX.

HEpatis affectiones dignoscuntur ex defectu humorum atque abundantia, & ad id quod præter naturam est euersione, & colore malo, sed & ex grauitatibus ac tumoribus, & doloribus non modo his qui in eo ortum habent, verùm & ex illis qui consortij lege proueniunt, vt per aliquam difficilis respirationis,

2 4 aut

aut etiam tussis speciem, hepate etiam affecto alteratur totius corporis color. Iecoris exigui coniunctura est, si cum venarum gracilitate, & cutis decoloratione grauitas, aut tensionis dolor in dextro hypochondrio post sumptum immodicum cibum sentiatur. At hepatis magnitudo deprehenditur ex digitorum manus, venarumq; magnitudine. Item ex statura corporis ac præcordiorum magnitudine. Iecur magnum multifidumq; inest gulosis, & timidis. Iecoris fibra abscissa sanata. 6. aph. com. 18. Quidam vt narrat Agrado sanatus fuit à dysenteria, per quam portiuncula hepatis excreta apparuit in deiectionibus, quod non facile crederet Gord. Quando maxima hepatis fibra ictu ex loco dimota est, propinqua viscera vehementer dolore comprimuntur. Mirum quod affirmat Al. B. se vidisse iecoris tunicam à lue venerea totam erosam sine dolore, quum iecur non sentiat, nisi per tunicam, hepar interdum demittit in ventrem totius corporis excrementa. Non omnis bilis vomitus fit propter bilis abundantiam, sed aliquando ob eius refusionem in pyloron.

De hepatis imbecillitate. CAP. XXI.

HEpatici dicuntur quos ob iocinoris imbecillitatem morbus infestat, etiam si nulla adfuerit phlegmone, quando citra manifest

festum in viscere malum in propriis actionibus debilitatur. tunc ægrum hepaticū appellat Galenus. Quando propter solam hepatis debilitatem sanguinis effluxio contingit, tunc hepaticos vocat Aetius. Imbecillitas autem est functionis infirmitas, functio autem gemina est, propria vt sanguificatio, & communis omnibus corporis partibus, vti attractio, retentio, & expulsio.

Causa. omnis imbecillitas ab intemperie, aut meatuum ametria efficitur. Intemperies autem vel est in sola qualitate, vel cum humoribus, quibusdā in propria hepatis substantia, vel circa eius venas, & arterias contentis. At meatuum ametria sex ob causas contingere potest, nam meatus partium internarum læduntur per raritatem, osculorū coalescentiam, constipationem, compressionem, residentiam, & obstructionem.

Digno. hepatica excrementa ea nominantur, quæ ob imbecillitatem deiiciuntur, qualia sunt alui sedimina, loturæ carnis recens mactatæ similia. Crassus & niger sanguis per aluum hepaticis excernitur. Si aliud chylum deiiciat, attractricem infirmari suspicio est. Si verò in egestis recens carolota esse videtur, alteratricem vt sentit Aegineta. At si calida dyscrasia male habet, contentos assat humores, & adurit, frigida crassos, & ad fluxum contumaces reddit. Arida siccos crassosq; , humida ma

da magis tenues, aquosioresq; reddit. A calida rursus colliquationes fiunt, primū humorum, deinde etiam carnosæ hepatis substantiæ, bilisq; per ventrem euacuatur foetens, & crassa, abundeq; colorata. In frigida contra non similem egesta putorem, neque calorem, neque compagem habet. Quum verò retentrix retinere nequit, in primis cruor saniosus excernitur, postea crassus, & feculentus. Sic infirma expultrice, excrementa retineri solent. Inde q; contingit grauitas, & tensio in viscere, & corpus decolor & cacochymicum. Aliabbas ait, ex imbecillitate retētricis sarcitem oriri, quia sanguis crudus, & ante perfectam concoctionem in membra attrahitur.

Præfag. Iocinoris opus omnibus particulis per necessarium est. Qui dolore hepatis admodū conflictantur, his febris superueniens leuat dolorē. In hepate phlegmonem patiēte singultus superuenit. Quorum hepar suppuratum aduritur, si pus effluit purum, & album, euadunt: his enim pus cōclusum in membrana est. Quibus iecur calidum est, & mēseraicæ latæ, vt plurimum siccās habent deiectiones.

Metho. m. Dyscrasiæ sola alteratione sanantur, sed earum quæ dyscrasiam efficiunt causarum curatio, fit per euacuationem, vel per concoctionē: nam sæpissimè vsus optimi regiminis ad repletionem

nem & dyscrasiam adhibitus fatis sufficit. Non
omnis humor malus facit morbum. Neque omnis
medicina exitialis potest sine quantitate nocere.
Obstructio hepatis quæ ex lentis, & crassis humo-
ribus fit, apertione indiget, quæ fit per astringen-
tia, & incidentia. Sed obstructions quæ morbis
aliis succedunt, posterius curari debent. In obstru-
ctione iocinoris oportet cibo, & potu attenuare
crassitiem, & lentorem incidere, postea verò eua-
cuare per aluum, vel cum vrinis. Per ventrem qui-
dem humores qui in hepatis sima impacti sunt:
cum vrinis verò eos qui gibbis hærent. Præterea si
digerere quod in exiguis hepatis venis fæctum est
velimus, cauendum est ne venarum robur resolu-
amus topicis adhibitis laxandi vi præditis, nisi cum
his misceamus astringentia, quæ partium tenuita-
te polleant, & intro celerius ferantur, qualia sunt
cinamomum, cassia, myrrha, nardus, calamus odo-
ratus, & id genus alia. Dulcia omnia nocentissima
sunt, hepati affecto.

Auxilia. In omni hepatis intemperie seridum ac
intyborum substantia hepati commodat. Item ca-
pni succus, aut decoctum, cochlearum terrestrium
caro, hepar lupi omnibus hepatis dyscrasiis conue-
nire videntur. In causa frigida his remediis succur-
ritur, serapium de eupatorio, de agrimonia, vinum
potum in quo rubia cum mastiche elixata sit, fyr.
aceto

acetosus cum radicibus secaniabim de radicibus decoctum eupatorii, syr. de thymo, secaniabim de calamento, melicratum conditum. Apozema de radicibus Viatici. De purgātibus ex vſu ſunt pilule de rhabarbaro, hiera picra, electariū alharif. M. cōfectio alkekengi, pilulæ de turbit, pil. ſebelliæ, pil. ſtomaticæ, & aggregatiuæ. Intemperiem frigidam corrigunt ſequentia corroborantia aſſumenda, & admouēda, electarium de aromatibus, de gemmis, diaxyloaloes, diacucurma, diagalāga, aromaticum roſatum, & nardinum, emplaſtrum diaphœnicum, empl. de gallia. M. empl. de ſpico Alm. Ab intemperie, aut materia calida, ſyrupus de cichorea cum rhabarbaro, ſyr. de endiuia, ſyr. de abſynthio, decoctio de eupatorio, ſyr. de oxalide dilutus aqua cuſcutæ, & agrimonix, ſy. acetosus de pomis, acetosus tereniabim, ſy. de portulaca, ſyr. de fumaria, tro. de camphora, de ſpodio cum ſemine acetosæ, tro. de berberis, tro. de ſantalidis, conſectio diarhodon cōfectio de pſillio, diatrionſantalon. Sed de his quæ clementer purgant ſunt caſſia nigra, mel aëreum, rhabarbarum, & diarhabarbarum Viatici.

De arquato, regio' de morbo. CAP. XXII.



Hic affectus arquatus dicitur: quia ab iride nomen habet quæ mille trahit varios aduerso ſole colores. Regius etiam vocatur à ludi

ludi lasciuiā, quæ morbi remedium est, si Celso credimus, imo & Samonico sic canente.

Regius est verò signatus nomine morbus.

Molliter hic quoniam celsa curatur in aula.

Vocatur & aurigo ab auri colore Apuleio, *illegitimus* & *integros*, *illegis*, *illegisis* ve, ab Aurelio, & vocabulum sumpsit à mustula quæ iētis dicitur, & auricolores oculos habet, vt Aretæo placet, Ictinus à Galeno miluus dicitur.

Aquatorus igitur est color præter naturam totum corpus occupans. Cuius quatuor sunt differentia, luteus, viridis & niger. Albū adiunxit Hippocrates, lib. de morb. qui intus.

Causa est cacochymia cutem illiniens: hæc autem ortum habet à vitio hepatis, cystis fellis, aut lienis. Hepatis affectus ex quibus arquatus solet aduenire tres sunt, vt ait Gal. videlicet, tumor durus, inflammatio, & obstructio. Adde dyscrasiam: nam hepatis secundum naturam mutata temperie, humores vitio afficiuntur. Ex cysti intemperie, vel obstructione, eius facultas attractrix imbecillitatur, indeq; impurus sanguis remanet. Non dispariliter ex lienis imbecillitate regius morbus accidere solet. Nascitur etiam hic morbus à feruido distemperamento solidorum corporum, id quod alimenti ratione erat exhibitum, in bilem cōmutantium, veluti in pituitosum humorem, nutrimentum
ingest

ingestum in anasarca permutatur, vt sentit Paulus. Ex quo patescit quòd non omnis bilis in hepate & ventriculo gignitur. Insuper icterus fit aliquando decretoriè reponēte natura cacochymiam ad cutem. A morſu etiam ferarum ex quo sanguis corrumpitur, biliosusq; efficitur. Et ab epoto veneno. Plurimi quoque oppilationes in venis habentium colorem habent citrinum, quoniam sanguis per foramina sua ad cutis superficiem non accedit, vt loquitur Auicen. Ex quibus liquet quòd non semper in arquato locus affectus est iecur. Contingit etiam icterus interdum ob crurum vlcera occlusa, teste Amato.

N.

Digno. Mutatio coloris primò, & magis apparet in oculis, & plantarum talis, vel venis quæ sub lingua sunt. Cur potius oculos tingat icterus, explicat Oribasius 4. apho. com. 6 2. Itaque hepatis dyscrasiæ, inflammationis, obstructionis & scirrhi notas require in sequentibus, vel potius 5. de loc. aff. Vesicæ fellis vel ipsius meatuū imbecillitas ostenditur ex albis deiectionibus. Obstructio verò cum ex his, tum ex grauitate præcordiorum dextræ partis. Si ob splenis vitia incidit hoc malum, color nigrior subsequetur, ita vt putaretur flaua bilis fuligini esse permista. At si nullum ex commemoratis adsit, & arquatus non vniuersus, sed paulatim procreatur, ex calida solidarum partium intemperie

rie nascetur.

Præfagia. quibus per febres regius morbus ante septimum accidit, letale. huic Hippocratis sententiæ reclamare videtur Auēzoar, similiter, & Auerrhois, cum ipsa experientia. At quibus die septimo, aut nono, aut decimo quarto acciderit, bono est, nisi ilium dextrum obduruerit. Arquatis iecur affici durum, male est. Qui regio morbo laborant, hi non admodum inflantur. IctERICI quicquid vidēt, id pallere arbitrantur, nō tamen semper, sed quando humor inter crystaloidem, & rhagoidem medius, colorem mutarit. Seniores rarò icterici fiunt. Quando icterus inueterauerit cachexiam, aut hydropa facit, quod obseruauit Gariopontus. Icteria curabilis an sit Concoregij experimentum docet.

Meth. m. Huiusmodi symptoma nullam seorsum curationem exigit, utpote cum affectu vnde nascitur vnà cessans. Nihil est aptius phlebotomia in dolore viscerum, ut ait Galen. Item debiliora, inquit, cathartica fortassis non conferunt, eò quòd non curantur faciliter icterici propter ventris siccitatem. Rursus prætermittere ait quòd iuuatium propter gustum, ingenerosum est, sicut & assumere quod nocuum propter delectationem, nefandum. Repletio, & indigentia ictericis sunt pessimæ, prior propter cruditates & obstructions, hæc verò quia biliosiores succos reddit. Ictericos purgare oportet
omni

^{*}
affici

⁺
Icteria

N.

omni modo, quo possimus, per vomitum, deiectiones, vrinam, sudores atque adeò per palatum & nares, ex Gale. Moses. Item non possum, inquit, numerare quot ictericos liberaui per fluxum ventris tantum. Aurelianus tamen vitandam probat frequentem & variam medicaminum potationem, quæ fellea deducere promittuntur, siue vètriflua, siue vrinalia. In ictero duo maxima remedia, sectio venæ, & purgatio, & vtraque repetita. A phlebotomia, inquit Aetius, clyster assumitur, qui propter sæcum euacuationem spirandi facilitatem inducit, intestinaq; irritando humores à cute retrahit, & reuellit. Quibus citra febrem regius morbus accidit, ⁺urgente in dextra præcordiorum parte grauitatis cuiusdam sensu, his omnibus aperire obstructions conuenit cibus, & potibus & medicamentis extenuantibus, deinde cholagogum exhibere, sicq; plurimos vna die sanitati restituit Gale. qui verò purgatione liberari non potuerunt, his rursus valètiore ad aperiendum data potione, pharmacum quod vehemētius purgaret, exhibuit, sic deinde sub fine purgationis vel cerulea, vel flaua etiam bilis, cum acri mordacitate secernebatur.

Cur suffusis bile intueri lutea præcipiunt? vt crumpentibus papulis rubra. An quod rerum lutearum cōspectu, bilem flauam regij morbi parentem, non aliter quàm rubrorū obiectu sanguinem cieri

cieri volunt, & ad summam cutem elici, euocatum
exteriori faciliè discuti.

Remedia sunt syr. de scolopendria Tusignanæ
de cichoreo Salyceti, decoctum prassij eiusdē, syr.
de fumaria minor, sy. de eupatorio, syr. rosatus cum
rhabarbaro, & agarico. De purgātibus salubria sunt
cassia nigra, rhabarbarum, agaricus, electarium de
psyllio, rosatum, & confectio raved seni. M. pilulæ
indē de fumote, confectio de eupatorio, & de fu-
maria. Tro. diarhodon, de rosis, de camphora, de
lacca, diatriasantalum, diarhodon. Decoctio prassij,
& decoctum rhabarbari Salyceti, decoctio pilosel-
læ Concoregij. ℞. pul. diarrhodij 3. j. s. rhabarbari
3. s. spicæ 3. s. rasuræ eboris, & cornus cerui añ. 3.
j. foliorum saluæ vitæ 3. ij. fiat puluis, sumat 3. j. ex
vino albo, aliquot diebus ieiunus, à purgatione.
℞. rubiæ tinctorum 3. s. cum succo limonum fiant
pilulæ iij. Decoctio pilosellæ sanat omnes ictericos,
teste Nicolo. ℞. cineris intestinorum terre 3. j. cum
syrupo bisantino, formētur pilulæ, quas à purgatio-
ne æger deglutiat. vel ℞. cineris prædicti 3. j. sac-
chari q. s. ad bonum gustum, quod Gal. probat lib.
de ther. ad Pisonem. ℞. euphorbij puluerati 3. s.
sumat cum ouo sorbili, sanat auriginem inuetera-
tam ex opilatione hepatis, & splenis, vt ait Plato.
Idem præstat puluis Valesci ex aloë, myrrha, &
croco. Myrep. commendat puluerem radicis an-
chusæ,

To. III. Lib. I.

A

chusæ,

chusæ, eius cochlearia duo pota. Item decoctum ramorum rubri diebus septem mane potum. Ictericos feliciter expurgat sulfur cum ouo sumptum, teste Galen. ℞. sulfuris, vini exagium vnum, salis communis exagium semis, da comedenda ieiunis cum ouis sorbilibus, ut iubet Myrep. Oleū de caramo illitū ictericis confert. Ad hepatis duriciem cum ictericia. ℞. rosacei ℥. j. s. succi cymarum absinthij, olei nardini, mastichæ añ. ℥. s. pulueris schœnanti, spodij, cassiæ lignæ, hypuris, añ. 3. ij. ceræ puræ q. s. fiat vnguentum pro iocinore.

De hepatis obstructionibus. CAP. XXIII.

Obstrectio vel in venis simarum partium, vel gibbarum consistit, sed crassorum humorū obstructiones fiunt, inter simas & gibbas hepatis partes. Certè iecur obstruitur in poris suis, vel in meatibus per quos expurgatur sanguis à suis superfluitatibus, vel in vasis aliis. Sed vasorum obstructio nunquam integra fit, quin aliquid penetrare possit, quod penetrare debet, licet fortasse id tenuius, & subtilius sit, quod penetrat.

Causa est abundantia succi, & materiæ, vel crassities & lentitia. Addit Aëtius flatus nebulosos & concoctu difficiles. Obstruuntur etiam viscera si quis cibum post exercitium adhuc anhelans, accipiat,

piat, vel si à cibo vehementer exerceatur. Obstructionis fit à materia humoralis, & tensio à flatulenta, vt ait Bertucius.

Digno. hepar dolet ob obstructionem, mediocriter tamen, & cum quodam ponderis sensu. Si grauitas, distentio, dolorq; dextra parte sub præcordiis sentiatur, nullo substantiæ tumore, nulla febri vrgēte, venarum significatur obstructio. Quum vaporosi & crassi flatus multitudo coaceruatur, quæ exitum non habet, non grauitatis solum, sed distentionis sensus oboritur. Si à crassis & viscidis humoribus obstructio fiat, consequitur grauitatis cum dolore sensus, aliquando obtusæ, aliquando etiam vehementis, & quandoque absque febri, quandoque cum febri. Insuper de obstructionis indicibus sunt difficultas anhelitus, color faciei malus, vrina tenuis. Simæ deiectio humida, gibbi sicca vtriusque deiectio partim humida, partim sicca ex Auic. & Grad.

Præfag. obstructio est affectus partium instrumentariarum. obstructionibus iccur assiduæ corripitur.

Metho. m. Obstructionum alia est ex abundantia, alia quæ ex qualitate succorum incidit, qui aut lenti aut crassi sunt, præferetur inter remedia, in ea, quam copia facit sanguinis missio, in ea quæ ex humorum qualitate consistit, attenuantium vsus.

A

2

Ob

Obstructioni opponitur *ελεφασ*, id est, reclusio, sed obstructa non sunt aperienda prius quàm plenitudo euacuetur. Quæ verò obstruunt per aluum, vrinam, & sudores, ea euacuare tentandum, modò dissecta deterfaq; sint. Idq; medicamentis quoad licet minime calefacientibus. Ad crassos, & lentos humores conueniunt incidentia, & abstergentia: at quæ ex morbis aliis succedit obstructio, posterius curari debet. Omni causæ competit attenuatoria victus ratio. i. de tuenda sanit. Ergo humores crassi, & lenti extenuantibus, & incidentibus maturantur, quod vir doctus videtur negare Baccanelus. Obstructio in sima per ventrem deturbanda est, at quæ in gibba est cum vrinis educitur. Quum digerere quod in hepatis exiguis venis factum est, velimus, cauendum ne venarum robur resoluatur, topicis adhibitis laxandi vi præditis, nisi cum his misceamus astringentia, quæ partium tenuitate polleant, & intro celerius ferantur, qualia sunt aromata, vt cinamomum, cassia, nardus, myrrha, calamus odoratus, & id genus alia. Obstructiones reserant quæcunque vel esculenta vel medicamenta attenuantia sunt, easq; soluunt remedia quæ deterforia facultate sunt prædita.

Itaque de remediis assumendis sunt serum lactis, apium, cuscuta, endiuia, hepatica, solanū, plantago, malua, amygdala amara, pistacia, semina maiora frigida,

gida, sy. rosatus cum rhabarbaro, & agarico, sy. acetosus de radicibus, sy. diarhodon, sy. de eupatorio, de fumaria, de squinanto Viatici, sy. adiantinus, decoctio radicum Ali. de fumo terræ, de eupatorio, diarhabarbarum, pilulæ de rauet, pilulæ ad oppilationes M. & pul. radiceis rubiæ tinctorum ℥.j. cum succo limonum fiant pilulæ, sumat. iij. ieiuno stomacho, à purgatione. Semina milij solis commansa opitulantur. Cōfectio de seminibus M. vtilis est.

De iocinoris inflammatione. CAP. XXIIII.

Inflammatiō est magna vel exigua, in parte carnosa vel in tunica, aut vasis, in sima parte vel gibba. In neutra tamen partium hepatis inflammatiō exquisitè distincta potest consistere, quoniam omnium partium carnes inter sese continuantur: sic cauo hepatis phlegmone obfesso, protinus etiam venas quæ in mesenterio sunt, vna phlegmone laborare est necesse, quum ex vena portæ exoriantur.

Digno. hepatis vehemens dolor fit propter inflammationem, vel propter spiritum flatulentum: sed dolor à spiritu efficitur absque febris. Contra ex hepatis phlegmone necessario febris adest, imò ardens. Hepatis dolor vicina corpora ad consensum inducit, nam & ad iugulum vsq. producitur, & spirandi difficultatem creberrimè affert. Interdumq;

A 3

tulsim

tulsiſſim ac dyſenteriam, neque rarò nothas coſtas infeſtat. Diſcernitur autem hepatis inflammatio à pleuritide, ex alui ſedimentis, ex pulſu, ex linguæ, & vniuerſi corporis colore. Color enim alteratur vbi hepar vitiatum eſt. Inflammatio in gibba grandis ſolo tactu facile dignoſci poteſt, præſertim in his, quibus à natura vel à morbo abdomen extenuatū habent. Soli hepati proprium eſt, vt tumoris tumulum comprehenſim habeat circunſcriptum, muſculus non item, ſed inflammationis ipſius moles ſenſim diminui conſuevit.

Præſag. hepatis connexa pars maius habet annexum periculum. In hepatis inflammatione ſingultus malum. Ventris fluor mortalis. Si hepatis morbus in morbum lienis permutetur, bono eſt: malo autem, ſi contrarium eueniat. Iecoris inferiora membra ſi phlegmone corripiantur, intereunt quàm pauciſſimi. Quæ iecoris, aut ventriculi occasione eueniunt febres, ſunt omnium vehementiſſimæ, & magna ex parte in tabem tranſmutantur. Iocinoris inflammatio ſoluitur ſanguinis è naribus fluxu, è nare dextra, iuuat & ſudor bonus. Connexæ partes patientes eadem hæmorrhagia, ſudoribus, copioſiſq; vrinis ſanantur, ſic cauæ partes affectæ liberantur excremētis bilioſis, ſudoribus, nonnunquam verò & vomitibus.

Met ho. m. pariter tum reuellendus tum educendus

duis qui ad inflammationem fluit sanguis, interna in dextro cubito secta vena, ob id quod & è directo, & ampla via cum vena caua societatem habet, hac non apparente, media secanda, quod si nec illa se ostenderit, humeralis incidenda venit. Venæ secandæ electio à parte laborante indicatur. In vniuersum autem quàm longissime à tentata fluxione parte, quod redundat reuellere conuenit. Vacuationis autem modus ex redundantix modo, ætate, natura, anni tempore, regione, consuetudineq; atque ante hæc, ipsa laborantis virtute inuenies.

Remedia. Epithemata conueniunt repellentia ex aquis rosarum, plantaginis, solani cum fantalis, & camphura, vel cū puluere diatriasantali. Inunctiones vtilēs sunt ex oleo rosacco & cotoneorum. De assumēdis etiam repellunt, & materiam apparant, serapium rosatum, aliud ex succo oxalidis, de cytoneis, cum aquis plantaginis, acetosæ, adianti. Salubris quoque purgatio, quæ fit per ea quæ blandè soluant, nec trahunt à remotis, qualia sunt atramentum calami dulcis, manna, rhabarbarum. Est etiam in cibo medicamentum præstantissimum, vt docet Hippocrates, & tale exhibetur ne trahat à remotis, vt inquit Agarbo. Huc pertinet quod etiam alibi Hippocrates attractorias exhiberi sorbitiones in causo maligno iussit, id est, vt sorbitiones attrahenti pharmaco misceamus, qui modus nō so-

lūm in causo, sed etiam in pestilenti febre à Brudo commēdatur. Ab his ad phlegmones euaporatiōnem digerentibus vtendum, mixtis tamen stypticis, vt absinthio pontico, rosis, scœnantho, spicanardi cum chamæmelo, meliloto, anetho, ibisco, ex quibus efficitur decoctum ad fouendum, vel cataplasma additis oleis lini, chamæmeli, anethini, & absinthij. Postremò victus tenuis esse debet: quia morbus acutus, & refrigerans: nam contrarius in morbo victus. Victu est opus qui meatus aperiat detergatq; citra rosionem, sitq; omnis tenacitatis expers, vt est ptisana, cremor hordei, & loco oxymellis quo vtebātur antiqui syrupus rosaceus simplex, vel acetatus simplex aqua intybi vel plantaginis mixtus. Mulsæ & dulcia omnia nocentissima hepatis affecto, vt asserit Gal.

De scirrho iocinoris.

CAP. XXV.

IEcur & lien ad scirrhos membra sunt opportunissima. Nam hepatis substantia naturaliter lutosum quippiam continet. Lienis verò substantia tametsi rarior sit, crebrius tamen scirrhosis vitiis affligitur, quòd crasso nutritur sanguine qui veluti limus est, facillimeq; nigra bilis efficitur.

Causa externa, vsus lentorum crassorumq; ciborum nimius, inepta visceris curatio. Interna verò
est

est glutinosus, aut crassus, humor, tenacissimè partibus induratis in fixo. Interdum ab initio concretum atque augetur paulatim, sed crebrius ob ineptam curationem gignitur.

Digno. in extenuatis tactu facilius depræhenditur, attractu temporis non facilè fuerit per tactum ipsum cognoscere, intercipiēte iudicium aqua inter cutem, quæ illico scirrhum sequi solet.

Prælag. scirrhum hepatis ab initio sanauit Gale. vbi verò ad plures dies esset extensus, neque ipse potuit, neque alium vidit, qui posset sanare. Inueteratus omnino non curatur: quia tam vehemens medicamentum, quod affectus efflagitat, iecur ferre non potest, vt cuius vehementia partis robur vniuerso corpori maximè necessarium soluat.

Metho. m. hepar non sustinet vt lien vehementia medicamenta. Curandi eius communis indicatio est, vt quod præter naturam in particula est, totum vacuetur: modus tamen vacuationis eius proprius est, nam detergere id vbi contumaciter inheret, oportebit, non his quæ vehementer calfaciunt, & siccant, sed tantum sunt admouenda, quæ molliendo digerere possunt. Si multus & crudus sit succus, ratio victus tenuis conuenit: si verò copiarum crassitudinis, aut lentoris vitio meatus obstructi sint, attenuatoria victus ratio erit ex usu.

Inter remedia numeratur sanguinis missio ex

A 5

inter

interna, & post tres dies hæmorrhoidum apertio,
à leui præcedente purgatione. Salubria sunt sera-
pia de endiuia, de cichorea, sy. bifantinus, acetosus
diarrhodon, sy. de eupatorio, syr. diachylon Arnal.
sy. de virad. cū aquis cuscute, lupuli, piloselæ, agri-
monia, purgatur materia apparata diluto rhabar-
bari, & agarici tro. cum diacatholico, vel diamana,
diasene, vel ex decocto fumariæ, aut eupatorii, aut
epithymi, vel pilulis de rhabarbaro, vel istis quæ re-
cipiunt, rhabarbari, agarici tro. añ. 3. s. cum sy. en-
diuie formetur pil. v. sumat post primum somnum.

De aperientibus, & roborantibus sunt conser-
ua florum sambuci ex sero caprino pota, vel mane
sumpta. R. oxymellis scillini ʒ. j. sy. de endiuia ʒ. s.
aquæ cichoreæ, cuscute, absinthij añ. ʒ. j. cum spo-
dio, & squinato sumat omni mane, & de tertio in
tertium addatur syrupo rhabarbarum. Item aduer-
sus hunc affectum efficacia sunt diarrhodū, diatria-
fantalū, dialaca, diacucurma, diacalaminthes, elec.
de fisticis, electarium de eupatorio, & de squina-
to, elec. opilatorū Clemētini, tro. de spodio, de rha-
barbaro, tro. diarrhodon, tro. de rosis, & eupatorio.
cum sy. bifantino formentur pilulæ, quas æger de-
glutiat ieiunus. Purgantia, & aperientia sunt pilulæ
de rha. de eupatorio, imperiales. vel R. agarici tro.
3. s. rhab. 3. ij. tro. diarrhodon ʒ. ij. mastichæ ʒ. j. cū
syrupo de endiuia fiant pilulæ. vel R. pul. tro. de ro-
sis,

sis, & cupat. 3. j. tro. de rhab. 3. s. tamarindorum 3. iij. rha. 3. iij. mastichæ 3. s. cum sy. end. & de eupa. formentur pilulæ y. pro 3. purgans, aperiens, & roborans. R. diarrhodij Abbatis tabulati 3. iij. rhab. 3. ij. cum syr. de cichorea fiat electarium, sumat 3. iij. ieiuno stomacho, & interdum additur 3. j. diatriasantali.

De topicis conferunt emplastrum diachylon, & de meliloto, ceratū œsopi, ceratum Filagrij, & Pauli. vel R. ammoniaci 3. s. bdelli 3. j. emplastri de mucilaginibus simplicis 3. iij. radice rubiæ tinc. spicæ nardi, sem. leuistici, se. cichoreæ añ. 3. ij. meliloti 3. iij. solue gummi in aceto acerrimo, & bulliāt cum liquore sequēti. R. vini albi lib. s. olei de fisti- cis, vel nardini, vel de absinthio 3. iij. & cum 3. j. ceræ albæ fiat ceratum: emollit, & digerit obstru- ctiones, & scirrhosos affectus iocinoris.

*De cachexia, seu cachectia. inde cachecti, & ca-
chectici.*

CAP. XXVI.

KAchexia est malus corporis habitus, ex etymo. est species tabis, Celso. dicitur etiam de apostemate vëtofo, apud Auicē. 2. primi. hydropicorum caput est, vt definit Paulus, vel hydropismi antecedens cau- sa, vt ait Aurel. & Auicē.

Causa. cachexia per proprium hepatis morbum
effic

⁺
caloris

efficitur, vel quod id per consensum afficiatur, maximè verò vitio splenis, pulmonum, & vteri. Cogitationis etiam mentisq; segnitia, ac animus deses, decoloratos atque ex atrophia graciles, ob naturalis coloris imbecillitatem reddunt. Itaque ex caloris natui infirmitate, alteratrix facultas cibum ne minimum quidem mutat, aut tardè concoquit, vel deprauat, aut corrumpit, hinc ortum habet sanguificatio abolita, debilis, deprauata.

Digno. quemadmodum se habet nutrimentum id est, sanguis, ita & exteriora, hoc est, color corporis. 6. epi. color enim similis efflorescit humoribus, si non ingurgitauerit, vniuersa corporis miscella laxior est, ac mollescit, corpus totum cum virore albicans inualidum est, incidit interdum oedema crurum, & pedum.

Prælag. si ventris torpedio, id est, concoctionis imbecillitas fuerit, vniuersorum fit turbatio, vasorum immunditia, cerebri diminutio, propterea caluitium, & instrumentorum attritio, seu senectus. 6. epi. Capiuntur cachexia maximè senes, qui etiā maximè liberantur. Imo & pueri qui facile pereunt, propter vitalis firmitatis debilitatem, & quod ob cutis raritatem succi in eis facile transpirant, at qui in vigore sunt, rarò incidunt, & facile se inde extricant, vt scribit Aëtius, sed fallitur: quia infantes vel teste Galeno, cæteris ætatibus præstant in functione

Actij
lapsus.

tionibus naturalibus, ergo non periclitantur ob vitalis firmitatis debilitatem, sed potius quod in cachexiam incidunt, à fortiori causa. Nec cutis rara in pueris est, quod demonstrat Galen. 1. simpli. & 2. de temp.

Metho. m. cachexia quum sit in genere symptomatum, quæ in affectibus consistunt, eius sanatio efficientis causæ abolitio est. Diæta qua vires refoecillantur, seu vires reparans, in moderatis deambulationibus cōsistit, gestationibus, vociferationibus, & defecationibus per linteola ex lino crudo, deinde per inunctionē ex oleo, cui humorem resiccantia sint infarta, veluti nitrum & sales, postea & exercitamenta moderata conducunt. Victus attenuans videtur magis causis aduersari, sicq; magis ex usu esse. Cæterum pituitosum corporis habitum, hepatis, & viscerum obstructions plerunque excipiunt. Proinde in his Galen. secutus Aesculapium motus excitare ex rationali, animosa, & appetitoria animæ parte consulit.

Remedia purgantia. hiera simplex, pilulæ de eupatorio pilulæ ex aloë, & mastiche cum succo absinthij formate, pilulæ de rhab. pil. alchechēgi M. Mirabiliter ipsos iunat, inquit Aetius, assidua absinthij delibatio, & adhibiti dropaces. Absinthium tamen contentam in ventre pituitam nihil adiuuat. Betonica pota colorem plumbeum corporis, priuatim

uatim emendat, flores sambuci in vmbra exsiccati, & cum saccharo conditi sunt efficaces contra omnia vitia hepatis, præcipuè contra obstructiones. Ad emphrasim hepatis, & splenis à causa frigida, & rugitum, & flatus intestinorum. R. sem. ocy-mi, amomi, mastiche, anethi, cari añ. 3. ij. pista simul lixentur in aqua: sumat 3. iij. de colatura cum saccharo. huc refer, sy. acetosum diarrhodon, sy. de eupatoreo M. de squinanto Viatici, electarium de gemmis, de xyloaloes, de eupatorio, dialaca diacurcuma, confectionem de raued seni, conditum de buglossa, confectio alchechengi. tro. diarrhodon, de rosis, de rhab. de eupatorio M. de berberis Viatici. R. limaturę chalybis preparatę 3. s. cinamomi vel pul. aromatici rosati 3. s. sacchari rosati solidi 3. s. fiat puluis, pro vna dosi, vel pro duabus, da quotidie ieiuno. Aliud scorix ferri preparatę 3. iij. cinamomi 3. j. salis gemmę grana. iij. da bis in septimana cum momento vini albi. Aliud. anisi feniculi, zinz. cinamomi añ. 3. j. scorix ferri preparatę 3. ij. sacchari q. f. Decoctum corticis radicis tamarisci agrestis cum passulis potum aliquot diebus etiam curat lepram quę fit vitio splenis, vt asserit Pand. sunt qui ad eachexiam splenicam aqua stillatitia vtuntur, quę paratur ad hunc modum. R. ramentorum hagioxyli lib. s. corticū radicum capparorū, ramarisci, ceterac, añ. m. j. radicis lapati
acu

acuti 3.j. s. conferuæ ros. borrag. bugla. añ. 3. s. nucis moschate, gary. añ. 3.j. cinamomi 3.ij. aque fontis, vini albi añ. lib. iij. macerentur 24. horis, postea extillentur, vtatur hoc liquore per 5. horas ante prandium.

De hydropisi, seu hydropismo. CAP. XXVII.

Ἰδρωψ est triplex, vnus replet totam ventris regionem colluue quadā humidæ & tenuis substantiæ, ascitesq; dicitur. Alter totum corporis habitum pituitosa replet humiditate, atque hic anasarca, & hypofarcidium vocatur. Tertia species, cui nomen est tympaniæ, regionem ventris flatu implet, ἀσκιτις ab ἀσκῶ, id est, vtire nomen habet. eius materia, vt dictum est, humor aquosus, vel ingens humoris cum perexiguo spiritu. λευκοφλεγμαντίας hyderos à causa putata nomen retinet, dici etiam solet ὑποσαγκιδίος seu ὑποσαρκῆς, λεῖτασάρκης, ἀνασάρκης. solaq; intercus est, ex etymo, vt sentit Aurel. eius materia pituita, quæ si per vniuersum corpus increuerit, eam leucophlegmantia comitatur. A pituita alba sarcites subtercusve superuenit. Sunt qui leucophlegmantiam in anasarcam, & hypofarcam diuidunt. Salernitani contra, autorq; Passionarij hypofarcam à leucophlegmantia separāt, dicentes quòd in illa maior flatus copia quàm phlegmat

gmatis est. In hac verò pituitæ maior quantitas, sed spiritus abundantia minor existit. *tympanitis* seu tympania, tympanias' ve dicitur, quia hypogastrii compulsum sonitum edit, cuiusmodi tympana solent, eius materia flatuosus aër, seu multitudo spiritus cum exiguo aquoso humore. At spiritum flatulentum gignit insitus calor imbecillus, parumq; validus, ex cibis, & humoribus qui lente excalfiant, & in vaporem resoliuntur, est enim vapor humor extenuatus. Austrino aëri similis est flatuosus spiritus.

Causa, hydropum omnium generatio communis, fit sanguificationis opere intercidēte, seu quum sanguinis generatio intermittitur, hoc est, ob vitiū vel defectum sanguificationis incidit. Idcirco fieri nō potest, nisi hepar refrigeretur. Refrigeratur autem ab affectione propria, aut per consensum ventriculi, lienis, intestinorum omnium, & præcipue ieiuni, meseraicarum, pulmonum, diaphragmatis, renum. Item per calidā, & siccam dyscrasiam quæ per morbos acutos incidit, hepar ita imbecillum redditur, ut chylum nequeat in sanguinem mutare, sicq; frigescit. Affectio propria fieri potest à causa externa, & interna, veluti ab intempestiva frigida potione, & imodica sanguinis, & cum eo spiritus vitalis, & caloris vacuatione. Nec solum ex insueta, & immodica hæmorrhoidum vel mēsum
 profu

profusione, sed etiam ex diuturna earum suppressione. Vnde calor iocinoris à crassi & frigidi sanguinis fursum regurgitatis copia suffocatur. A scirrho, & valida obstructione hydrops. Idem contingit ab eliquatione, & ab expultricis potētiae offensa, & ex orthopnoea apud Aetiū. Hyderus siue ascites à maiore frigiditate fit, quàm tympanias, humida enim substantia in flatuosum aërem sine calore non potest transmutari.

Digno. color qui per hepatis affectus apparet in vniuerso corpore, doctum medicum fallere non potest. Intumescere pedes in omni hydropisi commune est. In hydero tumor grauior est, tibiasq; , & pedes occupat. In tympania leuior, sed tensio plurima, nullus tumor nisi in ventre cernitur, extreme corporis partes alimenti penuria marcescunt, seu aridæ fiunt: percussio ventre sentitur sonus vtris flatu, & non aqua pleni. Humor sit an spiritus qui in regionibus ventris continetur, nō possumus tactu explorare, nisi cauata pressu cute, & pulsare cogimur abdomen, & ægrotum in latera conuertere: ferè enim in totū plurimi ex hydropicis febriunt, & sitiunt, maximè qui ascite laborant: quia humor in locis detinetur falsus, & putrefactus. Sitis inexplata in tanta aquarum mole Tātali more ægrum excruciat. An quia humor qui in locis detinetur falsus est, & inde vapores ventris exsiccat? An ve-

rò sitiunt, quia corpus alimento idoneo humectatur. In sarcite totum corpus intumescit, ceu corpus sit impinguat, præcipuè facies, cum pituita tantum sit plenum, sine ventris tumore, ob id albicat. Appressus cuius parti digitus vestigium relinquit. Adiunctionis, & agglutinationis differentiam prodit anasarca. Hydrops à tumore iocinoris orti arida tussi, deiectionumq; paucitate, & duritie distinguuntur à cæteris.

Prælagia. hydrops ex acuto morbo periculosus, numeratur inter morbos autumnales, febrē lenem & nō longam facit, sarcites ineuitabilis. tympanias multa eaq; bona fortuna indiget, testimonio Hipp. Tympania secundum Oribasium aliis hydropibus minor est, sed Auerrhoi est specierum hydropismi deterrima, cui suffragari videtur Aëtius, tympanias inquiens est omnino periculosus, minus eo ascites: quia remediis promptius obedit. Adde quòd alteratrix facultas magis aberrat à scopo in tympania quàm in hydero. vide Con. differentia 102. Ascite detentus si aqua per venas in ventrem defluerit, morbo soluetur. Quibus iecur aqua repletum in omentum erumpit, his iecur aqua impletur, atque ita moriuntur, hydropicis tamen aqua colligitur inter peritonæum, & epigastrium teste Galen. vel inter omentum seu intestina, & peritonæum transfunditur, & aliquando inter abdomen, & peritonæum,

næum, hydropicis si superueniat tussis, ipsius morbi ratione signum est exitiale. A furore hydros bonum. Hydropicorum vlcera difficulter sanantur. Vbi peius habent ægri vsq; ad femora tumor producitur, quādo sanè ex ascite, & sarcite hydropum complexus factus apparet. Anasarca hydrops pessimus dicitur: quia in eo totus permutatur homo, cuius nulla pars ei inest noxa carens, est tamen curabilis apud Aëtium, nam qui alba pituita detinētur, si fortis ventris fluxus superuenerit, à morbo liberantur, vt Hippo. dixit.

Metho. m. Curatio fit per remedia causam efficientem tollentia, & hepar roborantia, & ex Galeni sententia ad tres reducitur intentiones, nempe vt visceris malum sanemus, & apponamus ea quæ humiditatem dissoluunt, & propinemus medicamenta, quæ mouēt vrinas. Ascites curatur per purgantia aquositatem, & per epithemata eorum quæ vim habent ciendi vrinam, & in vapores soluendi, humorem talem: nam hyderum habentem si per venas humor aquosus in ventriculum vesicam'ue defluat, hominem liberat. Quæ in ascite continetur aqua aliena à corporis substātia tota natura est, cuius euacuationem vel medicamentis quæ digerant molimur, vel chirurgia adhibita punctione. In ascite *παρὰ τὸν ὄμφαλον* sunt magis in vsu, quàm vstiones, hydropicos paululum supra vmbilicum pun-

B 2

gunt

gunt Chirurghi, ferro quod myrsem vocant, vt docet Herod. & Paul. In paracentesi cauere oportet vniuersam euacuationem: non potest enim simul, & confertim vacuari absque animi deliquio. An congruat, & salubris punctio sit, Aurel. disputat, & Conc. differētia 199. Fissuræ circa internū talum factæ conducunt, & in scorto tumefacto, scemoribus, pudēdis, & locis supra manuum iuncturas, sed Hippo. non supra talos adhibet chirurgiam, sed iuxta scortum, & scemora. Non dispariiliter causam effectricem excindere oportet, iecurq; roborare in tympania, & anasarca. Omniumq; inflationū communis indicatio est, vt quod præter naturam est, vacuetur, in quocunque id contineatur, propria verò vt tenuissimis, & calidis potestate medicamenti huius digestio fiat. In ascite, inquit Razes, roborare oportet hepar. In tympania ventrem, in hypofarca verò omnia membra.

Tympanias primæ digestionis vitio fit, & ventositatis resolutione curatur.

Ascites secundæ digestionis vitio fit, & aquæ educatione curatur.

Anasarca tertiæ digestionis vitio fit, & educatione vrinæ ac feri curatur.

Remedia ad ascitem præcipua sunt hydragoga sequentia. R. succi radicum ireos depurati ℥.j. vel ℥.j. s. sumat omni mane vel alternis diebus, cum
sacc

faccharo vel ouo forbili, succus coctus est sine effi-
 cacia, vt ait Gordo. Vel ℞. succi ireos ℥.ij. mellis ro-
 sati colati ℥.j. sumat ieiuno stomacho. vel ℞. succi
 ireos, mellis, aquæ añ. ℥.s. coquatur simul & parū,
 & detur ante diem. Clem. Vel ex succo decocto cū
 melle vel faccharo fiat syrupus, vt monet Nicolus.
 ℞. radicis ireos mundatæ, & per tyrocnestim traie-
 ctæ ℥.s. zinziberis ℥.s. mellis q. s. ad spissitudinē,
 sumptum sine dolore purgat, teste Amato. Succum
 iridis nostratis misce cum vitello oui effuso albu-
 mine, modicè ad cineres calfactum, da pro hausto
 mane. Euony. ℞. syr. de cichorea cum rhabarbaro
 ℥.j. syr. de v. radicibus ℥.s. rhabar. puluerati ℥.j. cū
 decocto passul. anisi & soldanæ fiat potio. Vel ℞.
 soldanæ ℥.j. succi ireos ℥.x. syr. de v. radicibus, lib. j.
 cum aqua endiuia, & fœniculi, fiat syr. longus, dosis
 ab ℥.ij. vsque ad tres. Vel sumat quotidie succi so-
 lani hortensis cyathum vnum. Aliud. pul. radicum
 cucumeris syl. ℥.j. per triduum macerato in vino
 astringēte, dato tribus diebus, molliter aquam sub-
 ducit, neque stomachum lædit, & vires seruat. My-
 rep. Aliud. succorū radicis ireos, & morellę depura-
 torū añ. lib. s. datur ℥.j. alternis diebus, solatri enim
 succus hydragogum est Rosario, Serapioni, & Ali.
 Item hydragogus est syr. rosatus cartharticus, mel
 rosatum confectum ex floribus persicæ arboris.
 Succus radicis palmæ Christi non minus purgat
 B 3 serum,

serum, quàm succus radicis ireos, & non vrit gul-
lam, vt inquit Nicolus, dosis depurati est ab ℥.s.
vsque ad vnam. Succus plantaginis coctus hydra-
gogus est, Plateario, & Brissienfi. Aquam trahit fa-
rine foliorum salicis 3.j. ex iure pota singulis diebus
Al.B. idem præstat farina foliorum saluæ vitæ. Ra-
dix cucumeris syl. pota educit serum absque noxa,
dosis 3.s. electarium instar ciceris sumptum ex vi-
no decoctionis rhab. & mellis: vel fiant pilulæ cla-
terij 3.j. rhab. 3.j. misce. ℞. se. ebuli puluerati 3.iiij.
cum vino albo fiat potio. soluit serū citra noxam.
℞. oxymellis compositi 3.ij. rhabarbari 3.j. ex vino
albo fiat potio, quamumat frequenter, vel quoti-
die, aut alternis diebus. sanat ascitem, icterum, &
omnem hepatis obstructionem sine febris. Aqua
cuscute sumpta cum sy. acetoso, laxat serum, vrinā
prouocat, obstructions aperit, hepar & ventricu-
lum roborat in causa calida. Aqua florum genistæ
pota omni mane ad ℥.v. ab ascite sanauit senem
quendam Genuensem. Ad ascitem ab occasione
frigida Nicolus præscribit aquæ præsij 3.iiij. mane
assumendæ, & 3.ij. ante cœnam, & de quarto in
quartum ex succo ireos hominē purgat, sicq; breui
sanitati restituit. Confectio alkekengi M. bis in
mense sumpta ab hydrope liberat.

Ea quæ vim habent ciendi vrinam partim ad-
mouentur partim verò assumuntur, succus è granis
vesica

vesicariæ expressus, & in vmbra siccatus vrinam potus cit. vt ait Agricola. Granum vnum grili vsti, & triti potum idem præstat, teste Acaliaco. Notatur audax in datione cantharidum ab Hipp. 4. r. a. Item ad prolectandas vrinas. ℞. feri caprini ℥. iij. spicæ nardi 3. ij. bulliant leniter ad consumptionē tertiæ partis, & colatum bibatur. Epithemata quæ vim habent ciendi vrinam, & in vapores soluendi sunt ex diureticis cum vino albo elixatis, pistis, & pubi appositis.

Viscus sanant, & roborant diacucurma, & dialaca M. diacubebe Rosarij, diarrhodum N. Delphinis iecur curat ascitem. Hydropicus quidā deploratus solo potu vini aruisij seu Cretici, in quo etiam carnes, suaq; edulia elixabat per sanatus fuit. Idem pollet vinum in quo rorismarini flores macerati sunt, vt ait Girard. liquet quòd hydrops erat ab occasione frigida. De hydragogis empomphaliis seu vmbilicaribus laudatur vng. arthanitæ magnum. M. his illinitur qui non possunt sumere cathartica, sed non conuenit debilibus, vt ait Raz. 7. cont.

De resoluentibus per insensibilem transpirationem sunt limaces, quæ tritæ cum testis, & impositæ ventri, impensè desiccant. Confert etiā arenis calentibus ventrem, & tumētes locos obruere. Constat etiam quosdam frumenti aceruis obuolutos à

somno surrexisse firmos, vt narrat Aet. auxiliantur item insolationes. opitulatur suffitus ad loca tumētia ex aceto, in quo lixa sint radix ebuli, vrticæ, cucumeris sylue. baccarum, & foliorum lauri, hederæ, & sem. iuniperi. Optimum quoque est emplastrum de chalcanto Aëtij, de calce viua Aëtuarij, malagma Gale. 9. $\nu\beta\lambda\tau\acute{o}\pi$. sed huiusmodi topica applicari debent toto ventri in ascite frigida, non item in calida, ne hepar calfaciant, ex Auicen. sententia.

Amuleta. lapis colubri hydropicorum ventri alligatur, atque in totum exhausta aqua liberat. Oler. Buffo scisus secundum longitudinem dorso adalligatur. Varig. Gagatem hydropicus si secum portauerit, liberabitur. Ad hydropicos, & splenicos confert lapis ranæ terrestris in capite repertus, & ex collo alligatus. Myrep. Iaspis reprimat febrem, & hydropisim, in argento ligatus maiorem habet efficaciam. Vital. ebur trahit aquas ventri appositum Vincent.

Ad sitim in ascite, quæ ex composita affectione videlicet calida, & sicca nascitur, cōposita medela est oxycratū, quod ex aceto constat tenuium partium atque refrigerante, & ex aqua quæ non modò refrigerat, sed humidorum omnium est humidissima. folia herbæ scillæ sub lingua detenta, sitim hydropicorū sedat, si credimus Plinio, qui ait: Scimus voluntate sitim victam, vt in Iulio viatore.

aquæ

aquæ dulcis poculum, & lauachrum hydropicis aduersissimū est, thermarum verò, & aquæ maris perutile, vt sentit Gal. vinum hydropicis congruēs est fulium tenueq;, & non recens, vt ciat vrinas: sed his confert quàm minimū bibere, & quàm plurimū laborare: nā talis vitæ ratio calfacit & siccat.

Viētus ratio calida, & sicca ac tenuis, erit ex vsu. De cibis salubribus est panis hordeaceus, pulli galinacei, & columborum, carophasidis, perdicis, attagenis, turturis, turdi, alaudæ seu cassitæ, ficedulæ, merulæ, & similium, pistacia, & vux passæ, oua forbilia recentia. Quæ verò difficulter concoquūtur cibaria insalubria sunt, quoniam alteratrix facultas imbecilla est. Nos viros ac mulieres non paucos ab ascite liberauimus cum Dei auxilio, & prædicta viētus ratione, & remediis supra scriptis.

Ad œdemata crurum fiant frictiones in cruribus, aliàs oxyrhodino, aliàs oleo cum sale, aut oxyrhodino salem habente. Ad idem cataplasma ex mica panis madefacta cum vino, & sale admisto imponitur, vel illinitur. Aliud. pul. anisi maratri, cari, cumini añ. ℥. iij. farinæ fabarum ℥. ij. cum succo ebulliant sambuci, & vino vinoso fiat cataplasma calidum: imponatur super scortum & crura.

Sarcites curatur dispositionem hepatis anasarce causam tollentibus. Materia pituitosa apparatur melle rosato, oxymellite simplici, syr. de cortice ci-

B 5 tri,

tri, sy. de ij. aut v. radicibus, cum aqua fœniculi, agrimonix, cassuthæ, eupatorii: purgatur verò sequentibus, videlicet, hiera simplici cum agarico, tro. pilulis de rhabarb. M. vel puluere turbit qui recipit, turbit ℥.j. zinziberis, mastichæ añ. 3. ij. sacchari ℥.j. s. dosi est à 3. s. vsque ad 3. iiij. cum aqua zucchari, vel cum sy. de cortice citri. Aliud. ℞. agarici tro. 3. ij. rhabar. 3. j. f. pil. v. sæpe autē vacuandum: quia affectus est longus, & solui cōtumax. Sarcites quoque aliquando curabilis sit per vrinæ fluxum, vt Tarega obseruauit. Item per frictiones sub ardenti sole factas cum oleo salsuginoso, vel linteis asperioribus, laconicum vtile, & suffitus, aut stuba per lapides ignitos irrigatos sequenti decocto. ℞. foliorū lauri, rorismarini, saluię, origani, anethi, chamel. añ. m. ij. florum vel foliorū ebuli vel sambuci m. j. fiat decoctio in vino albo. Thymus, zinziber, & libanū destruunt pituitam, idem præstat confectio de cinamomo, & de xyloaloës, sumpta. Victus ratio morbo contraria esse debet, vt in curatione ascitis dicta est.

Ad tympaniam. ℞. sy. de eupatorio, bisantini, & mellis rosati colati añ. ℥. s. aque absinthij, fœniculi, & agrimonix añ. ℥. j. misce pro vna dosi, repetatur per sex dies, aromatizetur cū cinamomo: hepar roborat, flatuq; digerit. ℞. se. anisi, fœniculi, cartami añ. 3. ij. agarici, tro. 3. iiij. soldanæ 3. ij. in aqua suff. fiat deco

decoctio ad consumpt. medietatis, colaturæ adde
 rha. puluerati 3.ij. spicæ grana. x. f. potio. A purga-
 tione utilis est hic puluis, qui recipit cymarū absin-
 thij pontici, eupatorij, soldanæ añ. 3.ij. spicæ 3.ij.
 sumat 3.j. in diluculo ex vino, vel ex aqua rad. sam-
 buci. Vel loco pulueris vtatur pilulis sequentibus
 quotidie mane, & vesperi per ij. horas ante cibum.
 R. tro. de aniso, & decapparibus añ. 3.j. rhab. 3.j. s.
 spodij 3.j. spicæ 3.j. fiat pul. & cum sy. de absinthio
 fiat massa, ex qua formentur catapotia, sumat 3.ij.
 Aliud. galangæ, zedouariæ añ. 3.ij. gary. cinamomi
 añ. 3. s. soldanæ 3. s. fiat puluis, & cum syrupo de
 cortice citri fiat elect. sumat 3.j. ieiuno stomacho.
 Aliud. R. pul. radice centauriæ maioris 3.j. se. anisi
 & cari añ. 3. s. fiat puluis, sumat de tertio die in ter-
 tium in potione. R. florum chamæl. anethi añ. m. j.
 anisi, fœniculi, cari añ. 3.j. in aqua suffic. f. decoctio
 colata ad librā s. cui adde hieræ f. 3.j. pul. elect. de
 baccis lauri 3.ij. olei rutacei 3.j. s. olei liliaci 3.ij.
 fatis 3. s. fiat clysmus. R. cumini se. anisi añ. 3.ij.
 pul. baccharū lauri 3.j. milij, panici, furfuris, salis añ.
 3.ij. calfiant omnia ista in vase stagnæo, & fiat sac-
 culus, qui calidus ventri admotus flatus digeret.
 R. empl. de baccis lauri, & de meliloto añ. 3. vj. ex-
 tende super aluta, & ventri adapplicetur, opitula-
 tur etiam sicca magna admota.

De

De omni lienis affectu. CAP. XXVIII.

Lien sinister. 6. epi. per pleonasmon. In dextra tamen parte, aliquando prodigiosè repertus, vt ait Aristoteles primo de nat. animalium. Caro eius, & reliquorum viscerum parenchyma vocatur, rara & laxa, multis magnisq; arteriis, & venis peruia, raroq; integumento velata, vt facilius melancholicum humorem tum alliciat, tum suscipiat, vt scribit Theophy. 2. anato. Magnitudo, & color nō idem omnibus: nam calida, & sicca animalia nigrum obtinēt, frigida & humida albicātem magis. Sima eius pars conuertitur ad iecur, & ventriculum inferius, quæ venis crassius trahit alimentum, arteriis verò subtilius. Confectum humorem vis in liene sequestratiua partitur, eiusq; tenue ac purum ad sui escam retinet, reliquum ad ventriculum expellit, roborat enim quas contingit ventriculi partes, animalisq; appetentiam excitat. Vnde patescit quomodo lien iungitur hepati per venas, cordi per arterias, & ^{venos⁹ canalibus} ventriculo per venosum canalem, vt 2. de fabrica hominis scripsit Protospatarius.

Liene languidè trahēte, sæculentus sanguis per vniuersum corpus dispergitur: nam hepar non solum purgatur à renibus, & ab inhærente vesica, sed etiam à splene, qui sanguinem limosum ex hepate trahit,

trahit, quo nutritur, à se prius elaborato, & quod elaborare non potest, ad vicinum vètriculum mittit. Proinde lien malè affectus colorem totius corporis vitiat, & lienis quàm hepatis vitia nigriorem colorè reddunt. Lien faciliùs induratur quàm hepar: quia crasso nutritur sanguine, & crassiori quàm hepar, licet eius substantia quàm hepatis rarior sit. In hac re varius videtur Gal. nam 4. de vsu p. Lien inquit, nutritur tenuiori quàm hepar portione sanguinis. Rursus ait, Benigno, & crasso hepar nutritur sanguine. & 6. eiusdem Iecur, inquit, nutritur sanguine crasso, & limoso, lieni per renes nulla administrari potest vacuatio, sed tantummodo per intestina.

Nota.

De lienis inflammatione. CAP. XXIX.

AD inflammationem adhibetur phlebotomia, si nihil prohibet, quæ si omiſſa sit, venter per clysterè assiduè eluatur. Attamen inflammatio purganda non est, ante sectionem venæ, sed deinde deiectionis medicamentis vti sunt diacatholicum, cōfectio hamec. materiam per syrupos acetosi simpl. fumarix, epithymi, cum aqua lupuli intybi, & oxalidis apparatus deturbamus. Arabes retrahunt secta axillari dextra. Deriuant verò, & abeuacuant phlebotomia sinistra, vel eius rami, qui inter paruum, & anularè digi

digitos repit. Galenus verò retrahit, deriuat, & vacuat per sectionem internæ sinistræ partis, id est, ex lienaria. Affecto liene vena circa annularem digitum sinistræ manus incisa prodest, vt ait Gal. Venæ inter anularem, & medium digitum sitæ in sinistra manu sectionem, opitulari lieni idem asserit, ex aliquorum sententia, modo finas sanguinem ex ea fluere, quousque vltro sistatur. A phlebotome lieni imponantur adstringētia, quæ id quod influit reprimere, & lienis firmitatem conseruare possunt, robusta vbi floris impetus fortis cōtingit, moderata vbi mediocris. Cognoscitur autē irruētis humoris magnitudo, ex magnitudine, & velocitate generationis phlegmones. Non sunt tamē sola astringētia adhibenda, sed admiscenda erunt ea, quæ citra euidentem calorem extenuant, secant, atque relaxant, ne scilicet crassus in eo succus obturatus vehementius increpescat à sanguinis missione, & in augmento repellentibus frigidis, & parūm astringentibus vtēdum, vt ℞. olei rosati violati cotoneorum añ. ℥.ij. olei chamæmelini ℥.j. aceti optimi ℥.s. misce, sed cauendum ne actu frigida lieni imponantur. In statu digerentibus magis vtēdum, vt decocto chamæmeli, meliloti, alteæ, sem. lini, fœnug. oleo amygd. dul. & capparis in varias medicamēti formas compositis. Item cauendum ne valentius refrigerando vel digerēdo, ex phlegmone scirrhus fiat,

fiat, postremò vacuata omni materia pars robo-
randa oleo mastichino, & rosato. R. seminis viticis
decorticati, fructus tamarisci añ. 3. v. sem. intybi, &
portulacę añ. 3. ij. s. his aceto acri detritis fiant tro.
fumat 3. iij. & superbibat syr. acetatum simpl. lienis
inflammatio rarò suppuratur.

Ad lienis dolorem à causa frigida. CAP. XXX.

Ivic malo erunt remedio tro. de cappa-
ribus poti ex syr. acetato, simplici melli-
no. Ad vehementem dolorem inflam.
duritiem tensionem, & puncturam. R.
corticum rad. cappa. 3. vj. sem. rumicis 3. iij. s. cor-
ticis radicū tamarisci 3. j. s. fiat pulvis: dosis 3. j. ex
aqua pota: mox iaceat super latus affectū. N. Alex.
Ad splenis dolorem confert prius dextrum pedem
quàm sinistrum calceare caligas, aut calceum, &
prius sinistrum quàm dextrum exuere, si Arnaldo
credimus.

De lienis obstructione. CAP. XXXI.

IN splene fieri non solet obstructio ex
abundantia, sed ex qualitate succorum,
qui scilicet lenti, & crassi sunt, quum
lien sit fons, & officina limosi crassi ve
sanguinis, proinde præfertur inter remedia, non
sanguinis missio, sed attenuantium vsus. Quoties
obst

obstructio in lienē incidit, aut phlegmone scirrhusa, tum ea quæ obstructiones eximant, tum quæ dissecent, vehementiora exigit, nā quale med. iocinori est absinthium, tale est lieni capparis cortex: quale rursus hepati eupatorium, tale est lieni scolopendrium: si quidem similia genere medicamenta, ambo viscera postulant, sed tanto valētiora lienis, quanto crassiore vtitur alimento. Ex quo claret, quod non ob id quod hepar sit magis passibile, lien fortiora fert medicamenta, vt retur Agrado (lienī enim substantia rarior quā iocinoris est) sed nutrimenti causa, hepar rubicundo, & crasso nutritur sanguine, splen verò subtili, & nigro. hinc Gordonius egregiē doctus, virq; bonus, infert, quod sanguis subtilis, & niger, rubicundo ac crasso, crassior est. Acetum splenicis remediis miscēdum, vel quia splen nutritur sapore acetoso, vt ait Zoar, vnde non omnino iniucundus videtur: est nanque in eo acerbum quiddā intelligere, vel propter humoris quem continet crassitudinem, & lentorem, vel vt medicamētā penetrare faciat. In obstructione recenti conferre potest sanguinis detractio ex basilica sinistræ partis, non item in obstructione inueterata: quia tumor redderetur durior. opitulatur hæmorrhoidum apertio, & sapheæ sinistri pedis incisio. Mox apparāda materia serapio diarhodon syr. de lupulis, sy. acetato simpl. cū duplo aquæ radicū

radicum cuscutæ, scolopendrię, buglossę, dein materia purganda ex potu diacatholici, diamannæ, diasenæ, & confectionis hamec. Roborantia viscus & resarantia, sunt electariū de limatura ferri, quod recipit limaturæ ferri præparatæ ℥. s. pul. diarho. & diacucumeræ añ. 3. ij. epithy. thymi añ. 3. ij. cum melle despumato fiat elect. dialaca, diaprasium. Aliud. ℞. fructus tamarisci ℥. ij. cinamomi ℥. j. s. spice nardi ℥. s. cum syrupo de lupulis vel oxymelite fiat elect. huc pertinet tro. de eupatorio. Ad emphrasim hepatis, & splenis, ammoniaci ʒ. ij. da in cōdito diebus tribus: miraculo proximè accedit: semper enim vitiosos hu. per ventrem vacuat & hydropisim arcet. De foris admouendis. ℞. succi ciclamini, aceti añ. ʒ. ij. mellis ʒ. ij. bulliant ad spissitudinem, & cum cera pura fiat linimentum. Ciclamen teste Dio. obstructions soluit emollit, resoluit, attenuat. Ad obstructionem, & duriciem. ℞. bdellij mastichæ, galangæ, ammoniaci, aloës, colophonix, mellis añ. ʒ. j. terebinthine ʒ. ij. serapini, styracis liquidæ añ. ʒ. j. succi ciclamini, & absinthij añ. lib. j. olei chamæmeli lib. s. ceræ citrinæ ʒ. iij. fiat empl. emollit, digerit, dyscrasiamq; emēdat. ℞. olei cappa. ʒ. iij. olei sisamini ʒ. j. s. scolopendriæ, sem. endiuix, scariolę, lactucæ, corticum cappa. añ. ʒ. s. se. viticis ʒ. j. ceræ q. s. fiat vng. molle conspersum modico aceto. Confert in dyscrasia frigida, &

To. III.

c

calida,

* 318

ammoniac

calida, duriciem emollit, & flatus dissipat. Mirè confert opilationibus splenis, & hepatis, ammoniaci ℥.ij. sumpti cum condito, vt asserit N. Alex. Aliabbas dat 3.j. ex aceto bibendam. ℞. tamarisci, scolopendriæ, scorix ferri añ. 3.j. rad. cappa. ciperi, acori, azari, berberis, cinamomi, añ. 3. s. bulliant in lib. j. olei veteris, & in lib. j. aceti acerrimi ad cōsumpt. aceti: postea ℞. serapini, galbani, opopanax, bdellij, ammoniaci, añ. 3. iij. cū prædicto oleo, & cæra fiat vng. quo splen ieiuno stomacho illinatur actu calido, attenuat crassos hu. obstructionē soluit, & splenem roborat.

Ad lienosos, & splenicos. CAP. XXXII.

Splenici sunt illi, quibus diuturna durities inest splenis, vt Galenus interpretatur. Lien internè durus, rotundus, latus, crassus, & longus. 6. epi. com. 2. sunt igitur tumorum differentix quatuor. De maximo splenis incremento meminit Trall. Lienis morbi nō sunt acuti. Quibus lien deorsum vergit, his pedes, & genua calent, nasus verò, & aures frigent, palamq; est quòd ob lienis tumores respiratio lèditur. Dextræ partes validiores sunt, & debiliores sinistræ: quia has regit calor visceris sui, illæ contagione frigoris sinistra obtinentis hebetantur, vt apud Macrobiū scriptum est, cui astipulatur Galen. dextræ omnes partes,

partes, inquit, sinistris ob hepatis ^{*}situm calidiores, ^{*}situm.
 & valentiores. Ministri canem curātes qui est mo-
 riturus, vt plurimū splenici fiunt. Et qui planè sunt
 lienosi neque odorare, neque ridere, neque sternu- *Nota.*
 tare possunt, si credimus Oro. splen risus instru-
 mentum apud Viaticum, quum sanus expurgat hu-
 morem atrabilarium. Risus tumultuosus ex thora-
 cis vulnere. §. epi. & apud Plin. Qui magnum ha-
 bent lienē biliosi, magis patiuntur quàm pituitosi,
 vt ait Hippo. Quibus corpus floret, lien minuitur,
 quibus lien augefcit his corpus minuitur, cacochy-
 micumq; redditur. Iure ergo Traianus fiscum ap-
 pellauit lienem, apud Rhodiginum. Cursus impe-
 dimentum ex liene, ob id cursoribus inurebatur, si
 Plinio creditur. Lien fluxioni obnoxius. Tamē qui
 distillationibus à capite laborāt, his lien minus tu-
 mens efficitur, vt Hippocrati placet: perrarū enim
 est in omni corpore duo aliqua membra æqualiter
 esse debilia, vt inquit Galenus. Vnde vitia lienis
 grauedine capitis laborantibus minus eueniunt, in
 quibus pituitosa humiditas, aut tenuis, & aquosa
 colligitur, & non crassa, & melancholica. Lienosis
 ventres perduri efficiuntur, vt ait Aristoteles, pro-
 pter confluuium ad lienem humoris. Lienicis dy-
 senteria superueniens bonum, si verò vltra modum
 extendatur, moriuntur.

Metho. m. scirrhum splenem vehementibus

C 2

med

*
molestiam *
 medicamentis curare oportet : nam & hæc citrà
 modestiam præfert, siue foris siue introrsum adhi-
 beantur, etiam si raræ sit substantiæ, & munus ha-
 beat corpori necessarium : quoniam minime ner-
 uosa pars est, proindeq; sensus hebetis, & in alto
 condita. Eiusq; scirrhus curandus est primùm per
 crassi sanguinis à sede, vel infernis partibus, detra-
 ctionem, mox humorem atrabilarium concoque-
 re, deinde apparatus expurgare oportet, postre-
 mò tumorem durum emollire, & digerere. Appa-
 rant materiam syr. acetatus simplex, oxymel sim-
 plex, sy. de fumaria, de lupulis, violatus, de scolopen-
 dria, de thymo, & epithymo, de buglossò, de squi-
 nanto, & syr. ad scirrhosum splenem Clementini,
 foeliciter expurgant decoctum epithymi, & fuma-
 riæ M. diacatholicum, diamanna, diasena, cōfectio
 Amech. pilulæ de fumaria, & de rhabarbaro, pilulæ
 inde. A purgatione vtatur sequentibus remediis.
 ℞. conseruæ ceterac lib. j. conseruæ borraginis ℥. j.
 tro. de agno casto 3. iij. diarrhodij abb. tabulati ℥. ij.
 folia auri. vj. margaritarum 3. j. fiat mixtura de qua
 sumat ieiunus instar castanæ, per tres horas ante
 cibum, opitulantur etiam tro. de eupatorio, de la-
 ca. Pecora sine liene inuenta quia asplenem rode-
 rent in Creta, teste Viêtruuius. *sed hoc fabulosum.* ex

De foris admouendis acinorum ebuli oleum lie-
 nis tumores discutit. Oleum benedictum N. illitum
 paruo

paruo tempore dissoluit, similiter efficit viticella
 cum axungia, farina, & oleo superposita scirrhu dissoluit. Aliud. ℞. succi bryoniae succi ciclaminiis añ.
 ℥. iij. butyri recentis ℥. j. s. medullæ crurum bouis
 ℥. iij. olei ℥. ix. bulliant ad lentum ignem vsque ad
 consumptionem succi, colaturæ adde pulueris ce-
 terac, corticum capparorum, tamarisci, sem. viticis
 añ. 3. vj. fiat vng. Aliud. ℞. olei sisamini, amygd. dulciũ
 añ. ℥. iij. butyri recen. medullæ crurum bouis añ. ℥.
 iij. adipis anatis, & gallinæ añ. ℥. j. ceræ albæ ℥. ij. fiat
 vng. si addantur lutea ouorum tria, & croci 3. j. erit
 anodynum, si adhuc addas bdellij, & ammoniaci
 dissolutorũ in aceto albo acri añ. ℥. j. emolliet ma-
 gis, & resoluet. Ad crassitiem lienis. ℞. fermenti so-
 luti in aceto ℥. s. ammoniaci, bdellij, caricarũ añ.
 ℥. j. foliorum rutæ, fructus tamarisci, baurac añ. 3. j.
 fiat empl. est mirabile in maximo lienis tumore, cu-
 ratio difficillima, quàm recusare oportet, quod si
 cogamur à dubiis, & hebetibus remediis auspica-
 bimur, periculo eis incumbente prædicto. Ante-
 quam innotescant morborũ species, aut proximæ
 causæ temperatis, aut neutris regendus est æger, vt
 monet Arnal. Si lien frigida, & stomachus calida
 affectione laboret, calida frigidis in cibo præmit-
 tenda sunt. Epithema ad splenicos, & hydropicos
 humores in profundo resiccans. ℞. nitri, & spumæ
 eius, chalcanti, salis añ. 3. iij. cerusæ ceræ añ. ℥. vij.
 c 3 olei

} consilia .

olei ℥. x. oleum cum cerusa donec inquinet amplius coquito, ceram his addito, qua liquata reliqua in mortario terito ad mellis compagem, hydrocephalis, & hydrocele pro glutinio existit.

Victus ratio attenuās, & quæ atrabilarium succum declinat, videtur ex usu, salubria etiā sunt cibaria boni succi ac facilis cōcoctionis. Lien iecurq; à dulcibus omnibus maximè intumescūt, à vinisq; crassis lædūtur. Vinū vel aqua in qua candēs ferrū sit restinctum potu lienosis auxiliatur, Dio. Vinū potum in quo aurum candens extinctum. Ad splenicos Marcel. iubet bibere quotidie serum capræ quæ hedera pascitur, & splene consumpto erunt. Splen catelli manducatus lienicos sanat; potenter etiam sanat splenis asini arefacti pauxillum quotidie ieiuno manducatum. Ad idem confert hippuris contrita, & ex vino potui data; folia asplenij in aceto feruefacta, & pota lienem absumunt, teste Dioscor.

Amuleta. Lienosis proficit potus datus in calice è caudice tamarisci. Dio. vel hederæ, Plin. vel in lagenis fraxini. Valesc. tamen scobs fraxini potu perniciem affert. Dio. Lienicos infra triduum liberant hederæ nigræ tres taleolæ in linteo ligatæ filo, in amuleti modum adpensæ. Ruell. Ebulus gestatus. Apul. lacerta viridis in olla appensa ante cubiculum in quo æger decumbit. Plin. **cap. xxxii.**

FINIS TOMI TERTII.

ANASCEVES
MORBORVM
TOMVS QVAR-

T V S.

*

De nephritide.

CAP. I.



NEPH^ῑTIS est renum vitium, & ex renum morbis qui νεφρίτιδες dicuntur, princeps constituitur ^{λε}θίασις. Quæritur an calculus sit morbus, causa, aut symptoma. Cōstat quod est in numero morbus, si in numero sint morbi quicunque substantiæ præter naturam in nobis cōsistunt, est etiam morbus in via, à calculo enim via læditur. Est morbi causa, solutæ videlicet renum continuitatis, est etiā symptoma renum dyscrafiæ. Porro calculorum differentiæ ducuntur à magnitudine, paruitate, figura, & colore.

Causa, materia ex qua crassus est, vel glutinosus

To. IIII.

C 4

luc

fuccus, vel etiam vtroque modo vitiatuſ. Efficiens renu calor vehemens, aut tepiduſ : nam ſi craſſa materia eſt, ſufficere poteſt tepida, & moderata caliditas: ſi verò tenuior ſit, indiget vehemētiori. Lac natura craſſum eſt, & ad calculoſ generandū aptiſſimum. Vrinaſum craſſitudo creandoru calculoru prima cauſa. Caliditas verò mediocriſ ad huiuſmodi materiā inſpiſſandā ſatiſ eſt, ſciendum inſuper quod calculoru in renibuſ cōcretio ante miſtum ſit, in veſica contrā poſt miſtum.

N Digno. dolor modicuſ in profundo lumboru infeſtans, paruo loco circunſcriptuſ, fixuſ, & pungens, dolor grauſ lapide, ſcilicet in carnoſa parte concreato, grauſ dicitur à ſenſu ponderiſ, vel quia acerbuſ, dolor vehemens quum renu cavitatem ſubit, aut vreteruſ ingreditur. Dolor non abſimiliſ colico, vnde vomituſ pituitæ, & ſuper abundante dolore æruſinoſoru. Dolor paſtiſ mitior, quàm ieiuniſ, ſi credimuſ Syluio viro impēſe docto: nam contrariuſ innuere videtur Hipp. In renē, inquit, dolor grauſ, quando cibo replētur. Et paulò poſt, Soluuntur, inquit, quum cibo euacuātur. Teſticuli dolor eiuiſdem lateriſ. Stupor eiuiſ ſœmoriſ quod ē directo eſt. Dolor autē vehemens in iliſ ad iſchion extenſuſ calculuſ vreteriſ aſeſſe designat. Cruēta mingunt, quādo ſcilicet lapid erodit vias, per quaſ tranſit. In vriniſ ſabuloſa quædam, eoq; vt plurimum

num rubra. Quibus in vrinis sabulosa subsistunt, his vesica calculo laborat, aut renes. Calculi subalbidi pituitosiores humorem ostendunt, pallidi bilem, testacei super assatam bilem, nigri atræ bilis humorem declarant.

Prælag. Calculorum cruciatus asperrimus. Est morbus hæreditarius, repetitq; per circuitionem. Renes si calculū creāt, & corpus si gracile, inæqualis cōpositio est, quæ nulli in malitia cedit. Renū calculi ætatē perfectam, vesicæ verò pueritiam vexant frequentius: pinguiore renum calculi, vesicæ .N. verò maciem sollicitant. Calculi rotundi, leues, & parui facilè excernuntur, aliter figurati ac asperi difficulter. Arenulæ egeruntur dum fiunt lapides. Trāsmoto lapide, & ex sede agitato dolores quiescunt. Calculi renum per tussim magnam aliquādo crepant. Ex lithiasi podagra in nephriticis, qui vtuntur diureticis. Lapis in renibus, & vesica duntaxat nascitur, ex intestinis eiectum non vidit Gal. ipse vidi calculum instar oui columbini per aluum excretū Lugduni à muliere quæ dolore coli conflictabatur; similem se vidisse testatur Beniuenius. Quid quod de lapidū ex aluo fluxu meminit Pedemontanus, Arcul. Guainerius. In aliis quoque corporis partibus calculus procreatur, vt grādo in pulmone, lapis sputatione eiectus, apud Trall. In tunica hepatis ortum vidit Beni. In folliculo fellis

c s plu

plures non semel conspiciatus sum. Item vnum sub lingua cuiusdam heroinæ natum, & inde euulsum instar strobili, vt omittā quòd in articulis lapidosæ durities fiunt. Renum & vesicę vitia in senibus difficulter sanantur, diuturnis enim morbis correpti ferè commoriuntur. Morbus renum difficulter curari potest, etiā si nuper ægrotare incœperint, qui in pinguibus, letalis est, teste Arist. Nephritis tamen alia facilè solubilis, alia ægrè, vt pote, quando renes scirrhis deprehensi sunt. Renibus accidunt febres hecticæ, vt marasmus. Renes affecti ex potione frigidæ, apud Galen. Lynocephalus æquinoctio vnā quanq; diei horam lotij profusione declarat: nam interdiu duodecies, noctuq; toties vrinam facit.

Metho. m. Quæ in renibus sunt, & vesica promptius euacuatur per vrinā. Renes & vesica, & iocinoris gibba si multo vitioso succo sint referta, per deiectiones, & pharmaca deiectoria expurgantur: sin modicè per vrinales meatus, si quidem à figura mēbri indicatio modi euacuandi excrementi suggeritur. Omni ætati conuenit non quiescere, sed exercitari, cibo, potuq; non impleri. Iuuenibus verò purgatio, venæ poplitis sectio, & vrinā mouentia dare. Sed ante diuretica vti iubet Hippoc. balneo aquæ dulcis, inūctionibusq; laxantibus, ac mollientibus meatus. Iugiter lauacro vtantur, vt monet Aetius, & à lauacro eorum aliquid, quæ vrinā mouent,

uent, potent. Galenus primùm vomitu, mox cly- N
steribus aluū supra infraq; euacuare præcipit. dein
venam secare, si adsit plethora. Cubiti vbi renibus
adhuc fluxus imminet, vel si virtus imbecilla sit, aut
poplitis sub genu, vel ad malleolos, dummodo va-
lida sit virtus. Deinceps bis, ter, aut amplius, vacua-
re enemate, postea iniicere quæ vreteras, renesq;
dilatare, calculum laxare, cruciatus committigare
queant. Præterea fomentis humectantibus, & rela-
xantibus delinire affectū locum oportet, & sicyas
affigere, vt lapidem transmoueant, à renibus inci-
piendo, procedendumq; ad inguina est per obli-
quam iliorum positionem, postmodum fomentis
iterum emplastris, cataplasmatibus vtendum, mox la-
uacro, & ab hoc, si dolor vrget, narcoticis, postre-
mò quæ lapidem conterunt tepida dāda sunt, quæ
si non sanant, oportebit ad ea, quæ à tota substantia
operantur, descendere. Enemata exiguæ quantita-
tis esse debent, quoniam refertis grauatisq; intesti-
nis vnà quoque rem laborans stringitur. Ex præfa-
tis satis constat, quòd leniens medicina deuoranda
est ante exhibitionem eorum quæ lotium mouēt,
& lapidem conterunt. Calculi coliciq; doloris præ-
sidia omnia communia sunt, & quidem calorifica
imprimis, siue ea extrinsecus exhibeantur, siue ini-
ciantur. Deinde nisi mitigatus dolor fuerit, narco-
ticum exhibendum, cuiusmodi est philonium.

Re

Remedia. ℞. cassiæ nigræ traiectæ per setacium
 ℥.j. vel 3.x. cum oleo amygd. dul. recens facto fiat
 bolus, sumat ieiuno stomacho. Vel ℞. mannæ ℥.j.
 & cum butyro recenti, & decocto sem. maluæ fiat
 potio, quā sumat tribus diebus. Aliud. terebinthinę
 lotæ ex aqua violarū 3.ij. benedictæ simplicis 3.ij.
 f. bolus. ℞. adipis gallinę cœsipi añ. ℥.s. olei chamæ-
 meli, anethi, & liliaci añ. ℥.j. cum cera f. illitio ad re-
 nes. Decoctum pro balneo fit ex aqua dulci cum
 malua, maluauiſco, parietaria, anetho, chamæmila,
 & radicibus petro. fœniculi, semine lini, & id ge-
 nus aliis. Item admota lapidem conterentia sunt
 sanguis vulpis calidus renibus illitus. Oleum scor-
 pionis similiter illitū. Ad idem. ℞. succi petro. apij,
 fœniculi añ. lib. & cum mica panis fiat cataplasma
 pro renibus. Aliud. ℞. sem. bardanæ ℥.j. croci 3. & 3.
 sacchari 3.x. cum vino albo fiat potio, quam sumat
 mane & vesperi, & illinantur renes oleo sequenti
 parietariæ m.ij. cepas albas decorticatas. x. pista
 simul bulliant in oleo chamæmeli, dein colatum
 oleum serua ad vsum. Aliud lapidem conterens. ℞.
 rad. fœniculi, saxifragiæ, petro. añ. lib. & rad. lapæ
 ℥.vj. lota & pista bulliant in aqua suff. cum ℥.j. liq.
 rasæ, de colatura sumat mane, & vesperi. De aslu-
 mendis sunt elect. lithon tripum, id est, lapidē per-
 forās, & iustinum, elect. ducis Nicol. cum decoctio-
 ne milij solis vel scolopēdriæ, elect. de lepore com-
 busto

busto Monta. nephrocatharticum Nicol. Aliud.
 percolei ℥.iiij. lapidis lincis ℥.j. s. bulliant simul, & ^{petrolei}
 de colatura fiat collyrium: lapidem confirmatum
 frangit iniectum, post fotum pudendi ex decocto
 malux.

Victus ratio in frigidiorē temperatura prædi-
 tis sit exquisitè attenuatoria. In calidioribus verò
 inter hanc, & impinguantia media.

Calculi renum prophylatice. CAP. II.

Prophylatice declinat causas morbificas
 quales sunt materia crassa, & lenta ex ci-
 bis genita, & calidam renum dyscrasiam
 emendat. ℞. cassiæ traiectæ per setacium
 ℥.j. cum sacharo fiat bolus, sumat per horam ante
 prandium bis in mense, si fastidit cassiam, sumat ℥.
 j. confectionis de sebesten sine dacridio; tempore
 frigido sumat 3.iiij. terebinthinę iusculo capi, per. ij.
 horas ante prandium, vel sumat per horam ante
 prandium 3. s. pilularum de hiera simpl. vel masti-
 chinarum, vel sumat 3.iiij. syrupi de vesicaria per
 tres horas ante prandium, detergit renes & ventri-
 culum firmat. ℞. hordei mundi m. j. liquiritiæ rasæ
 3. x. radicum graminis m. j. fiat ptisana aromatizata
 cum cinamomo, sumat die sequenti operationem
 pharmacorum lenientium supra scriptorum, ℥.vj.
 actu calidas. Idem præstat aqua mulsa pota M. arcet
 calc

calculi aduentum. Ad idem cōfert decoctum verbenæ, betonicæ, millefolij, decoctum eryngij, aqua genistæ pota, strobili esitati, aut amygdalæ amaræ ieiuno stomacho. Item ad præcōtionem opitulatur sequentia. ℞. cineris leporis cochlear vnum bibat cum aqua calida. Puluis putaminum ouorum. Puluis ex semine mespilorum. ℞. cineris scorpij ℥.j. vel 3. s. ex vino albo propinetur. ℞. betonicæ, saluix vitæ, siccatarum in vmbra añ. 3. s. sumat ex vino albo. vel ℞. milij solis, quatuor sem. frigidorum maiorum decorticorum, sacchari añ. 3. j. sumat cochlear vnum ex vino. Aliud. scolopendriæ, milij solis añ. 3. j. præseruat à sabulo, & calculis. Aliud. pulueris membranarum stomachorum gallinarum præparatarum 3. ij. sumat ex vino cochlear vnum. ℞. foliorum altheæ m. j. mellis 3. j. bulliant simul, & colentur, adde butyri recentis 3. vj. fiat potio vnciarum quinque vel sex, sumat calidam. ℞. cerati Galen. infrigidantis 3. j. olei nenupharis, & violati añ. 3. s. misce. illinantur renes.

Periapta. figillum aureum cum figura leonis renibus applicatum non permittit sensum percipere læsionem calculi. Ita loquuntur Hermes, Piccatrix, Conciliator, Arnal.

Ad renum vlcera.

CAP. III.

VLcerum renum indicia sunt, si sanguinem, aut

aut pus mingant, multis diebus, & mensibus, vrina purulenta, propria signa ex loci dolore ducuntur, renum dolor, pus cum vrina mediocriter commistum, partes à renibus auulsæ carunculis similes, sine impedimento vrina redditur. Ex abscessu superiorum locorum dirupto, simul cum vrinis aliquando pus egreditur, sed non multis diebus, & mensibus. Si pus exactè commistum, est à supernis aliunde partibus. In vreterarum vlcere dolor mediam inter renem, & vesicam regionem occupat. Lotium purulentum, intercalatum, & mediocriter commistum habet.

Metho. m. Ad renum conueniunt tria remediorum genera. Anodyna ob dolorē, detergentia propter pus, & quæ vlcus incarnant, & ad cicatricem ducunt. Primum vitiosi acresq; humores purgandi sunt catharticiis cacochymis accommodatis, qualia sunt diacatholicum, diasebesten sine dacrydio, atramentum calami dulcis, syrupus rosatus cum rabarbaro. Confectio Amec. sine scamonea. Vomitus vtilissimus: quia humorum motum planè in contrariū vertit. Ab his deuoranda sunt quæ morfus obtundunt, vt malua, intybum, portulaca, semina frigida maiora decorticata, sy. rosatus, iuiubinus, violaceus, nymphaeæ, & id genus alia. & seminis intybi, cichoreæ, lactucæ, seni, altheæ, & maluæ, añ. 3. j. s. mellis 3. ij. in aqua sufficienti fiat decoctio colata.

lata, in qua dissolue tro.alchechengi sine opio 3.ij. sumat ieiuno stomacho vice vna, & vice alia in decocto prædicto dissolue 3.j.tro. qui ad cicatricem ducunt. Recipiunt autem boli armenię carabæ añ. 3.v.acaciæ, balauftiæ, gummi arabici, hypocistidis añ. 3.j.s.se.apij, se.alterci albi añ. 3.j.cũ succo oxiachantæ vel myrtino fiant pastilli, sumat 3.ij. pro doli, cum decocto myrtilorum vel berberis.

Anodyna. R. foliorum violarum, chamæmeli, meliloti añ.m.ij. foliorum papa. & lactucæ añ.m.j. s.croci 3.j. farine hordei 3.s. cum decocto papaueris fiat cataplasma. Aliud. farine hordei, milij, filiginis añ. 3.ij. butyri rec.adipis anatis añ. 3.j. croci 3.j.coque in lacte, & superpone. R. succi vel aquæ chamæmeli 3.ij. olei amygd.dulc. 3.j. Vel aquæ altheæ 3.ij. croci 3.s.sem.hyoſciami grana.viij. fiat potio. Vel sem.lactucæ, portul. cucumeris añ. 3.j. croci grana v. corticum, mandragoræ 3.j. fiat puluis, sumat 3.ij. cum succo chamæmeli vel cum decocto papaueris. Vlcus detergunt serum lactis vaccini potum, muccago seminis altheæ cum iusculo pulli omni mane pota, hydromel coctũ cum aqua altheæ, & potum. Vlcera renum, & vesicæ vomitu assidue facto sanantur, lac potum præstat cæteris remediis: magis detergit asininum, magis nutrit vaccinum: caprillum medium est, quantitas sit ab vnciis iiij. ad nouem. Strobili præparati cum saccharo

charo comesti opitulantur. Vel ꝛ. pinearum recentium præparatarum ꝛ.iiij. fisticorum ꝛ.8. sem. portulacæ 3.j. ꝛ. sem. papa. albi 3.iiij. radicis dulcis ꝛ.8. sacchari albissimi ꝛ.v. fiat miscella, de quo sumat cochlear vnum ante cœnam, & prandium. Trāquillitas, & quies optima. Motus & coitus oppidò sunt insalubria, teste Dama. Itē ad vlcera renum, & vesicæ saluberrima est potio sequēs. ꝛ. foliorum pentaphylli m.iiij. sacchari albissimi q. s. fiat syrup. de quo sumat æger ꝛ.ij. cum aquæ plant. ꝛ.iiij. detergit, & ad cicatricem ducit. Confert etiam vsus decocti radicis sinarum orientalis.

De vlcere vesicæ.

CAP. IIII.

IN vesicæ vlcere, ramentum, sanies, purulentia, & foetor inest, tormentum in pube, vrinæ difficultas, pus vbi redditur subsidet. Si sanguis, aut pus minxerint, aut squamulas, & grauis odor adest. Partes à vesica auulsæ lamis sunt similes. In vrina crassa fursurea exeuntia vesicam scabie laborare denotant. In tenui verò vrina venarum scabiem portendunt. Ad vrinæ ardorem, & vlcus. Si ab humore bilioso ardor incidit, vrina citrina est, si verò à salsa pituita efficitur, vrina est alba, si ab vstione humorum contingit ardor, vrina erit citrino fusca, si à consumptione humiditatum ardor nascitur, macies cor-

To. IIII.

D

por

poris apparet.

Purgatio cacochymix accōmodata cōuenit, per cholagoga, phlegmagoga, melanogoga, qualia sunt sy. ros. cū rhabarbaro, atramentū calsię nigrę, terebinthina lota, diacatholicū cum 3. j. cōfec. Amech. sine dacridio. Exuberantia lotij est curatio ardoris, lotium autem exuberat esu ciborū frigidorum, & humidorū, quales sunt lac, portulaca, cucurbita, cucumis, pepo, melones, & semperuiui, modò corpus non sit cacochymum. Auertitur materia à renibus, & vesica per purgantia supra scripta, & per sudorem prouocantia, vt pote ex decocto radicis sinarum orientalis vel ex potu serapij: qui refertur ad diuum Ambrosium vel ex balneo, & stibis. Ardoris remissio fit per clysteres molles, & per ea quę alterant hepatis, & renum calidam intemperiem, & siccam assumpta, & admota. ℞. iusculi intestinorum, vel carnis in quo elixata sint malua, violaria, nymphaea, althea, brācha vrsina, lib. j. loch de calsia 3. j. olei violati 3. ij. mucaginis sem. psylli 3. s. sacchari 3. j. s. fiat enema. Clysmus etiam confert ex lacte cum saccharo iniectus. ℞. aquę nenupharis 3. iij. aq. violarum, semperuiui añ. 3. j. succi solatri 3. j. s. lactis muliebris 3. ij. olei violati butyri rec. añ. 3. vj. misce fiat epithema ad pubem, & perineon. ℞. albumina 4. ouorum recentiu concussu in aquam conuersa, lactis humani 3. iij. butyri rec. 3. s. fiat colly

collyrium. Ad alterandum hepar, renes, vesicam,
 ℞. diapapaueris, diatriasantali, sacchari violati añ.
 ℥.ij. misce, sumat instar castaneæ mane, & vesperi
 ieiuno stomacho. ℞. infrigidantis Gale. cerati san-
 talini añ. ℥.j. illine hepar, & renes. Ad vlcus vesicæ.
 ℞. mucc. sebesten, & sem. cytoniorum añ. ℥.iiij. pe-
 nidiarum ℥.iiij. sacchari lib. s. cum puluere sequenti
 fiat elec. ℞. se. acetosæ, scariolæ, endiuia, portulacæ,
 añ. 3. ij. spodij 3. j. tragacanthæ, gummi arab. & cera-
 forum añ. 3. ij. granorum sisamini, nuclei sem. citri
 añ. ℥.j. adde ℥.iiij. vini granatorum dulcium, dosis
 ℥. s. sumat ter in die.

Ad vlcus vesicæ ardoris causâ. Loch de papa.
 diadrag. frigidi añ. ℥. s. boliarmeniæ ori. 3. j. cum sy-
 rupo violato fiat elec. Detersium aquæ hordei ℥.
 iiij. zucchari albissimi ℥.j. fiat collyrium, iniice per
 syringam. Lac vaccinum calidum ab vbere inie-
 ctum detergit, & consolidat. Aliud. aquæ 4. albu-
 minum ouorum agitatorum, boli arm. sang. dra. añ.
 3. ij. muccaginis sem. psylli, lactis muliebris añ. ℥.ij.
 fiat collyrium. Ad idem. ℞. rosarum, malicorei, ba-
 laustie, sumac añ. 3. j. s. thuris 3. j. boliarm. sang. dra.
 añ. 3. s. fiat puluis, & cum aquato ouorum fiat illi-
 tio in regione vesicæ. Anodynum. ℞. lactis seminũ
 frigidorum ex aqua solatri extracti lib. s. muccagi-
 nis sem. psylli, maluarum, altheæ, se. lini, cytoniorũ
 ℥.iiij. olei nenupharis ℥.j. in quibus dissolue opij,

croci, sem. alterci, canforę añ. granum vnũ, fiat collyrium. Vel tere se. alterci album, & sem. papaueris albi cum aqua rosarum, & aqua albuminũ ouorũ cõcussorum cum lacte muliebri, & grano vno opij fiat colly. & succorũ endiuix, lactucę, equiseti depuratorum añ. ℥.iiij. adde succi cucumeris, emulsionis seminum communium frigidorum, aquę violarum añ. ℥.ij. cum zuccharo puro fiat sy. longus. Confert etiam sy. iuiubinus, myrtinus, & puluis qui recipit, succi liquiritiæ, tragachantę, gummi arabici, amyli, spodij, boli armenię, añ. 3. ij. zucchari ℥.ij. serua ad vsum, syrupus tussilaginis Pedemontani vtilis est. Ad vlcus vesicę aqua ex fero caprino stillatitia pota, vtilissima est, testibus Mose, & Guidone, puluis hyppuris siccę cum syrupo myrtino, & mucagine psylli, & cũ aqua liquiritię potus. Aqua chalybata pota vrinę vlceribus remediatur. Scribonius. Armenicus bolus cum vino potus, herba hyppuris, & graminis cũ vino bibita potio vlceribus vesicę cõueniens, succi plantaginis vtriusque symphyti añ. lib. j. aquę ros. lib. 8. sacchari lib. ij. compositę potioni adde rosam, santali puluerẽ cũ exiguo canphorę & aqua vesicarię, dosis ℥.ij. Efficax & vltimũ remediũ est, aqua thermarũ Lucensium pota, pastilli alkekengi Rasis descripti in antidotario suo. Collyrium ex muc. se. psyl. maluarum, se. cotoneorũ se. lini cum 3. j. sief albi, & lacte mu

mulieris. Aliud. cum lacte mulieris mucc. psylli, & camphora. Aliud fit ex succo hyppuris, & momiæ Rasis, qui iniicere acetum tepidū in vesicam consulit, & statim dolorem mitigat, vt ait. cont. modò acetum non sit adeò acre. Collyrium ex aqua vitæ remissę facultatis vtile est, teste Barzizio. Aqua florū hyperici extillata opifera est. Benefacit aqua vitæ in qua macerantur hyppuris, flores hyperici, plantago, mumia, camphora, vel tro. alkekengi M.

Ad vlcus vesicæ cum strāguria. R. aquæ florum fabarum ℥.iiij. aquæ nenupharis, & rosarum añ. ℥. ij. aquæ plantaginis ℥.j. cerusæ lotæ in aqua rosarū, & postea in aqua plantaginis ℥.s. camphoræ 3. j. fiat colly. Aliud fit ex aqua albuminis oui cum lacte, & semine papa. albi. Aliud muccaginis se. psylli, cotoneor. althææ, & seminum communium frigidorum, cum aqua albuminis oui, lacte mulieris, cerusa, gummi arabico, se. alterci 3. j. radicis cōsolidæ minoris coctæ in iusculis capi sine sale ℥.j. in mortario plumbi fiat collyrium. Ad penis dolorem vehementem. R. albumina 4. ouorum recens. infunde in acetū postea totum infunde in calice pleno aqua frigida cum 3. j. pulueris camphoræ, imponat pudendum in hoc balneo. statim dolorem leuat.

Ad

D 3

Ad sanguinis ex vesica eruptionem. CAP. V.

Niice per syringam succum arnoglossæ,
vel aquam virgæ pastoris, & portulacæ,
vel decoctum ex sumac, rosis, myrto. Illi-
natur regio affecta astringentibus, ut
sunt bolus armenia, terra sigillata, sang. dra. gummi,
& tragachanta, balaustia, rosa, myrtus. Ad mictum
sanguinis cum vrina, ex plaga vesicæ, aut pudendi,
& rob. de vino, & bulliat donec coaguletur, sume
de eo lib. j. & misce cum farina filiginis, da quotidie
mane ieiuno stomacho 3. v.

De stranguria. CAP. VI.

Excretio vrinæ est actio naturalis vesicæ
& non voluntaria, quæ trifariam leditur:
nam deprauatur in stranguria, minuitur
dysuria siue dyschuria, aboletur in ischu-
ria. Est ergo *ἰσχυρία* passio in qua vrina in totū sup-
primitur, *δυσουρία* malum est in quo vrina ægrè, &
& difficulter admodum redditur, *σπαγγουρία* est vri-
næ stillatim expressio.

Στραγγουρία, id est, vrinæ stillicidiū ab *ὄυρου* vrina,
& *σπαγγίζειν* quod est colare, & vi guttulas expri-
mere. Quum aliquis parum & frequenter mingit,
hæc passio strāguria nominatur, etiā si guttatim nō
meiat, ut adnotauit Braslauolus, vir egregiè doctus.

Cau

Causa. affectus vesicæ vti est vesicæ imbecillitas, vel accidens est : nam quæ ob urinæ acrimoniam efficitur, accidens est vesicæ, affectus verò minime. Sunt aut vesicæ affectus *πάρεσις*, *λιθίασις*, *πυτίριασις*, *έλκωσις*, id est, urina sponte profluens, calculus, furfures, exulceratio, vt Herodotus numerat. his adiunge minus proprios, veluti sunt dyscrasie, inflammationes, tumoresq; præter naturam : nam actio instrumēti læditur affecta parte similari à qua fit actio, vel ad actionem vtili, vel instrumēto ipso. Stranguriam facit potentie retentricis in vesica imbecillitas, quæ ob dyscrasiam fit præsertim frigidam. Ergo à paresi stranguria. Ex meatus obstructione stranguria: ergo à lithiasi, & à grumo. Ex continuo irritamēto expultricis, stranguria : ergo à pytiriasis, & helcosi, quæ sunt præsentis causæ expultricem continuò stimulant, nempe pytiriasis scabiem vesicæ significat, stranguria ob vlcus, ob inflammationem vel abscessum vesicæ à dyscrasia ab aëre autumnali facta. Item ob expultricis quæ in vesica est imbecillitatē, quæ infirmitas ex dyscrasia contingit. Itaque ob longam urinæ retentionem vesicæ repletio, indeq; stranguria incidit. Vesica enim extensa urinā guttatim emittit. Insuper à rekti intestini vel vteri tumore, vesicæ compressio, & consequenter stranguria efficitur, hæc autem per consensum. Porro urine acrimonia propter renum

passionem efficitur, vel ab acri, & serosa venarum superfluitate. Vrinæ acritudo fit magis à dyscrasia calida, post hanc à calida & humida, tertio ab humida.

Digno. ab essentia ratione petenda, ex lotij qualitate, & consistentia, & rebus cum eo excretis, ex imi ventris pectinis, & perinei dolore. est autē perineum pars inter anū, & testes. Vrinæ acrimonia ex hominis ætate, tēperie, & excrementis facile intelligitur. Si autem indolens fuerit stranguria, & inuita, coniectura est eam contingere ab retentricis vel expultricis imbecillitate, aut ob resolutū colli vesicæ musculum sphincterem.

Præfag. In siccitatibus stranguriæ fiunt: quia biliosi hu. generantur, vt ait Philotheus. autūno fiunt: quia vesica ab inæquali dyscrasia alteratur. Ex strāguria ileo superueniente pereunt in 7. diebus, nisi febris superueniente satis vrina fluxerit. Vrinæ acrimonia perseverans meatuum vrinæ exulcerationem minatur.

Metho. m. stranguria curatur per ea, quæ causæ ipsius sunt contraria, modò isthæc oportunè adhibeantur, hoc autem est, in qualitate, & quantitate, vtendiq; modo, ac occasione.

Remedia. primū succi mordaces minutè vacuandi sunt, sanguinis missione, vel decenti purgatione, mox eos apparare, & reuellere à viis vesicæ
opor

oportet sequentibus auxiliis. R. atramenti, calami
dul. ʒ. j. mannæ puræ ʒ. s. cum zuccharo fiat bo-
nus. R. sy. violati ʒ. j. sy. de nenuphare ʒ. s. decocti
pquir. iuiubarum, sebesten colati ʒ. iij. misce pro
vna dosi. repetatur. Ab his expurganda materia est
per cholagoga, qualia sunt dilutum rhabarbari, syr.
rosatus catharticus, diaprunū simplex, diasebesten
sine dacridio, elect. rosatum M. Ad pituitam falsam
conuenit therebinthinæ lotæ ʒ. s. Deinde mate-
ria auerti debet clysmis mollibus, vomitibus, fri-
ctionibus brachiorum, & fœmorum, balneo aquæ
dulcis calido, sudoribus, & hæmorrhoidum resera-
tione, & interiorū venarū, hoc est, poplitū, aut mal-
leolorum incisione: quæadmodū enim omnes supe-
riores thoracis partes in cubito secta vena iuuatur,
sic quæ his inferiores sunt, illis quæ per poplites &
malleolos decurrunt. Ad reprimendum humorum
acrimoniam puluis Mansoris porrigendus est, qui
cōponitur ex seminibus frigidis maioribus, & mi-
noribus cum saccharo albo, & ʒ. ij. se. alterci albi,
dosis ʒ. iij. mane, & vesperi propinentur. R. syr. de
papa. sy. nymphææ añ. ʒ. vj. aquæ violarum ʒ. iij. R.
aquæ maluæ ʒ. iij. syr. viol. ʒ. ij. m. & repetatur per
septē dies. De his quæ vlcus detergant citra mole-
stiā, est aqua hordei calida cum zuccharo albissimo
per syringā iniecta. Aliud aquæ lactis lib. s. sacchari
albissimi ʒ. v. misce ad ignem, & liquor actu cali-
dus

D S

dus

dus iniiciatur. Lac vaccinū calidum ab vbere im-
 missum dolorem lenit, detergit, consolidat. Aliud.
 albumina ouorum quatuor cōcussū in aquam ver-
 sa, boli armenia, sang. dra. añ. ℥.ij. muccag. psylli, la-
 ctis muliebris añ. ℥.ij. iniiciatur per syringam, actu
 calidam. ℞. aq. nenupharis violarum, rosarū añ. ℥.
 iij. succi solarii ℥.ij. semperuiui ℥.j. olei nenupharis
 & violarum añ. 3. vj. lactis mulieris ℥.ij. fiat epithe-
 ma in sumine, & perineo. Aliud. rosarum, malico-
 rei, balaustia, sumac añ. 3. j. s. thuris 3. s. boli arm.
 sang. dra. añ. 3. s. fiat puluis, & cum albuminibus
 ouorum illinantur loca dicta: vlcus consolidat. Vl-
 cera renū, & vesicæ cōglutinant radix pentaphylli,
 hyppuris, mumia, tragachanta. Ad stranguriam lin-
 gua anseris ebibita est mirabilis, vt aiunt. Locusta-
 rum suffitu stranguriæ maximè mulierum iuuatur.
 Sanguis vulpis calidus super renes, pectine, & geni-
 talia sæpius illitus calculos frangit, & stranguriam
 soluit. Eam quoque soluit argentum viuum cum
 lacte per virgā cathathere immissum, vt apud
 N. Alex. scriptum est.

In victus ratione æger abstineat à salsis, acidis, &
 acris cibis, vtatur verò eduliis humectantibus ac
 aluum emollientibus, herbis preparatis, & iusculis,
 & aqua chalybata.

Ad stranguriam ob siccitam vesicam vel ab-
 sumptam prostaticarum humiditatem quæ semini
 viam

iam sternit alimento pleniore, & crasso opus est.
 .olei nenupharis, medullæ crurum vituli dissolu-
 e in oleo amygdulicium & lacte muliebri añ. ʒ. ij.
 at collyrium, quod per syringam tepidum im-
 mittatur. Illinatur tota vesicæ regio vnguento re-
 imptiuo recens facto vel sequenti, quod recipit
 gummi tragacanthi, gūmi arabici añ. ʒ. j. fiat muc-
 ago ex aqua rosacea, cui addatur olei violati ʒ. j.
 & butyri rec. ʒ. vj. & in mortario cū lacte muliebri
 fiat linimentum.

De ischuria.

CAP. VII.

Vrinæ suppressæ causa vel est in vesica,
 vel in vrinæ meatu. In vesica quidē est,
 imbecillitas ab intemperie, vel tensio ex
 lotij repletionē, inflammatio, obtusus
 sensus, affectus per consensum spinæ ictæ, aut luxa-
 tæ. In meatu verò cōstrictio, stipatio, angustia: hæc
 autem contingunt obstructione à lapide, ab hu-
 more crasso, & lento, à grumo, aut pure, à re præter
 naturam meatui innata, vt caruncula, verruca, aut
 ex tumore præter naturam. Ischuriā efficit corium
 virgæ carnis, si Rasio credimus.

Curatur per ea, quæ causæ ipsius sunt contraria.
 vesicæ plenitudo vacuatur ferramento quod *lædētē*
tripe nominant, modum demittendi docet Paulus.
 De remediis sunt antidotum hæmagogū, & musa
 ænea

ænea N. De assumendis vrinam prouocant aqua
 agrimonix & sparagorum pota, succus millefolii
 cum aceto haustus, syr. factus ex succo verbenæ cum
 saccharo, & rha. decoctio radicum acori pota. R.
 aquæ stillaticix ex cepa alba ℥.iij. cum zuccharo
 fiat potio. Aliud. R. hordei adianti albi añ. p. iij. fe-
 bestem iuiubarum añ. x. rad. dulcis rasæ ℥. s. semi-
 num frigidorum maiorum ℥. j. rad. vrticæ ℥. s.
 grana alkekengi sex, croci ℥. s. fiat decoctio colata,
 de qua sumat lib. s. mane. Aliud. elixetur gallina
 vel capus cum petrosilio ad separationem ossium
 à carne. R. huius iusculi lib. s. pulueris resinæ pini
 ℥. ij. bibatur, ilico mingere facit. Succus è granis ve-
 sicariæ expressus, & siccatus in vmbra, ad ciendam
 vrinam sumitur. Difficultatibus vrinæ succinū po-
 tum alligatumq; prodest. R. pulueris testarum li-
 macum ℥. ij. ex aqua potum vrinam cit. Ischuriam
 quæ à crassis humoribus nascitur, sanat suffitus ex
 locustis factus, vt ait Razes, opitulatur etiam ex pi-
 lis capræ suffumigatio. Ad difficulter mingentes
 capillos cerui suffumigato, & confestim minget.
 Myrep. Emplastrum ex parietaria, senatio, & capite
 alliorum in vino coctis pectini admotum, mirabile
 dicitur. Allium pistum glandi in pudēdo alligatum
 vrinam statim mouet. Idem facit choclea integra,
 pista, in linteo detricto glandi colis alligata. Aliud.
 parietariæ, graminis, rubiæ maioris añ. m. j. rad. cypre

cyperi ꝑ. j. pista in vino albo coquatur, & fiat empl.
 Aliud. parietariæ, mercurialis, maluæ, altheæ, gra-
 ninis, florū chamæmeli, añ. m. j. cretani, saxifragiæ
 añ. m. s. fiat decoctio in hydreleo, fiat fots, & de
 fece empl. adde adipem cuniculi, oleum scorpio-
 num, cinamomum, crocum, cassiam ligneam.

De diabete.

CAP. VIII.

Diabetes est vrinæ profluuium, & passio
 talis, qualis est circa aluum lienteria. fit
 autem quum venarū succos in serosam
 saniem resolutos renes trahunt, & ad ve-
 sicam transfundunt. Itaque frequentis vrinæ causa
 est humida intemperies, aut retentrix imbecilla.
 Diabetes, inquit Aretæus, est carniū ac membro-
 rum in vrinam colliquatio, qua affecti nō diu du-
 rant. Mirum de puella Mediolanensi, quæ plus vri-
 næ emittebat quàm ponderaret. Causam esse aërē
 in arteriis cōuersum in aquam dicebat Marlianus,
 sed diabetes est proprius renū affectus, qui ab eo-
 rum imbecillitate prouenit, vel ab meatuum vrine
 dilatatione, aut à vehementi algore aquositatem
 exprimēte, vel ab immodica renum caliditate, per
 quam vehemens fit attractio, ab hac causa, vt plu-
 rimum incidit, vt Auicennæ placet. Quapropter
 eius curatio est infrigidatio, & humectatio, primū
 hepatis, & renum dyscrafia alteranda per assumen-
 da,

da, & admouenda. ℞. sy. è rosis siccis, myrtini, & d. spodij corallini, succo oxalydis añ. 3. & pul. coralli 3. j. aquæ plantagininis, endiuix, buglossæ, añ. 3. j. misce pro vniuersali doli, repetatur. Ab his materia purganda per hydragoga, qualis est syrupus rosatus catharticus cum decocto corticum myrob. citrearū soldanæ plantag. & sem. anisi, & passularum. ℞. cōseruæ rosarum antiquæ, diacotonei saccharacei añ. 3. ij. spodij 3. ij. coralli 3. j. corticū myro. cyt. 3. j. cum succo cyto. conditum de quo sumat ieiunus. Vel ℞. tro. de spodio cum sem. acetosæ 3. iij. fiat puluis & cum succo cytoniorum formetur catapotia, sumat iij. per horam ante prandium quando non sumit de cōdito. Aliud. ℞. rosarum spodij añ. 3. v. se. portul. succi liq. boli armenix, sumac añ. 3. j. sem. lactucæ, coriandri, berberis, fantali rub. añ. 3. & tragacanthæ, gummi arab. balaustix añ. 3. j. camphoræ 3. j. cum succo granatorum acidorum fiant pastilli, de quibus sumat ieiunus 3. j. & vesperi tantumdem cum sy. rosato diluto aqua frigida. Porro si affectio augeat, non erit absurdū vti narcoticis. ℞. diapapaueris 3. ij. cōseruæ rosarum veteris 3. j. misce. sumat instar castanæ. vel ℞. cōseruæ ros. 3. j. philonei perfici 3. ij. misce. sumat 3. j. ℞. santalorum alb. & rub. rosarum, gummi arab. spodij, sumac, balaustix, acaciæ, hypocistidis añ. 3. & fiat pul. & cum aqua ros. fiat epithema ad renes. Aliud. olei ros. myrt. cito. añ. 3. j. spo

spodij coralli fantal. alb. & rub. añ. 3. j. cum succo plant. & semperuiuæ, & cera pura fiat linimentum pro renibus. Aliud. rosacei olei, violati, & mandragoræ, succi vmbilici veneris aceti albi añ. 3. iij. farinæ rosarū, myrti, fantali albi, & rub. añ. 3. j. cum cera alba fiat emplastrum pro renibus.

Diætēmata ne facile attrahantur crassa esse debent, sed mediocriter crassa, vt concoqui possint, ne ve cruditates pariant, sintq; boni succi, vt sunt similago, halica, oryza, caro suilla macra, caro perdicis, turturis, columborū, gallinarum, phasidis, assa vel frixa potius quàm elixa, caseus recens sine sale, lac chalybatū, cytonium coctum & castaneæ. Vinum crassum dilutū aqua ferrosa corporis miscellā ad dulcorem permutat vinum, vt ait Aetius.

De vesicæ lithiasi.

CAP. IX.

Efficiens causa est ignea vesicæ caliditas. Vrina retenta lapidem solet generare. Idcirco mirum non est si scribere assueti, ludo, vel lectionibus, eo morbo corripiuntur.

Digno. vrina cruda, & subalbida, cui subsidet arenosum, pruritus, & tensio crebra pudendi, stillicidioq; vexantur. huc referenda est præcedens vitus ratio.

Prælag. Qui maiores calculos habent, facile san-

nantur: quia inflammationibus assueuerunt. Qui minores habet, difficulter curantur contrarias ob causas. Vesicæ calculus manuum opera duntaxat curatur. 6. epi. com. 5.

Remedia. cineris leporis 3. ij. sumat ex vino albo. Iaspis potui datus vesicæ calculos dissipat: puluis vitri cōbusti ex vino potus. potus ex medulla agni lapidem frangit. Aqua è succo limonis extillata à ieiuno pota, & in pectine illita lapidem frangit. Idem efficit aqua è cepa alba extillata, pota aqua Arnaldi 2. breuiarij, huc pertinet elect. de cicadis, & puluis Manlij, elect. de cineribus Clement. elect. de lepore combusto. Monta. Lithou trypticon & iustinum. N. elec. vitale Clem. elect. Monta. conf. 182. R. sanguinis hirci, & vulpis añ. 3. j. puluis lapidis iudaici 3. ij. & cum succo limonum fiat linimentum, quo illine regionem vesicæ. Tecolythes cum aqua subactus ad glutinis consistentiam, & sumini ac pubi applicatus, vesicæ calculos frangit. Iniectiones fiunt per catheterem ex puluere tecolithi vel lapidum cancerorum, vel ex aqua è succo mercurialis cum puluere vitri extillata. Sanguis recens vulpis potus, & pudendo illitus, statim per vrinam lapidem eiicit. Lapidem contereutes compositiones nouem, apud Myrep. Ad lapidem confirmatum lapid. lyncis puluerati 3. ij. bulliat in petroleo, & colatum iniice per syringuam, sed prius collis fou

lis fouendus ex maluarum decocto. herba cretanelixa pectini admouetur. Adamas lapidem conterit in stili summitate positus, Sera. Auer.

Ad vrinae fluxum.

CAP. X.

HOs qui lotium continere nequeunt, aqua è sorbis pota continuis diebus sanat, sed modum seruato. Vel ℞. aquæ foliorum consolidæ mediæ lib. j. sumat ℥. iiij. pro dosi, de tertio in tertium. Aliud. mala punica recentia, integra, contusa, extillētur, in meta vitrea. ℞. huius liquoris ℥. iiij. pulueris membranæ carni castaneæ hærentis 3. j. candi ℥. s. sumat in aurora, & ante cœnam per horam. Vel sumat quotidie ℥. j. pulueris glandium assatarum, cum aqua in qua scoria ferri præparata, decocta sit. ℞. baccarū myrti, glandium assatarū, mānæ, thuris, cumini, cyperi añ. ℥. j. fiat puluis, sumat 3. iiij. cum vino veteri, vel in vino in quo macerati sint calyces glandium, semen myrti, sumac, & balaustium.

De colico dolore.

CAP. XI.

Intestinum singulari numero prolatum colon dicitur. 6. epi igitur *κολικὴ*, id est, colica, est intestini dolor. Colon inuisum morbi genus, apud Serenū, telum apud eundem ventris dolor est, Strophus ventris dolor.

TO. III.

E

Vege

Vegetio, leparæ sunt ventris dolores. 6. epi. sed hi affectus non multum à colica differunt.

Causa externa, mala victus ratio, scamonea, lues seu contagium: nam vi pestifera colica quâdoque regiones, & prouincias occupat, letiferaq; contagia imitatur, vt narrat Aegineta. Coli dolor ex obturatione facta à scybalis. De reliquis internis occasionibus sunt crassi & pituitosi humores, intra coli membranulas subsidentes. Item flatulenti spiritus, quibus non est exitus. Fit etiã colica propter acres, & erodentes humores, qui intestinum infestant, aliquando inflammationem sequitur, quæ intestinum distendit, ac male habet. Interdum efficitur per consensum ventriculi, hepatis, lienis, cerebri, pulmonum, quæ partes excrementa sua ad *κωλον* transmittunt. Insuper efficitur à renum vesicæ ac vteri præter naturam tumore, colum vel intestina premente.

Digno. Quum adest torsio, punctura, & vrina tincta, colica adest, vrina autem tingitur: quia bilis regurgitat ad vias vrinales, vt ait Gord. tamen colici doloris agnitio coniecturalis. 1 2. ther. est autem difficilis cognitu propter vicinitatē locorum, qui iisdem omnium doloribus subinde tentantur. Gal. ipse colica deceptus, vt fatetur 2. de loc. aff. nam similitudines eruditis etiam medicis errores ambiguitatesq; pariūt. Colicam magna ex parte præcedit

cedit cruditas, spiritus flatuosus, vomitus, nausea inanis, & in præcordiis mordacitas, & fastidiū. Eius signa sunt inflatio quædam, & extensio, & flatus complures, & tormina, & excrementa flatibus plena, quin etiam cibi tum cupiditas tum concoctio deterior euadit, intueri etiam oportet præcedentia & præsentia, & ea quæ per communitatem consequuntur. Causarum indicia ducuntur à doloris specie, & ab excretis: nam pituitā vitream arguit dolor qualis à calculo aspero vreteris infixo fit, deprehenditur etiam ex huiusmodi humoris excretionē. Dolor mordax mordacis, & biliosi humoris nota est, reliqua sumuntur à ieiunantibus, & nocētibus. Causæ enim exasperantur remediis sumptis, iniectis, admotisq; similibus, & remittuntur contrariis. Itaque in doloribus cuiuscunque partis duo sunt consideranda, doloris species, & vehementia, hæc enim faciunt ad patientis loci noticiam, ad prælagiendum, & ad curationis inuentionem. Nempe dolor colicus à crasso, aut viscoso humore, aut flatulento spiritu in corpore crasso, densoque genito, sed egredi nequeunte, dolorem excitat vehementem, ob geminam causam, dyscrasiam scilicet, & corporum quibus continetur tensionem. Longum verò quia difficulter euacuatur: quoniam corpora ambientia ob crassitudinem tum spissitudinem ipsum arcere possunt.

Præſag. Colicus dolor ſæpenumero duobus diebus perpetuis cruciare ſolet. Ceſſat verò vbi articularis morbus incipit. Interdumq; articulari morbo ſanato, reddit colica, hæc quandoq; finitur in paralyſim, epilepſiam, melancholiam, & arthritidem, vt præſagiunt Aliab. & Auic. Ob capitis dolorem vehementẽ nemo vnquàm animi deliquio compræhenſus, mortuus eſt, neque ſe ipſum occidit, quemadmodum quidam coli dolore vexati fecerunt. Colicam ortam à ſpiritu vel phlegmate ſanat febricula. Dolores vëtris ſublimẽs, id eſt, in ſuperficie, leuioreſ, qui verò non ſublimẽs, fortiores.

Metho. m. Colicus dolor citò curandus, ne ob vehementiam vires proſternat. Curatur autem remediis cauſam auferëtibus, ſimul enim cum cauſa ablata dolor ceſſat, deſinit etiam imminuto vel adempto ſenſu per anodyna, quę duplicia ſunt, vera & narcotica. Illa ſi moram trahunt, ſpiritus, & ſubſtantiam corporis digerunt, & diſſoluunt, hæc verò vim ſentiendi obtorpeſcere faciunt. Affectus qui in craſſis ſunt inteſtinis, ſumpta à poſitu indicatione, hiſ quæ per ſedem iniiciuntur remediis magis egent. Inteſtinorum dolores vbicūque ſint, iuuantur à bibitis, & per ſedem iniectis medicamentis. Obſtructio quæ fit à ſcybalo habet duricie remedium ex humidis pinguibusq; clyſmis, demũ ex acribus, euacuationẽ expoſcit. Dolores à craſſis
ſuc

succis producti, per ea quæ incidunt, concoquunt, & flatus discutiunt, citra valentem calfactionē curandi sunt: nam metuendum est à calore qui eos liquet, & in flatus vertat, & nō valeat discutere. Dolores à succis mordētibus postulant, vt ea quæ contristant vacuentur, aut alterētur, aut narcoticis retundantur. Si dolor à tenui acriq; succo in intestinis cōtento excitetur, iniicere per sedem oportet, quod blandè eluere, detergere huiusmodi humorē possit. Dolores à flatuoso spiritu, curantur per digerentia, & extenuantia. Cucurbitula quoque admoda illico à dolore liberat, postea euacuādus humor infuso per sedem medicamento calfaciente, & attenuante, quod si etiam tum dolores permanserint, vti philonio ne dubites.

Remedia. ℞. maluarum, mercurialis, florū chamæ. anethi, añ. m. j. iuris ex decocto intestinorum, lib. j. s. hieræ picræ, loch de cassia añ. 3. vj. olei cōmunis ℥. j. fiat clyster, sed in colica clyisma ieiunis non iniiciendum, vt monet Valerianus. Aliud loch de cassia ℥. j. benedictæ simpl. ℥. s. hieræ picræ 3. ij. pul. elec. de baccis lauri 3. iij. olei chamæmeli, liliaci, & nardini añ. ℥. j. vitellum vnum oui, salis ℥. s. iniiciatur. Infusum Aetij laudatur, quod recipit decoctum lini, & fœnugræci, lib. j. cœsipi ℥. ij. misce. Aliud iusculi carnis lib. j. s. in quo elixetur se. anisi, & cari añ. ℥. s. colatur. adde adipis anseris, & gal-

linæ

linæ añ. ℥.j. olei chamæmeli ℥.ij. philonij rom. ℥.j.
 fiat enema. ℞. se. anisi ℥.ij. fimi recētis asini ℥.j. fur-
 furis m.j. bulliant in vino albo dulci, colaturæ adde
 ol. chamæ. ℥.iiij. ol. de cappa. ℥.s. fiat clysmus. Aliud
 vini albi vinosi lib.j. olei communis ℥.v. butyri rec.
 ℥.iiij. luteum oui, salis ℥.iiij. sacchari rub. ℥.j. impo-
 natur tepidum iusculum galli veteris exenterati
 cum fartura ex polypodio, & cartano facta potum,
 caroq; comesta maximum est remedium: nam de-
 turbat humores lentos, & crassos, & flatus dissipat.
 Aliud. ℞. iusculi galli decrepiti flagellati lib.j. poly-
 podij ℥.iiij. anethi m. s. sem. cartami contusi ℥.s.
 salis ℥.iiij. sumat ℥.viiij. ℞. medullæ cartani ℥.j. cari-
 cas albas, & pingues iij. passerum è corintho ℥.ij.
 penidiarum ℥.s. sumat cum iusculo carnis. ℞. dia-
 phœnici ℥.s. philonij ℥.j. cū zuccharo fiat bolus.
 huc refer elect. de gallia Manforis. Indum, maius, &
 minus, elect. alescof, diacydonium, pil. agg. maio,
 ℞. præcipitati grana ij. diacymini ℥.j. cum syrupo
 de duabus radicibus fiant pil. iij. deauratæ, quas su-
 mat præassumpta leui cibatione: nam statim mor-
 bosum humorem vomitu vel deiectione purgat.
 Refertur hoc auxilium ad Aeginetam, Razim, &
 Vigo. Potio ex cochlea Scribonij, & elec. vitæ Vita-
 lis, salubria sunt, pulvis momordicę sumptus statim
 sanat colicam, idem præstat serpentina herba, apud
 Sardum. ℞. cymini puluerati ℥.ij. sumat ex vino. ℞.
 inte

intestini lupi 3.ij. cornus cerui 3.j. fimi albi lupi 3.
s. croci 3. s. sacchari 3.ij. f. puluis, puluis ossium re-
pertorum in fimo lupi potus omnem colicam sa-
nat. & terebinthinæ lotæ cum aqua fœniculi 3.vj.
sy. de ij. radicibus sine aceto 3.x. fimi asini lactantis
siccati 3.j. s. croci 3.ij. fœniculi dul. 3.j. fiat potio,
quam sumat ieiuno stomacho. Coagulum catuli
cum vino statim sanat colicam, Rasis. Lapæ pur-
pureæ flores ex vino dantur. In desperatis subuenit
album quod inest in fimo gallinaceo. ex vino me-
raciore bibitur. Marubium in vino mulso decoctū
bibendum præbe, liberabitur, neque vnquā postea
incidit in affectionem, vt asserit Act. Aqua in qua
siccum cerui genitale lotum sit, pota sanat colicam
& dysuriam. Idem efficit catuli coagulum ad 3.j. ex
vino pota. Ras. aut pauidi leporis madefacta coagu-
la pota, vt canit Serenus. Alauda auis simplici iure
elixa coli cruciatibus opitulatur, assumi autem cō-
tinuè, & sæpe cū ipso iure debet, ex Marcello, Dio.
Serenus, Aegineta. datur salubriter pilula vna de cy-
noglossa. Membrana intersepiens nucis iuglandis
nucleū puluerata, ex vino albo pota sanat colicam.
Ad colicam à flatu. & zinz. piperis añ. 3. s. ciperi,
mastichæ añ. 3.j. sacchari 3.ij. fiat puluis, sumat 3.
ij. cum calida. Ad idem opitulantur calcanei bru-
torum combusti Ras. & fimum lupi album cum
zuccharo sumptum. Fomenta calida quæ corpus

quouis modo calfaciunt doloribus sæpiusculè ad-
iumento sunt: quia cutem ad perspirationes rario-
rem efficiūt, siue humida sunt, siue sicca, siue mista
sint. ℞. furfuris contusi, florum chamæ. meliloti añ.
m. j. farinæ tabarum ℥. j. croci 3. s. bulliant cum sa-
pa, & addito oleo anethi, chamæ. f. cataplasma pro
dolore. fots etiam è chamæmelino oleo, & mera-
co vino calidus dolores omnium partium corpo-
ris cōpescit. Contra flatus, & dolores frigidos ven-
tris, & vteri. ℞. olei anethi lib. ℥. se. agni, se. rutæ añ.
℥. j. s. cinamomi 3. iij. lento igne coquantur, & illi-
ne. Sacculus ex milio & sale torrefactis cum farina
florum chamæmeli calidus adapplicatur. pedes in
aqua calidissima quàm diutissimè tenere torsiones
sanat. Ad torminosos. venter anatis viux dolori
appositus, sanat, transit enim morbus in auem, eaq;
moritur. Rana viua ventri adposita transfert ad se
malum. Catuli lactantes ventri admoti, transferunt
in se malum, & moriuntur, si credimus Marcello.

Amuleta. fimum lupi potum vel suspensum sa-
nat. i o. simpl. vmbilicus infantis præcisus, & in an-
nulo argenteo gestatus ita, vt carnem tangat. Cor-
rigia ex pelle canis. Talus leporis suspensus vel li-
gatus ad ventrem. Sext. ad colicam, & iliacam con-
fert corrigia de dorso lupi cincta, Arnal. sedere su-
per corium lupi, & eo stringere ventrem confert,
Rasis. physicum remedium est vmbilicus gestatus,
Trall.

Trall. in armila. N. Alex.

Ad calculi morbum colico complicatum, iniiciuntur clysmi anodynini, admouentur foci, & cataplasmata anodyna, & sumat tribus diebus omni mane ℥.j. s. mannae purae cum butyro rec. & decocto se. maluae. Vel ℞. anisi, maratri, cari, cumini añ. 3. j. coriand. præpa. 3. s. liqui. se. bardanae añ. 3. j. s. cinamomi, galangae añ. 3. j. sem. folis se. genistae añ. 3. j. pul. diadrag. frig. 3. ij. dacrydij 3. j. mastichae 3. s. senae ori, ad pondus omniū fiat pul. dosis 3. j. ex iusculo cicerum. Confert etiam zona ex lupi corio secundum carnem cincta. Briel. Aliud. ℞. turbit dacrydij añ. 3. iij. gary. cinamomi, zinz. myrob. emblicorum conditorum, nucis moschatae, polypodij añ. 3. iij. sacchari soluti in aqua fœniculi q. s. fiat elec. dosis à 3. ij. vsq; ad 3. iij. educit excrementa à toto corpore, & digerit flatus.

Ad colicam inflammationi adiunctam vena in cubito aperienda est. Si verò urinae difficultas superet, ex maleolo sanguis detrahendus, prædictis vtendum remediis exceptis acribus, & vehemēter purgantibus, clysmis lenientibus, item cataplasmatibus, & irrigationibus, & in oleum descensu vtendum. ℞. folia maluarum tenera, & violariae añ. m. iij. bulliant in aqua, & colentur, pista cum oleo violato malaxentur, & supra totā regionem intestinorum applicentur, nec diu morentur: quia superflue sol-

uer

uerent, relaxat, emollit, & lubricat. Victus autem ratio tenuis, & ferè febricitantium donec inflammatio soluatur.

Ad colicam cum febre, principiò fomentum siccum ex milio adhibendum est, deinde per sedem infundere oportet oleum in quo semen aliquod, quod flatum dissipet, incoctum sit, cum anseris, aut gallinæ seuo, nec falso, nec veteri. Si verò ex hoc non remittatur dolor, secundò rursus iniiciendum est idem, adiectiundo succi papaueris 3.j. castorei 3.s. Glandes etiam fieri possunt ex hoc medicamento, quæ appensæ forti filo in rectum intestinum inferi debent.

De voluulo siue ileo, vnde ileosi. CAP. XII.

CHordapfos etiam dicitur, quòd non aliter quàm chordæ intestina tendantur: nam veteres intestina chordas vocauerunt, estq; omnium intestinorum vexatio. Differentiæ eius plures. in sublimibus intestinis consedit, vel crassis, graueolentus, non male olens. Prior dicitur de eo, in quo stercus euomitur; deinde si graueolens fuerit respiratio, tertio si ructus, quarto si flatus, quinto si graueolens sit corpus. Ileos est vomitus stercoris, vt definiuit Philotheus, scilicet pessimus: nam quandoque ileos est sine vomitu. Si obstructio sit in parte superiori gracilioris intest

intestini, exit cibus per vomitum, si in parte inferiori, exit stercus, vt docet Cel. stercus hic inauditur etiã de cibo corrupto, qui futurus erat stercus.

Causa. fit ab inflammatione intestinorum tenuium, interdum ab obstructione aridi stercoris, nonnunquam à crassis humoribus, & tenacibus. Oboritur etiam ex plagis, & ictibus circa tenue intestinum, ob intestinum vna cum stercore in ^{*}scrotum. ^{*}scrotum. tum delapsum, à fungis comestis, ex frigore vehementi, ex frigida potione, post sudores.

Digno. In ileis nihil descendit ad inferiora, & hoc est proprium, & inseparabile passionis. Vomitum non semper adest, sed quando exitiales sunt. Tumor, & durities circa tenue intestinum tactu sentitur, ad chordę similitudinem. Inde dolores vehementes, & tormina impendio molesta.

Præfag. omnis ileos periculosus, sed deterior qui in sublimibus intestinis, vt qui contagio iecur afficiat, & lienem. Vt plurimum tertiam, aut quartam horam nō excedit, nisi ad suppurationem inflammatio vergat. periculosissimus est in quo stercus euomitur. Pomerius Viēnæ sacerdos ileo cum vomitu stercoris conflictabatur: tamen cum Dei auxilio, & nostris remediis infra scriptis sanatus est, etiãnum sanus viuit. Ventus per podicem redditus sine odore tetro perniciem denotat, cum fœtore verò salutem. A voluulo amoto si febris hominem.

corr

corripiat, vel inferna aluus soluta, desperatus est.

Metho. m. est causas efficientes abigere. Omni conatu enitendum quò tum flatus tum stercora infra trahuntur per glandes, enemata, illitiones, fomenta varia, per surfures, per vesicas bubulas oleo semiplenas, per irrigationes, & enchatismata, ex calida cum oleo hybisco, & rerum laxantiũ decoctione cataplasmata & per cucurbitulas inanes, perq; potiones ex oleo in quo anetum, lixum sit. Clysmata causis morbificis contraria, saluberrima sunt. Argentum viuum extinctum (præcipitatum vocant) datur in ileo. vt &. præcipitati grana ij. diacymini ꝑ. j. philonij grana iiij. formentur pil. iij. deauratæ, sumat à leui cibatione. Quidã tamen sumperunt arg. viuum mortificatum, & mortui sunt ileo: teste Serap. Ad ileum iubet Hipp. folle immittere ventum per podicem, quo distantia ventris, & intestinorum replicatis folliculis fiat. Mox detracto folle clysterem adhibendum probat, & podicem spongia obstruendum, atque in aqua calida ægro- tantem deponendum. Sanè in hoc affectu si intestinorum verticula, & conuolutio incidat, vt sentit Aurel. flatus immissus poterit esse vsui, quòd intestina in figurã naturalẽ, & situm reducat, vt fileam quòd ventus immissus humores obstruentes commouere, & agitare, ac demum penetrare poterit, sicq; eos apparabit expulsionì. Chordapso opitu-
lan

lantur, vnguentum alabastrum, vng. aragon. vng.
 aureum, diacitonitem lax. elect. ducis N. vng. laxa-
 tium eiusdem, vng. marciaton, puluis catapucia,
 in enemate, sy. maior, & pilulæ sine quibus N. oleū
 de cherua M.

De cœliaca, & dyscœlia, inde cœliaci.

CAP.

XIII.

Kοιλιακα, aliter ab aliis accipitur: nam
 Celso est affectus portæ ventriculi, sub
 quo venter indurescit, dolorque eius
 est, alius nihil reddit, ac ne spiritum qui-
 dem transmittit: hunc affectum sanauit Anto. Be-
 niuenius solo lacte condito iniecto. Aliter Scribo-
 nius. dyscœli, inquit, subito, & multa deiiciūt. Itaq;
 Plinio cœliaci dicuntur, qui aluo cita laborant, &
 Valerianus ex officio ventris per omnia turbatum
 describit *κοιλιάκους*. Sanè lienteriaë similis est affe-
 ctus, vt inquit, Leonicensus. Cœliaca est proximum
 pathema lienteriaë, nisi quòd in hac magis cruda,
 & celerius deiiciuntur, vt tradit Paul. sed potissimū
 liēteria à cœliaco affectu cruditate secernitur. Igi-
 tur non omnis ventris fluxus est cœliaca, vt ait Ar-
 chigenes apud Aetium. Neque enim si cibi crudi
 inferne prodeunt, neque si corrupti cœliaca dici-
 tur, sed tunc solūm quum leuia, & humecta excre-
 menta egeruntur, ventre præ imbecillitate ea di-
 gere

gerere nequeunte. Author defi. Coeliaca, inquit, est alui fluxio non recens sed diuturna, cum vermibus multisq; excretionibus corpore simul marcescente.

Causa. in coeliaca materię non sunt mordaces, quę intestinorum imbecillitatem sequi consueverunt: quia retinere contenta ne exiguo quidē tempore possunt, sed illico excernunt ea, perinde ac si graue aliquod onus deponerent. Coeliaca fit ex infirmitate concoctricis, & contentricis stomachi, & ventris. Ex ventriculi, & graciliorū intestinorum vitio. Item ob iocinoris obstructionem, & attractricis imbecillitatem.

Prælag. ad hūc affectum parati videntur dyscoelii. Ad magnam desperationē res deuenit, si morbus diutius duret, vt aiunt Trall. & Aet.

Metho. m. est causerum sublatio. De auxiliis sunt elect. de scoria ferri, elec. de thure, diacalamintes, myrobolani conditæ. & conseruæ rosarum veteris 3. iij. pul. chalybis præparatę 3. iij. cinamomi 3. j. fiat conditum. Huc pertinet diacytoneum cum pipere thymo, & se. anisi, & spodio, triphera myrob. cum limatura chalybis præparata, vnguēra, & cærotaria ventriculū, & ventrem corroborantia. Victus ratio. Dormire super ventrē vis cōcoctrix, & retentiuā firmatur, sorbitiones ex medulla lentis astringit, oriza, panis elotus, palūbi in aceto discocti, turtures, perdices, phasides, gallinæ, assa, & frixa sumac.

mac. Venus nonnunquam diuturnum alui fluorem
desiccatur, testibus, Arist. Aeg. & Aetio.

De lienteria.

CAP. XIII.

Alienteria est velox exitus eorum quæ comeduntur atq; bibuntur, quæ talia deiiciuntur, qualia fuerunt deuorata. Est coctionis priuatio. Certè in lienteria pauca fit cibi mutatio vel secundum substantiam, colorem, odorem, vel aliam qualitatem: quia si nulla fieret, corpus penitus non nutriretur, & ex consequenti non viueret: nam tam diu viuimus quam diu nutrimur. Duplex autem est. Vna ex languore virium alimenta in ventriculo continentium creatur. Altera ex summa intestinorum exulceratione contrahitur, vel ex cicatricibus quas excitauit dysenteria.

Causa igitur varia. fit ob pituitam frigidam vel solam intemperiem, quæ vim alui vel instrumentorum quæ ad aluum pertinent contentiuam reddit imbecillem, & ob vlcera summas partes occupantia, fit à materia non mordaci, sed aggraunte, quæ contentiuam facit imbecillem.

Digno. si ventriculus in cibos consuetos nihil agere videatur, maxima intemperie afficitur. Omnis enim vehemens intemperies vires deiicit. Coquendi facultas non dicitur læsa, si quæ concoqui non possunt

sunt deuorentur, & immutata deiiciantur.

Præfag. omnis lenteria periculosa. Si vires alimentum non conficiunt, præsidia vana sunt. Cibi appetentiam lenteriam discutit. In longis lenteriiis ructus acidus superueniēs signum bonum. Senibus diarrhœæ, dysenterie, lenteria. Lenteria infestati hyberno tēpore, eos supra purgare necesse est. Lenteriam consequuntur tabidæ febres.


Quoties maior fuerit excretio, minor erit concoctio. Quoties concoctio maxima fuerit, excretio pene nulla est. Si magna fit concoctio in ventriculo, deiectio erit minor: quia maxima pars hepatis distribuitur, ac plus descendit in vesicam quàm in ventrem.

Metho. m. consistit in causerum ablatione. Remedia sunt autem quæ aluinis, & coeliacis conueniunt subteriora, puluis conus cypressi, in cibis, Plat. carabæ Aeg. & Serap. aqua cocta cum mastichæ, Plat. Aqua ferrosa vel chalybata, Ser. zinziber, Auicen. Saccharum rosatū cum puluere dianthos. Cydoniatum N. diacodion eiusdem, cum careno, susuf, de myrto, syr. de mentha. Confectio de seminibus, elect. de myrto. elect. ex inuentione nostra M. Nabac Auicen. Mithridatium, cum decocto balaustia propinatum. Miua & micleta N. pilulæ stypticæ. Athanasia eiusdem. Margaritæ lenteria, & diarrhœæ vtilis, Alb. sed Plinius laudat manus in feruentem

feruentem aquam mittere, & pedes constringere,
super quo ducto, deliberandum.

De diarrhœa.

CAP. XVI.

 *ἰαγγοῖα* ventris effusio interpretatur, est
copiosior alui fluxio diuturna sine phle-
gmone, & vlceratione, fluor autem alui
est expultricis motus deprauatus, id
quod irritat egerentis. Cuius differentia tres sunt
discretæ ab euacuatis: nam in lenteria crudorum
est fluxio, in dysenteria *cruentis* deiectionis, in diar- *cruentæ*
rhœa humorum. Ad hanc reducitur fluxus sterco-
rosus, cuius meminit Arcul. cuius causa otium, ci-
bus multus, & excrementosus, & imbecilla ana-
dosis. Idem meminit cum Pedemontano, & Guai-
nerio fluxus vermium, & lapidum, huc etiam refe-
runt fluxum eliquationis vniuersi corporis vel suc-
corum, quatenus id quod eliquatū est, in ventrem,
& non per vrinam defluit, nec per sudorem. huc
etiam referunt dysenteriam *cruentam*, quæ est pur-
gatio humorum inutilium partis alicuius affectæ
per hepar, accidit mutilatis, & otiosis, maximè in
vere. huc insuper referunt fluxum quē vocant sto-
machalem, nam diarrhœa ex ciborum concoctio-
nis defectu gignitur, vt ait Galen. 2. nat. virt. imo
diarrhœa diutina, vt inquit 6. apho. com. 23. est
ventriculi proprius affectus. his proximus est flu- }

To. IIIL.

F

XUS

xus chylosus, qui contingit ex offensa attractricis potentiae hepatis, aut meserij, cuius venis veluti manibus, quæ ex ventriculo cibum sibi afferant, iecur vititur. Inde meseraici. Rursus sunt alij fluxus veluti iecorosus, splenicus, cerebialis, qui ex affectibus illarum partium oboriuntur.

Causa propinqua, omnium excretionum causas res mordens, aut aggrauans. Remota verò partium affectus. Deiectionis causas citæ, crebræ, assiduæ, & multæ Gal. explicuit. 3. de ca. symp.

Digno. ex egestis assumenda sunt, quæ etiam à Galeno certa dicuntur. Quibus per alui fluorem deiectiones spumant, his pituita à capite defluit.

Prælag. In perturbationibus ventris, & vomitibus spontinis si talia &c. Aluus profluens absq; signis coctionis nihil iuuat. In profluuiis alui mutationes egestionum iuuant, nisi in parua mutantur. Deiectiones nigrae pessimæ, & quo plus sunt prauis colores, eo peius. In omni morbo incipiente si atrabilis vel supra vel infra exierit, letale. Quibus deiectiones biliosæ exeunt, surditate superueniente finiuntur. Balbi ab alui profusione longa capiuntur. Diarrhœa in febribus difficilior curatio, post longum morbum ventris fluxio malum est. A pituita alba detento alui fluor superueniens ægritudinem tollit. Diarrhœa forti detento si vomitus fiat bono est. In diarrhœa proritatur febris ex defurgendi frequen

quentia. Alui excrementa si ex breuibus interuallis deiiciantur, mala: fatigatur enim æger si crebro surgit, vigiliisq; cōsumitur: quum verò affatim sæpeq; deiicit, ne animus eum deficiat periculum est. Periculosum stercus perliquidum, albicans, pallidum, vehementer rufum, aut spumans est. Malum quod exiguum, glutinosum, idemq; subpallidum vehementer rufum, aut spumans est. Malum quod subpallidum, letiferum nigrum, pingue liuens, & quod peioris odoris est quàm pro consuetudine. Lætalia etiam sunt varia excrementa ramentosa, biliosa, nigra, & porracea. Si cutis fuerit raritas, ventris astrictio ei cōiungitur è regione. Si cutis fuerit densitudo, venter & vesica multa deiiciunt.

Metho. m. symptoma nullam per se curationem exigit: quia vnà cessat cum affectu vnde nascitur, ex accidenti tamen curandi rationem mutat, dum causæ locum habet, hoc est quando vires lædit, & morbum auget. Ideo ex tribus symptomatis solæ actionum offensæ, & excessus eorum quæ retinentur, & expelluntur, sollicitudinem medici ad se cōuertunt, affectumq; deferere cogunt. Solutum ventrem irritare non oportet, ex his quæ melius soluant ne postea materiæ impetum cohibere possis, vt monet Oribasius cui subscribere videtur Auic. inquit, In alui profluuiio aluum soluere periculosum. Si cum diarrhœa, inquit Galen. febris accesserit,

rit, alia vacuatione opus non est, verum ipsa per se sufficit, etiam si non sit, pro multitudinis ratione. Est tamen ubi fluxus sanari non potest, nisi eius causa cathartici auferatur, iuxta illud Hippo. si quis medicamentum lubricum porrigat, alui fluor sedatur, & vomitus vomitu. Itaque Antylus cum Aetio in quibusdam alui profluuiis acres humores inferne purgant, & ad intestinorum rheumata vel ipsum veratrum propinant, sed nos ab his quae moleste euacuant abstinere, melius & saluberrimum est. Nec licet ante debitam redundantiae spontinam vel artificiosam vacuationem, astringentibus seu stypticis aluum suppressere, ne mali succi principem aliquam partem impetant. Nisi fluxionis impetus sit adeo vehemens, ut periculum sit, ne animus aegrum deficiat: nam curationum indicationes si sint contrariae, tunc ad id, quod grauius minatur, periculum attendendum est. Omnis immodicae euacuationis communia remedia sunt reuulsio, quae ad contraria fit, & deriuatio, quae ad proxima. phlebotomia quia ad diuersum trahit, fluxum cohibet. Idem praestat vomitus, sudor & vrina, haec duo eandem habent materiam.

Remedia. Ventrem laxum cum indicibus caliditatis coercet syr. rosarum siccarum, myrtinus, de ribes, de berberis, de cydoneis, de agresta, de dactylis immaturis, acetosus de succis, & aquis fructuum, syr.

fyr. de plantagine Arnal. elect. de fructibus M. De purgantibus rha vstum, micleta. A purgatione tro. de spodio cum semine acetosæ, tro. de berberis M. tro. de balaustiis. Auic. lac caprinum, aut bubulum coctū ita vt semper agitetur donec ad tertias redigatur, despumatum, & potum optimū est, sed in febre quarta pars aquæ cœlestis, aut fontanæ lacti miscenda est, & coqui ad dimidias, & ita exhiberi. Lactuca parciū commanducata ventrem si-
 stit, copiosius verò laxat. Ius testudinum aluum te-
 net. In omni fluxu ventris valet diacydonium sim-
 plex, si ante cibum sumatur instar castaneæ, vt ait Honestus. Insuper aluum sistunt halica, triticum, bromos, hordeū, oriza, milium, panicum, medulla lentis, brassica bis cocta, polenta ex vino austero pota, carnes leporis, mora rubi, pyra cotonea, mala punica, poma austera, acerba, mespila, sorba, corna, pruna syluestria, palmulæ, & vuæ passæ austæræ. Vina alba fulua nigra, tortiua, modò sint austera, his addit Serap. aquam ferrosam. Carnes perdicis, turturis, turdi, alaudæ, phasidis, stornæ, & coturnicis. Similam panem elotum, & amyllum in sorbitionibus. Aqua frigida non ducit aluum: nam frigiditas externa aluum indurat, vnde illud Hippocratis, In constitutione aquilonia alui duræ. 3. aphorismo.

*Lactuce
 vsus parvus
 & copiosus*

De dysenteria siue torminoso fluxu. CAP. XVII.

Dysenteria nomen à læsa particula sumitur, & perperā difficultas intestinorum interpretatur, neque enim particula *hys* hoc loci significat difficultatem, sed detrimentum: falluntur etiam qui lenteriam leuitatem intestinorum vocāt, quod alibi notauimus. Dysenteria est intestinorum vlcus. Cuius tres sunt gradus. In primo excernuntur corpora pinguia: in secundo ramenta intestinorum, abiecta horum superficie interiore: in tertio aliquid ex intestinorum substantia abraditur, quod si caruncula nominari queat, lethalis est. Obiter notandum intestina duplicem habere tunicam, partim, vt vis excretoria esset validior, partim vt hæc ipsa organa minus afficiantur: nā aliquando interior pars per dysenterias aliosq; affectus lōgos putrescit, exteriori salua, eoq; ægroti nōnunquā euadunt, sed inter vtrāque tunicam crassities quædam est, quam dicit Brassauolus esse musculos, & carnē, quæ si abraditur exitialis est, quod de excreta interna intestinorū parte dici non potest. Sunt autem intestina, vt ait Oribasius, intus carnosā, foris neruosa, & sub carne humorem glutinosum habent.

An vlcus intestinorum cessante acri fluxione sit dysenteria? In dysenteria, inquit Gale. ablata causa
per

perseuerans manet dispositio, in ea densum stercus apparet cruentis guttis respersum. Ergo non semper in dysenteria fluxio acris vlcus efficiens, sed semper inest cruēta fluxio. Estq; omnis dysenteria cruenta fluxio, & è cōuerso, propria aut non vera. At fluxionis cruentæ quatuor sunt species, in prima sanguis per circuitus excernitur, vt in quibusdam plethoricis otiosis aut mutilatis. In secūda sanguis deiicitur, aquosus, vt per hepatis imbecillitatem. In tertia sanguis nigrior, & splendidus, vt in atrabilariis. In quarta quę dysenteria propriè vocatur, non multum, & affatim, vt in cæteris, sed paulatim, & breuibis interuallis sanguis syncerus, nonnunquam grumosus cum pure, vel ramenti intestinorum, sæpenumero etiam densum stercus deiicitur, cruentis guttis respersum.

Causa externa, acre medicamentum, venenum. Interna mordax humor.

Digno. scientifica est dysenterię agnitio, certis videlicet definitisq; notis comparata. A doloris proprietate, eam præcedunt mordaces dolores. Exulcerationis. notæ sunt, abrasiones cum pingui quopiam, cruor, ramentum, pus. Vlceris locus deprehenditur ex rasura, exitus tempore, & exmissione cum stercore. Ex crassis ramenta sunt crassa, & lata cum quodam pingui excrementis aliis parum mixta. Excretio paulò post torminosa effici-

F 4 tur.

tur. Dolor lacerans, & pungens est sub vmbilico. Contra in tenuibus vlceratis, dolor est supra vmbilicum, quibus complicari solet offensa ventriculi.

Prælag. dysenteria coxendicum morbum corrigit. Lienosis dysenteria superueniēs bonum. A furore dysenteria bono est. Acrida tormina periculosa nō sunt dum febris absit. Verē homines, & æstate potissimū à dysenteriis capiuntur. A deiectione sincera dysenteria malo est, si ab atra bile incipit, letalis. A dysenteria letalis est liēteria. In longis dysenteriis inedia ex fastidio, malum, & cum febre peius. Infusum in dysenteria non retentum mortale. Vlcus crassorum intestinorum facile curatur, tenuium verò difficulter, dysenteria in recto, & colo incurabilis est Aetio. In dysenteria periculum est in asperis auxiliis perseuerare, ne ex dolore ægro-
tans conuulsione, aut animi defectu intereat.

Meth. m. ægritudinis quæ adhuc fit, quod factū est curare opus est, quod futurum prohibere ne fiat: prohibēbitur verò sublata causa efficiente. Si verò per consensum efficitur, ad id quod superuacuum transmittit, omnem curam transferre oportet, & de parte affecta tantisper esse sollicitum, ne quæ confluant promptè recipiat. Idq; fit duplici ratione, vna omnium fluxionum communi quæ ab astringentibus reperiuntur. Altera ex omniū partiū temperiei mediocritate. Longissimè à tentata

tata fluxione parte, quod redundat reuellere conuenit, sed sola per sudores reuulsio tuta est: nā quæ fit per sanguinis missionem periculosa existit, iuxta illud Galeni, Fluente aluo sanguinem nō detrahes: nam si post detractum perseueret fluor, vires prostermet. Adde quod cacochymia non sanguinis missione, sed purgatione accommodata curatur. Accedit quod dysenteria causa sunt succi mordaces, quorum malitia per sanguinis detractionē augetur, vt monent Gale. & Aet. Nec tuto nec faciliè per vomitum, aut per vrinas reuelles: quia humor acris, & mordax faciliè vëtriculum, vreteras, & vesicam abraderet, & exulceraret. Itaque in confesso est, quod in dysenteria foeliciter humor noxius per inferna purgatur, cholagogis quæ clementer purgant & astringunt, vlcusq; detergunt & exsiccant, & quemadmodum vomendo vomitus sedatur, sic fluxui fluxus medetur, quod Hippoc. affirmat his verbis, propter similia morbi gignuntur, propterq; porrecta morbi sanescunt, sicuti si quis medicamentum lubricum porrigat, alui fluor sedatur, cui sententiæ suffragantur Aetius, & Auic. Vlcus humidū ex sanie siccantibus eget, sordidum his quæ expurgent, vlcera quæ in crassis sunt intestinis, infusis magis egent: quæ in tenuibus habentur, ambo requirunt, & quæ supernè sumuntur, & quæ per sedem infunduntur. Si vlcus putrescens est, clysteribus

crustam inducentibus vtendum.

Ad dysenteriae causam purgandam. *℞. rhabar-*
bari vsti 3.j. syr. cytoniorum 3.j. cum aqua planta-
ginis fiat potio. deturbat acres humores, partem
firmat, & astringit. Aliud. corticum myro. citrearū
assatarū 3.iiij. sy. myrtini 3.j. cum aqua chalybata
vel plant. f. potio. Si verò bili admista sit pituita, ℞.
rha. vsti 3.j. miuæ cito. 3.j. cum decocto myrob. ci-
trinarum, & chebularum, ex aqua plant. fiat potio.
vel ℞. micletæ 3.vj. rha. vsti puluerati 3.j. cum aqua
plantag. & endiuia f. potio. Apparatur corrigiturq;
materia acris potu syr. è rosis siccis, myrtini, cyto-
niorum, de acore citri, cum duplo aquarum endi-
uia, acetosæ, plantaginis.

Fluorem etiam astringunt syr. è succo mali pu-
 nici, acidi, sy. acrestæ, cydoniorum, pyrorum, de ri-
 bes, de berberis. Confectio de succo cytoniorum,
 elec. de cytoneis, de fructibus, de sorbis, de myrto.
 rob. acetosæ de cornis, de citro, de sumac, de pyris,
 tro. de berberis, de corallo, de balaustiis, de spodio,
 cum semine acetosæ. Conserua rosarum antiqua,
 conserua florum luteorum phlomi. CrySTALLUS est
 frænum bilis æruginosæ sumptus, vt post Cōcil. ait
 Guain. *℞. marga. coralli añ. 3.j. spodij, de canna, ra-*
suræ eboris añ. 3. s. crystalli 3. s. smaragdi, sapphy-
ri, granati, añ. gra. v. folia auri vj. sacchari rosati soli-
di 3.ij. vel q. s. fiat puluis. sumat cochlear paruū per
horam

horam ante prandium. Aliud. Ras. accipit lithargy-
ri grana octo, camphoræ grana ij. fiat pul. aiunt
quoq; dysenteriae mirum in modum prodesse tal-
chum auellanae, pondere potum. Item dysenteri-
cos desperatos de abrupto periculo liberat spon-
dogos trita, cum vino austero potui data. Est lanu-
go quæ in rosa syluestri solet nasci. Marcel. R. dia-
codij N. ʒ. s. ex aqua ros. vel plantaginis fiat potio,
conuenit delicatis. Opitulatur emplastra de gal-
lis, de gallia, & diaphœnicum M.

*nota vte
spondogos.
bedeguan*

Vlcera sanant clysmi detergentes, obtundentes,
adstringentes resiccantes. R. aquæ hordei lib. j. zuc-
chari ʒ. ij. s. lutea ij. ouorum. magis abstergit infu-
sum ex hydromelle. R. lactis chalybati lib. j. sacchari
ʒ. j. vitellos ij. ouorum. R. olei rosati ʒ. vj. succi plāt.
depurati ʒ. iij. mucc. sem. psylli ʒ. ij. s. ardorem, &
dolorem lenit infusum. Anodyna diaclysmata, &
obtundentia cōponuntur ex decocto pulli in aqua
cœlesti elixi cum tragacanta: fit etiam ex lacte cha-
lybato. Adeps caprillus dysentericis, & tenesmosis
iniicitur, quod in recto intestino, & colo acrimo-
nias obtundit, ac concrefcit citius. 11. S. Hippuris
valenter exsiccat, citra morsum, dysenterias cæte-
rosq; alui fluxus coërcet. 6. S. R. butyri rec. ʒ. vj.
sang. dra. ʒ. ij. fiat iniectio. confert in omni dysent.
Nicolus laudat infusum ex rhabarbaro assio cum
aqua plāt. Pandectarius ex albo oui cum meliloto.

R.

℞. cineris turturis, boli arm. gummi arabici aſi añ.
 ʒ. j. fiat puluis, & cū aqua plant. fiat ænema. Ad vl-
 cus cum putredine fiant clyſmata ex vino, & aqua
 ex vino ſemel extillata, vel ex vino cum pauca
 aqua Caſtri, vel ex aqua Armenienſis cum ſucco
 plant. Item ſuffitus ex minio factitio cum libano.
 Ad vlcus purum competit infuſum ex vino cum
 ſucco hippuris, vel ex lacte vſtilato cum ſanguine
 dra. vel cum tro. de ſuccino. Item ex colophonia,
 Plat. Præterea ad vlcera inteſtinorum Sardus laudat
 oleū è pomis baſamine infuſum, vel dat ſemel tan-
 tū foliorum baſamine pulueratorum cochlear
 vnum cum aqua plantaginis potādum. Pand. pro-
 pinat decem pilulas è cera pura deuorandas. ſuffi-
 tus etiam vtilis ſunt ad ſedem facti ex terebinthi-
 na, vel ex ſimo pulli aſini, aut ex reſina pini, vel ex
 corticibus pinearum, vel ex acri aceto.

In victus ratione, aër lucidus, ſomnus, & quies
 conueniunt, decumbat in dextrum, coxa dextra
 ſuſum retracta, ſic enim hepar chylum faciliùs at-
 trahit. prodeſt manus in aqua calida ponere. In dy-
 ſenteriiſ, inquit Gale. medicina præcipua eſt victus
 tenuis, & quæ aſſumuntur quàm leuiſſima, & con-
 coctu facilia. Nutriendus æger eſt halica calente,
 ſed iniectis mali punici acidi granis, potus illi offe-
 rendus è mali punici ſucco, vinumq; rhoites. In
 aceto coctum ouum ſi edatur, vëtris fluxiones de-
 ſicc

ficcat, lac caprę coctum cum amylo recenti ieiuno
stomacho aliquot diebus, post aliquantulum panis
sicci ad comedendum exhibetur, hæc acredinem
temperant, & vlcera cicatrizant. Mora sicca pro
sunt, & emplastica, vt amyllum, farina tritici, quia
acrimoniam hebetant. Epiphorę ventris conue-
niunt, potiones ferro candenti calfactę & datę. Sa-
lubres item cibi panatela, simola, hordeatum, mi-
lium, panicum, oriza, colatura furfuris, amygdala-
tum, lomentum fabarum, & lentium, huiusmodi
enim emplastica acrimoniam hebetant. Aqua car-
nis quę paratur variis modis ex vitulo, lepusculo,
capo, phaside, attagene, perdice, turture, hepar ca-
pi, & anseris, testiculi gallorū, pedes veruecis, hœdi
vituli, ex quorum iusculo gelu laudatum. Oua nec
sorbilia, nec dura vtilia sunt. De piscibus lucius,
perca, trota. De holeribus portulaca, cichorea, la-
ctuca, crambe bis cocta. De fructibus punica meza
vel acida, aurantia, limones, succus citri, pyra, cyto-
nia, mespila, sorba, castanea. Sed potum si alius hu-
mida fuerit, minorem dare oportet, & illi viam ad
vesicam parare: ergo alba vina præstant rubeis, ni-
gris crassis. Conueniunt potiones ferro candenti
vel auro calfactę. Lac sine sero datur quibus ven-
ter acrium excrementorum demorsu infestatur.
Serum autem consumitur, aut elixatione, aut inie-
ctis lapillis ignitis, aut ferreis orbiculis. Aliud est lac
schi

schistum, in quo segregatur serum à caseo. 10. S.

Amuleta. smaragdus appensus vel in ore retentus dysenteriam sanat, teste Auenzoar, qui etiam propinare iubet smaragdi puluerati grana sex cum aqua, ante cibum octo vel decem horis, qua de re agit Mundela in suis epistolis.

De tenesmo.

CAP. XVIII.



Tenesmus, id est, tentia seu tensio, dysenteriae species est, atque ita nomenclaturam habet, propterea quod intestina tenduntur, unde crebra voluntas desidendi, sed irrita citatur. Morbus enim est recti intestini: hoc enim inflammatione laborans continuæ intentiones, & frequēs desidendi cupiditas exercēt. Est igitur egerendi voluntas citra affectum.

Causa eadem est, atq; ea, quæ est dysenteriae, scilicet recti intestini vlcus, vel eius inflammatio, aut humores mordaces, vel calculus.

Digno. symptomata dysenteriae similia habet, tensionis verò vehementia dysenteriam longe superat.

Prælag. facile tollitur, neque vnquam per se iugulat, vt ait Celsus. si prægnanti contingat abortire facit.

Metho. m. eius sanatio est causarum sublatio, videlicet inflammationis, aut vlceris.

Re

Remedia fiunt per enchatismata ex decocto chamæli, foliorum maluæ, & radicum althææ, seminis lini, meliloti, rosarum, foliorum lauri, & roris-marini, per suffitus supra scriptos, huc refer vnguentum, & tro. Valesci, glandes ex adipe hirci, & alia innumera.

De lumbricis, & verminatione. CAP. XIX.

Λμινδες, id est, lumbrici sunt morbus in numero, quorum differentia ducuntur à figura, loco, & materia. Tres autem sunt, videlicet teretes, ascarides, lati. *σπογγύλαι*, id est, teretes sunt similes ouisculis in foetunticetis nascentibus, quos vocat Gal. *γῆς ἐντέρας*, id est, terræ intestina, sunt rotundi palmi longitudine, vel etiam maiore. *Ασκαρίδες* dicuntur ab *ἀσκέω*, id est, exerceo, vel ab *ἀσκαρίζω*, moueo, sunt tenues & breues. *λείραι*, id est, institæ καὶ ταινίαι, lati vocantur, quod instar fasciarum sint lati, & longi, vt in totum extēdantur intestinum. Latum, inquit Aristoteles, illud solum intestino adhærens parit simile cucumeris semini. Cucurbitinos se vidisse testatur Beniuenius inter sese adeò cohærentes, vt vnus vermis videretur quatuor cubitorum longitudinem excedens, Alex. quoque B. inuicem compactos se vidisse narrat longitudine quindecim pedū complectentes, atque ita in vnum, inquit, mentiuntur
ani

animal. Sunt præterea vermes figura à præfatis adeò differentes, vt ille, quem à potione hieræ picrę deiecit Canonicus Antonianus qui colico dolore torquebatur. Erat viridis figura lacerti, sed crassior, hirsutusq;, & pedibus quatuor innixus, breui tempore à propulsa fera obit Canonicus, contra illa menses aliquot vixit in vitrea phiala aquæ plena. Teretes in superioribus intestinis magis generantur, & ad stomachum vsque proserpunt. Ascarides in parte inferiore recti intestini. Lati in totum exporriguntur intestinum. Non generantur in ipsius digestionis loco, vt sentit Aristoteles. Attamen nascuntur vermes in prora cerebri, vt scribit De solo, super Viatico. Vermis de naribus proiectus, apud Beneuenium, vermes in auribus apud Oribasium, in dentibus apud Auic. sub lingua, & in vlceribus, Valescus. In hepate Alb. in pulmone & thorace Asaruius, & Zoar. in vtero apud Hipp. & Torna. in renibus, & vesica: nam ipse vidi cucurbitinos mictos, & viuos in lotio. In venis L. de iuuamentis anhelitus. Nascuntur in sanguine hominis animalia exesura corpus, vt refert Plinius, in partibus musculosis, vt dracunculi, Aeg. in epidermide, vt acari sub cute, vt in phthiriasi. Inde hominis miseria patescit, cuius nulla pars præter vitalia ab his tediis immunis est.

Causa. Animalia alia per coitum foeminæ, & maris gignit

ris gignuntur alia non ex coitu, sed putri materia
prodeunt, hæc generant quidē, sed genus diuersum:
quodq; prodit nec mas, nec femina est. Origo
omnium generum est ex cruda, crassa, pituitosaq;
materia, & putredini accommoda. Non autem ex
calida, acris, aut melancholica substantia: nam cali-
dus, & acris humor amarus est, ex quo nihil gene-
ratur, neque nutritur, melancholicus verò quia fri-
gidus, & siccus non est vitæ proportionatus, ut re-
tur Auic. fiunt igitur omnes ex pituita syncera vel
mixta. Teretes nascuntur ex pituita minus frigida,
& minus humida. Lati ex minus calida, & satis hu-
mida. Cucurbitini ex muscilaginosa. Ascarides ex
eadē sed acetosa, ut putat Tornamira, sed Oriba-
sius vermes omnes ex omnibus nasci humoribus
existimat, videlicet ascarides ex nigro, ex bilioso
teretes, latos ex pituitoso fieri succo affirmat. Mihi
autē verisimile non fit, quòd aiunt Paulus, & Aet.
internam intestinorum membranam permutari
in animal mobile, seu in latos: nā si vermes ex pu-
tredine ortum habent, eorū generationem præce-
derent vlcera intestinorum putrida, & consequen-
ter dysenteria. Adde quòd interna intestinorū tu-
nica carnosior est, sicut externa mēbranosior: atqui
in dysenterico si carunculæ exeunt, lethale. Com-
mune omnium vermium est, & eorum quæ ex ver-
mibus proueniunt animalium, ut primordium ge-

To. IIII.

G

nera

nerationis, aut à sole, aut à spiritu præstetur. Vnde efficiens duplex vniuersalis, & particularis, prior est calor solis, stellarūq; vis, hæc sola sufficit ex materia producere vegetabilia, & animalia imperfecta, quæ scilicet sunt similarium partiū, vt vermes, vel nō adeò dissimilarium, vt mures, & talpæ, quoniam humor in terra, spiritus in humore, calor naturalis in vniuerso inest, ita vt quodammodo plena sint animæ omnia, vt autumat Aristo. sed Auic. secus opinatur, nempe quòd sola vis stellarum commista viribus elementorum, animalia etiam perfecta formare, & perficere queat. Nec in generatione, inquit, opus est fœmina, nisi propter locum. Efficiens posterior est spiritus, id est, calor naturalis, cuius natura proportionem respondet elemento stellarum. Itaque vermes fieri à naturali calore indicat Aristo. 4. meteo.

Digno. si mane ieiunis pueris frigida super stomacho spergatur, vermes in ventre existentes in vnum congregabuntur locum, vt narrat Alex. B. Reliqua sumuntur ab actione læsa, & à casibus, veluti ascarides ex pruritu, & dolore sphinteris ani vel fibulæ. Lati ex bulimo, & excretis: nam latas tineas habens cum stercore similia cucumeris semini demittit.

Præfag. tinx intra hominem tricenum pedum longitudo, si Plinio credimus, Tinea duodecim cubi

cubitorum, quæ sint causa bulimi, apud Trall. Autumno maximè ferinum. Tineæ post meridiem, cæteriꝫ morbi magis vexant, hoc est, illa diei parte, quæ maximè respondet autumno. Lumbricos cum excrementis sub fine morbi descendisse nihil nocet. Si natura expellit deorsum, melius est quàm si sursum. Et quotiens aliter, expellit ratione accidentis, sunt inimica creanti, vt canit Serenus, Phercydes vt scribit Plin. copia serpentem ex corpore ^{*}serpentum. eius erumpente expirauit. Deteriores sunt maiores minoribus, multi paucis, rubri albis, & viuētes mortuis, sed latæ omnium deteriores, vt ait Cel. Vermium excretorum in febribus prælagationes require apud Aet. Paul. Rasin, & Torna.

Metho. m. Sunt tota substantia præter naturam, quare eos expelli è corpore conuenit. Expelles si prius necaueris, necantur autem amaris. Teretes absinthium perimere potest: latæ vehemētiora desiderant: pari modo quæ ascaris dicitur. Organum per quod amara per os iniiciuntur inuitis pueris depingit Aegineta lib. 4.

Remedia nos plura scripsimus in nostra de puerorum malis pragmatia. De catharticiis optima sunt aloës, agaricum, hiera picra, rha. diaturpentū cum rhab. quod cunctis aliis præsidiis præponit vir doctus, Hierony. Gabucinus in suo de lumb. commē-
tario. Vermes extrahit ptisana facta ex semine fœ-

nugræci, & filigine pota ad ℥.iiij. Vel calchanti 3.j. pifta cum melle, vel hydromelle fumpta. Aliud. ℞. comæ eupatorij M. seu agerati m.j. per noctem in vino albo maceretur, & dilutum potandum exhibetur. Sebesten expellit vermes: quia adherent dulcedini, vt ait Serap. fuffitus ex penna vpupæ expellit vermes, teste Rasio. Mirum quod tradit Agricola, radicem bugloffæ animali appenfam vermes in vlcere interficere, vel abigere, fponde enim decidunt. Vermes educit vng. arthanitæ magnum vmbilico illitum, vnguētum ex giarga Brafaulæ optimum. Aduerfus omne vermium genus. ℞. mēthæ, abfinthij, centaurei minoris, cornu cerui, vfti, lupinorum, myrrhæ, añ. 3. ij. hermodactyl. colocynthidis, aloës, añ. 3. j. se. centonici ℥. xij. fiat puluis, dofis 3. s. pueris minora remedia danda funt. Medicamen forte ad vermes eft oleum è lignis columnis deftillatum, cuius dofis guttæ duæ fumuntur cum mica panis ieiuno ftomacho.

In victus ratione abftinere oportet à cibariis quæ pituitam generant, vt lac, cafeus, cerasa, poma, pyra, dulcia omnia, rape, napi, & vinum nouellum, pifces fine squamis. Item gallinarum comestio lumbricos generat, vt afferit Rases 4. aphor. triticum crudum, coctum, & crudum, nouum seu recens, vermes creare aiunt. Dio. Auic. Ifac.

De

De hæmorrhoidibus.

CAP. XX.

Hæmorrhoids à sanguinis defluxu nomen sortitur, vnde cæca marisca hæmorrhoids non est, hæmorrhoidam os venæ sedis appellat Gal. Celso mariscæ sunt ora venarum tanquam, & capitulis quibusdam surgentia, quæ sæpe sanguinem fundunt. Differentiæ à pluribus ducuntur, primùm à symptomate, vt quæ nimis sunt, occæcatæ, citra dolorem, & quæ dolent. A more, mites & malignæ. A figura, magnæ, parvæ, angustæ, vel latæ basis, moro similes, apud Pollucē. insuper quædam sunt acino vix, nonnullæ verrucæ compares, apud Auic. A loco in ano, & in fœminarum sinu, aut in vesica.

Causa. humor atrabilarius, bilis vel pituita falsa sedis venas petens. Ex acritudine eorum quæ excernuntur, paulatim aperitur os venæ, quam vocant hæmorrhoidam. Assiduus gallinarum esus, hæmorrhoidas inducit, si Rasi credimus.

Digno. sumuntur ex deiectionibus, item ex sedis dolore, ex vniuersi corporis colore, qui est luteus color declinans ad viridum. Anus, & vesica inter se cohærent, mutuoq; afficiuntur, vt scribit Atetæus.

Præfag. est affectus hæreditarius, est passio ætatis declinantis. Vacuare superflua sunt consueta, maximè hepatis, vniuersum corpus vacuât, & humo-

G 3 rem

rem sanguini mixtum, sine vlla corporis perniciē. Proinde quod certis periodis contingit per hæmorrhoidas profluuium, non præter naturam dici debet, si in tempore expellatur, vt vult Gale. lib. de diff. fy. Attamen 3. de ca. fy. dicit, quòd omnis sanguinis expulsio, excepta ea quæ mulieribus ab utero defluit, est toto genere præter naturā, hæmorrhoides, abscessus, & fistulæ aliorum morborū medella. Qui ficosi sunt laterum, & pulmonis morbo, phadagenis, cancro, varis, pustulisq; ceteris obnoxij non sunt, nec forsan cuti asperitati lepræ ve. Natura sanguinē semper expurgare conatur. Atra bilis sanatio, vt simile per hæmorrhoidas fluat. Infantiæ solutio per eas fit, aut per varices. Atra bile vexatis, & renū passionibus vtiles. Mulieri mariscas habenti deteriores accidunt purgationes: natura enim ita fert, ne humor locis pluribus simul erumpere soleat, vt ait Aristo. vbi enim ad alteram partium sanguis defertur, altera ficcescit. A diuturnis sanato periculum est hydropem, aut tabem aduenire, si congrua viuendi ratio negligitur. Sed miseram vitam hæmorrhoides inducunt, nam interiores ægerrimè curantur. Cæcæ grauiore quàm aliæ dolore cruciant. Immodicè fluentes acquiescere paulatim corporis habitum faciunt.

*
quiescere

Meth. m. Aegrotantes magna ex parte afficiuntur excessu eorum quæ retinentur, aut eorum quæ
expe

expelluntur, excessu, vehementiq; dolore. Quocir-
ca idonea curatio est, quod præter naturam retine-
tur, vacuare, quod præter naturã expellitur, restrin-
gere. Quod si dolor coniunctus præualuerit, huic
primò curam conuenit adhibere: quia inde maxi-
mum imminet periculum. Itaque ante topicorum
vsum, plethora vel cacochymia affecti corporis est
sananda: nam, vt inquit Gal. quibus ex retentis hæ-
morrhoidibus coaceruatus sanguis fuerit, his au-
dacter sanguinem mittes.

Auxilia. dolorem soluunt verè anodyna, quæ
sunt temperata, & primi ordinis ex cal. vt anethũ,
melilotus, chamæmelum, semen lini, mixta cum
emolliētibus, vt sunt medullæ, & adipēs, postremò
narcotica, siquidem quod dolorē mitigat vel dyf-
crasiam mutat, vel materiam dissoluit, & emollit,
aut sensum stupidum reddit. Dolorē mulcet aqua
gei vel cynoglossæ pota, vel illita. Oleum momor-
dicæ illitum, oleum nucis indicæ inunctum. ℞. olei
de luteis ouorũ, rosaceis, & adipis, anatis, & gallinæ
añ. ℥. j. ceræ ℥. j. s. croci ℥. j. s. fiat linimentũ. Aliud.
succī calendulæ ℥. ij. succī morelæ, seu solatri ℥. j.
adipis gallinæ, & anatis rec. añ. ℥. s. cum modica
cera pura f. linimentum. Valet etiam vnguentum
populeon cum momento opij, & oui luteo. Aliud.
rosacei ℥. ij. croci ℥. j. lutea ij. ouorum, opij, mādra-
goræ añ. ℥. j. fiat illitio. ℞. foliorũ maluarũ, violariæ,

florum luteorū, phlomi, chamæmeli, meliloti, anethi, añ. m. j. se. lini ꝯ. iij. sem. foenugræci ꝯ. ij. furfuris m. iij. poma dulcia concisa iij. caput veruecis concisum. bulliant omnia simul vsque ad cocturā carnis, ex decocto fiat suffitus ad sedem. & carnis pomorum dulcium, sub prunis decoctorum ꝯ. iij. butyri rec. ꝯ. iij. adipis anatis, & gallinæ rec. olei violati, & amygd. dul. añ. ꝯ. s. lactis mulieris sanæ ꝯ. ij. ducantur in mortario plumbi, postea cum farina hordei, & fabarum fiat empl. ad ignē cum luteis duorū ouorum recentium. Aliud. butyri rec. 3. x. olei de luteis ouorum ꝯ. s. adipis anatis rec. 3. iij. succi plātag. & florum phlomi añ. ꝯ. j. ducantur in ^{mor}portario plumbi, & imponantur. Aliud. oleum ex semine lini, buty. rec. añ. ꝯ. j. ducantur in mortario plumbi, & iniice in anum, vel sedem illine. Ad dolorem cum calore. & cerusæ 3. x. plumbi vsti 3. ij. camphoræ, tragacantę, opij añ. 3. j. cere albæ 3. ij. cum rosaceo, & albo oui fiat vng. Aliud. ad dolorē cum duritie, adipis anatis gallinæ rec. añ. ꝯ. j. rosacei ꝯ. ij. vitellū oui, opij 3. j. croci 3. s. Ad idem imponitur empl. diachylon cum rosaceo, vel oleo chamæmeli croco, & opio emollitum. Galanga pota confert hæmorrhoidibus à proprietate. Ad idē utilis est hermodactylorum 3. s. pota, vel puluis eius cum butyro veteri mixtus, cū bombace impositus. Tertio die æger sanus euadet, vt asserit Moses.

Ad

Ad cæcas hæmorrhoides. Quæcunque menses
prouocant excæcatis expediunt. Resarantur lan-
ceola, hyrudinibus, frictione foliorum ficus, succo
cyclaminis in floccis appposito, catapotis ex aloë
non lota deuoratis. Tumentes, & cæcas sanat apiū
in vino coctum, & adapplicatum. Ad fluxum san-
guinis immodicum, valet elec. fenoris, elec. limatu-
ræ chalybis, elect. myrobolanorum. Micleta, pilulæ
de bdellio, quæ accipiunt bdellij 3. vj. ameos 3. j. s.
myrobal. indarum, chebularū, beller. emblicarum,
auellandarum vistarum, carabæ añ. 3. j. s. dissoluitur
bdelliū cum succo porri, fiat massa, ex qua formen-
tur pilulæ. sanant hæmorrhoidum, & mēsum pro-
fluua deuorata, & intestinorum vlcera. Ad idem
opitulatur succus millefolij potus, cinis quoq; pu-
taminum ouorum ex vino albo bibitus, millefoliū
pistum ano appositum, antimonium cum succo
phlomi illitum. Enchatisma vtile ex decocto rerū
astringentium, videlicet plant. florum phlomi, ro-
sarum, malicorei, balauſtię, gallarū, sumac, se. myrti,
calycum, glandium, adiuncto vino astringente, aut
styptico. Reuulsoria citra sanguinis euacuationem
sunt per frictiones, & sicyas præcordiis affixas. Ad
anastomosim astringentibus topicis vtendum. Ad
eruptionem astringentibus, & glutinantibus. Ad
diabrosim his quæ carnem gignunt, mixtis cum
digerentibus. Si ex erosionē putrescentis alicuius

G 5 loci,

loci, crustificis vel ignitis ferramentis vti necessarium. & thuris ℥.j. aloës 3. s. cum oui albo, & pilis leporis excipitur. Gypsum oui aquato dilutū cum gauſipo imponitur. & amyli, farinae volatilis añ. ℥.j. boli arm. sang. dra. aloës, sarcocollæ, thuris añ. 3. s. cum oui albo applicatur. & cineris nucleorū palmarum, ostreorum, atramenti futorij añ. 3. j. s. spondij, succini, sang. drac. gummi arabici vsti añ. 3. j. s. cum aceto rosato adhibetur. Ad earū nimietatem adipe cygni locus tangatur, & cinis spongiæ bibatur, ex præscripto Marcelli. Sanguinem vndecunq; fluentem sistit mirabili experimento scobs dentis equi fluuiialis pota, vt aiunt: verū ego quum id experiri volui, falsum comperi. At ranarum vstarum cinis sanguinis eruptioni medetur inspersus.

Amuleta. topazius in anulo gestatus, Varign. Sessio super leonis pelle, sanguinē à mariscis fluentem sistit. Rasis. nos verum esse, sumus experti. Corallus, & iaspis appensi. Cinis ranæ maioris in sacculo de collo suspensus. Gordo.

Mariscarum orificia incisa consolidantur remediis sequentibus. & tragacanthæ, gummi arabici, mastichæ, thuris, boli arm. acaciæ, hypocyst. lithargyri, coriandri assati añ. 3. j. mumia 3. ij. fiat puluis, inspergatur, vel cum oui aquato applicetur. Cinis corticis salicis inspersus perſanat omnem vlcerationem. Bert.

Hæ

Hæmorrhoidas delet decoctum radicis anonis potū. Pulvis bistortę frequenter potus eas stringit, & desiccatur. fricare eas ex agrimonia idem pollet, teste Lanfranco. In hoc etiam laudat comedere per nouem dies buccellam quę sic paratur. ℞. pul-*Phlomis.*
ueris radicum phlomi siccatarum in furno, farinę *verbascum*
tritici añ. 3. ij. cum oui vitello misce, & frictelata sumatur. Ad idem conferre puto conseruā florum phlomi. Eas etiam abigit certo remedio, galbani puri 3. ij. sumat ex aqua per tres dies. Auicē. Testudinis testa suffita bene facit. Gal. Vng. exsiccans. ℞. mellis 3. iij. aceti 3. ij. vitreoli vsti 3. j. tutiæ præparatę, lithargyri, plumbi vsti añ. 3. j. s. mel, & acetū simul bulliant, quibus reliqua misce in mortario plumbi, & adline.

Ad alia ani vitia.

CAP. XXI.

Difficilem curationem accipiunt: quia multo sensu sedes est prædita, vnde facile per acriora, & austeriora irritatur. Item retrimentorum transitus per se mordax est. Accedit quòd nullū habemus certum tempus ad imponenda remedia, sed plerunque tempore non conuenienti ægrotantes ad excernendū concitantur. Quin, & humiditas, & caliditas ipsius loci frigefacientibus, & siccantibus citra acrimoniā opus habet. Aptissima igitur pharmaca erunt, quę absque

absque aspredine constringunt, qualia sunt, quæ ex metallis neque acria, neque acerba existunt, hæc enim lota citra mordacitatem operantur.

Ad sedis vlcera. ℞. lithargyri, & cerusæ añ. 3. v. thuris 3. j. aluminis scissi 3. j. croci obol^{ij}. vini, & rosacei q. s. fiat linimentum. Optimum est collyriū ex præcipitato cum aqua hordei, vel cum decocto plantaginis, cynoglossæ, gei, vel ex eorum aquis stil-laticiis infusum. huc refer balsaminam sardi, & suf-fitus nostros, qui vlcera munda, & deterfa ducunt ad cicatricem. his remediis ex ani fistula diuturna cum Dei auxilio quædam principē curauimus, qui perfanatus mihi offerre iussit, velutum pro veste tallari, & tria librarum turonensium millia, decem tamen promiserat, etiam si nihil dedisset, conten-dere aliquid ab eo noluissem, iuxta præceptū Hip-pocratis, & Sorani. Merces medico si quidem de-tur accipiatur, sed non exigatur: quia quantum quisque dederit, nulla mercede poterit exæquare medicinæ beneficia.

Ad condylomata.

CAP. XXII.

SVnt rugosæ eminentiæ siue excrescen-tiæ in calum induratae, sunt etiā qui cæ-cas varices condylomata vocant. A pur-gatione vitiosorum humorum topica adhibēda sunt. vt ℞. meliloti, anethi, foliorum mal-uarum,

uarum, violarię, foliorum plātaginis, & cynoglossę,
añ. m. s. vini albi subdulcis ℥. iij. aquę cœlestis q. s.
fiat fomentum ad sedē. ℞. chalcitidis vstę ℥. j. cum
terebinthina liquida excipe, & impone. ℞. cineris
putaminum ouorum ℥. j. insperge. ℞. lithargyri, ar-
genti loti ℥. ij. thuris ℥. s. terantur in mortario
plumbi, cum rosaceo, & oleo myrtino. Aliud. sief
albi sine opio ℥. j. asteris ℥. j. succi hyosciami ℥. j. sa-
pę, & rosacei añ. ℥. ij. cum luteo oui fiat vng. Ad ri-
mas in ano, & pudendis. ℞. resinę pinus siccę ℥. ij.
cum oleo ros. fiat vng. Aliud. cadmię, cerusę, thu-
ris añ. ℥. j. fiat puluis. inspergito. Aliud. olei de semi-
ne lini, & de vitellis ouorum añ. ℥. ij. elaborentur in
mortario plumbi, & iniiciantur.

Ad thymum qui est aspera quędam eminentia
thymi cacumini similis. purganda est materia salsa,
aut adusta, dein suffumigia ad mariscas pręscriptas
erunt salubria. Carnosas istas excrescētiās seu thy-
mos compescit, nec finit rursus augescere, cinis
palmitum cum aceto illitus. Item salicis combu-
sti cinis.

Myrmecia, & verruca pensilis per valenter exul-
cerantia eliduntur, his autem quę exedunt emo-
riuntur, proficit elaterium cum sale impositum,
ocymi folia cum atramento futorio.

Ad internos ani tumores, aqua maceratū ama-
rantum mane vespertiq; propina, vt iubet Galen.

Ad

Ad internas, & externas eminentias dare de serpentis senecta instar numismatis in caricis comedendum præscribit Myrepsius. ficos consumit illitio cum puluere gallarum, & oleo communi facta. Verrucas tollit aqua emanās à castratione vitis illita. Rhagadia, & exochadia stirpitus tollit oleū bombicinum verū, si assiduè inde tangantur, herba polypodij trita ptisanæ mista, & pota ieiuno soluit ventrem, & anum mollit tumentem, vt ait Marcel.

De virilitate læsa, seu de partium quæ generationi dicatæ sunt, langore. CAP. XXIII.

lul. ad coitū.

ricul. aff. semina
e an. & i. tere
acti. viciu. et
n. pilul. ad fab
m. tud.

ad idem.

l. cast. & de nuc.
c. an. & i. ol. musc.
l. & castor.
fid. b. an. & i.
h. di. alipt.
ch. an. & i.
renū capreti
cer. q. s. fiat

uent. vngant
nta pedū. var
renū et perin.
ndelet.

ad idem

lam. succum
lle lycio aqua
ar misticobis, &

Ibido ex feminis ardore cōcitatur, dum semen corpus vniuersum perturbans, ac veluti turgens excerni desiderat. Semen autem generant vasa spermatica, idq; testes perficiunt. Cuius vis licet de toto corpore decidatur, eius tamen materia non de toto corpore emittitur, sed duntaxat de tribus principibus, videlicet cerebro, hepate, corde. In quibus illæ tres animæ partes λογιστικόν, ἐπιθυμητικόν, ἐπιθυμητικόν se-
dē habere affirmat Plato. in Timeo. Igitur virilitatis impotentia tum incidit quum coles partesq; ob-
scenæ priuantur materia idonea, & facultate quæ à principiis emanant, vnde vel resoluuntur, vel se-
minis inopia laborant. Ex frigida quoque testicu-
lorum dyscrasia, venus offenditur. Contra crasis
eor

eorum calida, & sicca, calidaq; , & humida petulca est, & ad libidinem prona.

Digno. vbi nulla adest corporis offensa, aut partium generationi dicatarum vitiū, consentaneum est virilitatē esse ademptam carminibus, aut veneficiorum iniuria.

Metho. m. roborandum cor est, hepar & cerebrum, obsecnæq; partes. Illitio volæ manuū, plantarum pedum, atq; suminis ex oleo subterius præscripto, venerem in senibus languentem reparat. ℞. olei sesamini, ℥. iij. pyrethri, euphorbij, añ. 3. j. moschi 3. s. coquantur simul lento igne, & alline.

Insperperem excitant, vsus croci in cibariis, porrorum elixatorum esus. Semen erucæ ad 3. s. cum vino dulci potum ante cibū. ℞. pulueris virgæ tauri siccatae 3. j. bibat cum vino dulci polyforo. Comestio granorum azelini ante cibum, & post. Diasatyrium, cinamomum ante cibum sumptum, semen pastinacæ ex vino potum. Radices eryngij esitata, zinziber conditum, puluis caudarum synchorum ex vino dulci potus. Esus passerum. de herba qua qui vsi fuerint, septuagesies coire valerent meminit Theophrastus 9. de historia plant. puluis feminis lini cum saccharo in cibis sumptus auget sperma, & penis erectionem facit. fel apri virgæ illitum erectionem magnam facit. sperma hirci illitum idem præstat. Moschus peni illitus. Aliud. ℞.

olei

pendentes testis
illius. Marcel

ad idem.

Ut rebus vene
aptus sit. pipe

tū cum oleo &

le misc. cucu

voler verenda t

illius. idem.

ad idem.

Ut semp. sis p

in vene. Por

men tritu &

semē tritu aqu

tionib' misce cu

capr. recen. &

nus assidue. bi

ad idem.

Pyrethr. tut.

pulu. cochleari

plenu cū pass

cit ad vener

tiler mares. ide

24 dentes maio. r

ortus n. v. pulu

subtil. suffumige

vis testis. ad p

Felle perdicæ

aut odlli si p

dendum viril

maximā parv

mulierij volupta

Fillmatz. / Mat

℞ rad. cucum

3. j. acm. galang.

aromat. añ 3. j.

mosch. caryoph. c

pipen. utriusq; py

mac. añ 3. s. fol.

laucend. maior. oij

menth. rorisma. olei sisamini de lilio añ. 3. ij. formicarum quæ alas
 j. flor. anth. salu. habent 3. iij. bulliant simul, mox coletur, adde eu-
 id. primul. ver. phorbij 3. j. seminis rutæ, piperis añ. 3. j. sem. sinapis
 3. s. iterum bulliant, ex colatura illinantur virga, te-
 vitr. bull. sup stes, & inguina. R. olei pinearum, & de ben, olei
 calid. ad aqu. macianorum dulcium añ. 3. j. fellis passerum 3. s.
 npt. deinde ex moschi rubei 3. s. misce, coli, & testibus illitū cal-
 it. ol. in torcul. facit, & temperat spiritus. finum vulpis peni illitū
 de luc. ven. fol. yenerem auget. Notandum quod si in viro sola
 ulis. q. ampl. nu. barba canescit, partium genitalium imbecillita-
 & inflant. ite tem arguit.
 amen. o. flatus. Amuleta. testiculus vulpis cum scorto adalliga-
 itaq. bulb. ite. tus, coitum, & erectionem excitat. Ras. Venerem
 es pin. fab. fic. excitant spongiæ suppositæ. Athenæus. fel vrsi su-
 sunt multū se- per femur dextrum ligatum, fel etiam de albozao
 vener. Edul. a. vel taxone ligatum super femur sinistrum, conti-
 ly. medic. sunt nuam virgæ erectionem efficit. Rasius.
 sem. eruc. et or. 2. cap. 237
 Acti 7 tetr. 1
 2. cap. 237
 109. f.
 his testes e poti
 ehleatit quantit.
 noxa nō fallaq.
 tionē priapo pa
 Orib. l. 4. fol.
 cap. 109. —

De satyriasmō, & priapismo. CAP. XXIIII.

Satyriasis dicitur de elephanto, seu ele-
 phantiasi, apud Aristotelem, & Galenū.
 Satyriasis etiam de pudendi præter na-
 turam erectione. Aetius hunc affectum
 confundere videtur cum priapismo. Sanè vterque
 affectus sunt pudendi præter naturam erectiones,
 sed differre videtur, causarum ratione. Est autem
 satyriasis continua virgæ erectio, cum appetitu, &
 desiderio

desiderio ad coitum. Priapismus verò est continua colis erectio, sine appetitu ad coitum.

Causa satyrias est pulsus testium, & veluti singultus quidam inguinis seu colis, cum intentione, & tentigine, sequens inflammationem seminalis receptaculi, vt definit Aegineta, sed priapismus ex inflammationum est genere, morbus, scilicet, in magnitudine, quum masculinum pudendum intumescit, & inflatur inuito, citra rei veneræ appetentiã, ab halituoso spiritu inflante cauernosum neruum, qui propriam colis substantiam constituit, vel ob dilatata venarum in pudendo ora. est igitur causa penis inflammatio, vel inflatio, hæc autem efficitur ab halituoso spiritu, qui ab imbecillo calore ingenito, ex succis semicoctis, crassis, glutinosis nascitur, aut à calore auctiore, & ex humore, qui in membro continetur subfrigido, crasso, glutinoso.

Prælag. incidit iuuenibus magis quàm senibus. Quidam sanantur tribus diebus. Quidam ex præcipiti pereunt, ob conuulsionem pudendi.

Meth. m. Crassi spiritus extenuatio, & densi corporis in quo includitur arefactio, curatio existit. Totum corpus vacuare oportet, modò id capax vacuationis sit, præcipuè per sanguinis missionem, & purgationem vomitoriam, aut deiectoriam, frictionem, & dimotionem superiorum partium, & non infernarum, balneum aquarum digerentium.

To. IIII.

H

Ined

Inedia quoque ex accidenti euacuat, potissimum ubi ambiens calet. Ab his lumbis, & pudēdo si calidiora sint effecta, imponendum quod ad proportionē caloris refrigeret, sin aliter inter initia quidē omnino quod modicē refrigeret, postea verò id necessarium non est. Commune est enim præceptum omnium ferme quos vitiosus succus creat morborum, quòd in fine calfacientibus, & siccantibus sit vtēdum: nam quod reliquum humoris est, prorsus absumunt, sed victus exhibēdus qui & flatus aduersetur, & siccet.

De gonorrhœa.

CAP. XXV.

Gονορροία est seminis profluuium. Inuita seminis effluxio. Vel assidua seminis excretio, cole non extenso. Intento tamen pene accidit. Instrumentorum seminis affectio est, non pudendorum, quæ seminis genitalis via sunt, qua excernantur. Vnde fallitur Gariopuntus qui gonorrhœam vesicæ, & vteri passionē retur: hic loci semen pro genitura inauditur: aliàs tamē differunt, est enim genitura maris semen. Semen autē mixtio genituræ ac sanguinis menstrui, secundum Aristotelem. Legitur interdum fructus pro semine frequenter, apud Dio. & in sacris, *οι υιοι ο μωδός τ λαρω τ γασρός*, id est, filij merces seminis vētris. Et alibi, Inimicitias ponā inter te, & mulie

lierem, & semen tuum, & semen illius, hoc est fructum illius, quod Stechus non animaduertit, in docta sua cosmopœia.

Insuper gonorrhœa proportionē respondet menstruorum profluuiū: nanq; menstruorum purgatio fœminis perinde est, vt coitus maribus, vt innuit Aristoteles. Item menstrua, inquit, semen sunt, quanquam non purum. Itaq; simul pueris, & puellis feminis, & mensium via paratur, & fit, vt sentit cum Hippocrate Aristoteles. Accedit his, quod sicut in puellis menstruorum, ita in pueris veneris initium, tollit comitalem, vt affirmat Celsus, & Plinius. Aristoteles quoque per virorum menstrua intelligere videtur genituræ profluuium, quum ait, Menses patiuntur viri suo modo vt mulieres.

Causa gonorrhœæ, est imbecillitas retentricis potentiæ in seminariis vasis, vel eorum tensio ex conuulsione: nam in illis qui præter naturam se habent recrementorum retentio, propter excretiæ imbecillitatem, excretio verò ob retentricis infirmitatem euenit, vel propter dispositionem cōuulsoriam. Imbecillitatis autem occasio est nimietas, qua cōtentrix grauatur, ac deprimitur, vel feminis acrimonia, aut tenuitas, vt vult Trall. Rursus conuulsionis causa est plenitudo, aut inanitio. Conuulsio enim à succis mordacibus facta, ex inanitione fieri dicitur. Apud Gal. profluuium quoque ge-

H 2 nita

nitale inflammatione sanguinea solet contingere, vaporum scilicet spermaticorum, vt autumat Aristo.

Digno. In feminis profluuium si speculum inuifimus, illud inficimus, vt idem ait. Si pudendo non intēto euenerit, retentricis in seminariis vasis imbecillitatē profluuium sequitur, si verò rigido pudendo acciderit, conuulsioni quodammodo similis erit affectus.

Prælag. gonorrhœa contingit maximè pubertatem transgressis, non solum in viris, sed etiam in mulieribus, in quibus sanè egrè tollitur. Hinc liquet menses mulieris gonorrhœam haud esse, vt innuere videtur Aristo. Nimia seminis profusio, tabe hominem consumit, vt ait Celsus. Quidam pollutione mortuus. 6. epi. Qui patitur fluxum seminis imundus est.

Remedia. menthæ siccæ 3. iij. sem. viticis, rad. iridis añ. 3. j. sem. rutæ 3. j. sem. lactucæ 3. ij. s. sacchari 3. j. fiat puluis, sumat cochlear parum dua^{par}bus horis ante cibum. Consule Monta. & Al. B.

Amuleta. annulus cum topazio gestatus. Annulus item ferreus, ex gladio vel ense, quo aliquis fuerit occisus.

De onirogmo.

CAP. XXVI.



Ναιρόγον & ὀνιρωγμός est semini exitus per somnia, qui semel contingens, non habet

betur loco morbi, vt ait Aurel.

Causa partium seminalium robur, aut materiæ copia, aut vitium, vt pote irritans acrimonia, vt ait Philargius apud Aet.

Præfag. pollutio nocturna per quietem accidit maribus, & fœminis. Nicippus in febre somnia veneris patiebatur, nec in peius declinabat, crebroq; hæc passus est, nihilq; læsit. 4. epi.

Ad reprimendam venerem. Coire cum vetulis infirmat colem, vt asserit Monta. Coriandrum, aut pulegium si frequenter edatur, penem flaccidum reddit. Coitus lactucæ esu languescit. Libidinē retinent tro. ex agno casto Clemētini deuorati, & suffiti. Semen viticis comestū arcet veneris stimulos, apud Gal. & Dio. Matronæ Atheniensium castitatem custodiētes, viticis foliis cubitus sibi sternunt. Mulieris libidinem reprimat puluis virgæ tauri rubei ex vino potus, dos 3. j. Ras. Veneris tēdiū facit illitio lumborū ex sanguine ricini bouis syluestris. Vt venus sopita fiat genitalia illine ex succo solatri, & semperuiui cum aceto. Succus verbenæ potus. Oleum nenupharis cum camphora illitum. Conseruæ nymphææ vsus, frangit venerem, præcipuè cum syrupo papaueris.

Amuleta. topazius lapis gestatus, saphirus, & smaragdus. Bardana quoq; in pudendis gestata venerem reprimat.

Ad testicularum affectus. CAP. XXVII.

Estes inter principes partes statuit Gal.
2. ar. p. hosq; præstantiores esse conten-
dit, primò de semine, licet 6. de usu. p.
eos inter viles, & ignobiles partes repo-
nat. Nasi magnitudine mutonis concipitur quan-
titas. Vnde nasuti dicuntur viriliores ac bene mu-
tonati, vt ait Cælius.

Ad testes pendulos, spuma cochlearum illita
medetur. R. succi cyclaminis ℥.j. mellis ℥.s. lycij
℥.j. misce, & illine. Testibus nimie crescentibus ci-
cutę radix trita & cum oui albo imposita medetur.
Veretri tumorem cataplasma ex lente elixa sanat.
Vt eunuchum sine ferro facias, radicę cicutę sine
ferro teres, inde testes sæpissimè inlines, & linteo-
lum super ligabis, ne excidat medicamētum. Item
radix nymphę contusa ex aceto edenda datur
puero.

Ad testium inflammationem clysmi molles in-
iiciendi sunt, mox fluxio reuellenda per sanguinis
missionem, & si cacochymia adest, deturbanda est
per cathartica accommoda, clemētia & non mo-
lesta. De topicis. Alterci semen album cum vino
austero tritum, & impositum tumorem deponit.
Ad idem muccaginis psyllij ℥.iiij. mucca. se. lini ℥.
ij. commista adapplicatur, etiam vmbilicos promi-
nen

nentes reprimunt, farina fabarum cum oxymelite cocta tumorē & feruorem sedat. Malua cū axungia pista, lauri folia trita. Aliud. ℞. foliorū maluarū, foliorum hyoscyami, meliloti añ. m. j. elixa pista, & cribrata cum farina fabarum, & chamæmeli cum rosaceo fiat cataplasma, addendo croci ℥. s. lutea ouorū ij. Ad testium duriciē optimū est empl. diachylū Mes. Aliud. ℞. aceti acris ℥. vj. mellis ℥. iij. fiat oxymel. in quo misce furfuris tritici pisti ℥. j. ammoniaci in eo dissoluti ℥. ij. fiat empla. quod calidum, & subinde applicetur.

Ad vlcus pudendi.

CAP. XXVIII.

AD vlcus pudendi. ℞. aloës 3. j. croci ℥. j. cum aqua agrimonix fiat iniection, vng. de lithargyrio elaborato. Amylum tragacanthi, gummi arab. conueniunt in vnguentis: quia exsiccant, dolorem mulcent, & refrænant acrium medicamentorum qualitatem. ℞. tutiæ præpa. ℥. s. mast. thuris añ. 3. j. cum cera alba, & rosaceo f. vng. Aliud succi virgæ past. plant. symphyti añ. ℥. iij. camphorę ℥. iij. amyli ℥. ij. cerusę ℥. j. litharg. ℥. s. tutiæ præparatæ cum aq. ros. 3. vj. fiat vng. molle in mortario plumbeo, curat interna vlcera. Sicut aloë est optima medicinarum in recēti vlcere, ita tutia in antiquo est melior 2 i. fen tertij.

De herniosis, & biherniis, omnibusq; ramicum

H

4

gene

generibus, pluria & spectata remedia conscripsimus, in libro nostro, cuius titulus est, Chirurgica auxilia.

De naturali mensium purgatione. CAP. XXIX.

Menstruum à mense dictum, quòd omnibus tricenis diebus in muliere existat. Est è locellis sanguinis superuacui quantitas, & qualitatis ratione deiectio. In prægante, inquit Gale. dum natura foetum efformans augensq; optimum sanguinem trahit, vitiosissimus in venis relinquitur, qui post partum segregatur.

Causa externa, menstrua Lunam sequuntur, ac idem est mensis Lunaris, & purgationis muliebris, apud Aristo. & Auic. Attamen multis, inquit Aristoteles, desiderio coitus quo tenentur, menstrua sæpe ter in mense citantur, donec concipiant. Menstruum contingit mulieri, ut eius sanitatem tueatur, ut Hippocrati placet. Menstruo primò plures morbi sanantur, teste Celso, Scribonio, Plinio. Passiones quæ nec in pubertate solvantur pueris, aut puellis quum menstrua erumpunt, consanescere consueverunt. 6. epi. Sciendū tamen quòd in purgationibus menstruis, & partu, mulieres maximè refrigerantur: quia tunc rectus fit, & apertus meatus matricum, ut ait Gal. Menstruorū purgatio perinde

inde est fœminis, vt coitus maribus: nam menses semen sunt, vt autumat Aristoteles, quãquam non purum, sanè sanguis, & sperma generationis nostrę primordia sunt, ille ceu materies, hoc opificis rationem obtinens.

An menstruũ solis mulieribus contingat? menstruo mulieribus cur opus sit, & non viro Hippocrates inquit lib. De fœminarum morbis, & Plinius inquit, solum animal menstruale mulier est, sed menstrua esse excrementa, omniaq; quæ sanguine prædita sunt, fœmella scilicet, & quæ viuum fœtum edunt ea emittere, astruit Aristoteles, vt videlicet fœtum quem statò tempore vtero gerunt, planè alant, & sustentent. Rursus omnium, inquit, animalium mulieribus inter fœminas plurima menstrua purgatio. Nã aliis hoc materiæ superuacuum vertitur in corporis alimentum.

Tempus in quo fluere incipiunt, aut desinunt non omnibus idẽ est: nam plurimis 14. anno fluere incipiunt, paucis ante 13. aut 12. plerisq; post 14. erumpunt. Verum cita, & festina menses eruptio, vitę breuitatem indicat ob alteratricis potentie infirmitatem, nisi præcox à veneria fiat. Coitus enim viam faciliorem mensibus reddit. Menstrui profluuium non solum est euacuatio, sed purgatio. Desinunt menstrua aliis anno 50. paucis autem usque ad 60. durant. Obesis à 35. anno cessare in-

H 5 cip

cipiunt, humidis non multo tempore durant. Nec tempus cuiq; purgationi statum ordinatumq; est, minimum tempus quo purgatur mulier est dies vnus, maximū autē 7. Multis ad duos tres'ue dies, haud paucis vsque ad quintum profluit, aliis adusq; 7. raro ad 12. purgatæ sunt. Profluuium mensium decrescente Luna contingere putat Aristo. Iunioribus tamen in coniunctione, & plenitudine menses profluere, omnibus in confesio est.

Noscere item conuenit quòd menses incipientes, & desinētes pauciores, & tenuiores prodeunt, in diebus intermediis, crassiores, & plurimi: moderati autem sunt, prodeuntes in omni muliere si sana est, vt duarum heminarum mensura, aut paulo plures, vel pauciores, atque hoc ad duos, aut tres dies, longius verò tempus, aut breuius morbosum, & sterile est. Menses retinentur in conceptione, vt foetui fomentum ministrent, & ad lactis generationem: vnde si grauidę purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum, licet quibusdam prægnantibus vsque in postremum gerendi tempus menses eueniāt, sed eis accidit, vt proles infirma procreetur. Quandiu lac emanat, purgationes magna ex parte non exeunt: natura enim ita fert, ne humor locis pluribus simul erumpere soleat: nam & mariticas habenti deteriores accidunt purgationes.

Cur mulier menstrui tempore speculū aspiciens
pro

tinus ipsum inficit? An quod lumina afficiuntur quæ maximè porulenta venulentaq; sunt? Mensium cognitio in linteo complicato, tenui cinere con-
sperfo in sole ficcato, vel in arena.

De immoderata mensium purgatione. CAP. XXX.

Menstrua immodicè excreta sequuntur morbum totius vel vteri, nempe plethoram, vel qualitatis repletionē, vt pote, sanguinis calidioris, vel tenuioris, apertionemq; venarum vteri. In summa huiusmodi profluuium incidit ob sanguinis vitium in qualitate, aut quantitate, ob vasorum apertionem, aut eorum dyscrasiam: vnde fiunt mollia ex humore, dura ex siccitate, tenuia ex inedia.

Digno. sanguis multus ex magnis vasis profluit, nō multus ex paruis ruptis vel apertis. Ab erosione verò exiguus, & paulatim, sed cum dolore effluit.

Prælag. si menstrua plura fiant, morbi accidunt. Profluuia sanguinis è vulua quanquàm nō profusione ipsa periculosa, at certè ob diuturnitatē non sine periculo. Quum menstrua immodicè vacuantur, sequitur color scædus, pedes molli tumore attolluntur, corporis robur prostermitur, vitiatu-
borum tum concoctio, tum cupiditas, atq; in totū omnia, quotquot hæmorrhagiā sequi cōsueuerunt, accidentia, huiusmodi scæminas infestant.

Met

Meth.m. Quæ de profundo sanguinis profluvia erumpunt, per antispasim ac deriuationem ad vicinia sanare oportet, præterea per cibum potionemq; , qui & emplasticam vim habeant, & refrigerent, & medicamenta quæ astringant, sed hæc extrinsecus posita ante euerfionem nocent. Si menstrua sistere placet *σίμυα* grandem apponens ad mammas, sed satius erit non ad mammas, sed sub ipsas firmare sicyā grādem, vt validius auocet materiam ab vtero sursum versus. Ad summam, hæmorrhagia sistetur, si sanguis cōfluere prohibetur, aut si vasis diuisio claudatur. sanguis autem fluere prohibetur propter animi deliquium, & quum ad cōtraria reuellitur, & quum ad vicinia deriuatur, & per refrigerationem totius corporis: & partis affectæ. Clauditur diuisio si contrahitur quod diuisum est, vel obstruitur. Contrahitur astrictione refrigerante, obstruitur intrinsecus trumbo, extrinsecus linamentis, & emplastris.

Remedia. *℞. succi plant. depurati lib. .s. mucaginis gummi, & tragachantæ extractæ ex aqua ros. añ. 3. j. valet sumptum, & iniectum. Aliud. sang. dra. 3. ij. cum succo sanguinariæ vel solatri, iniicitur. Infusum ex spodio cum succo plāt. opitulatur. Aliud fit ex tro. de carabe solutis cum aqua chalybata. ℞. mumix 3. j. athanasix 3. j. cum succo millefolij fiat collyrium. huc refer vng. Comitissæ. ℞. gypsi crudi lib.*

lib. s. gummi arabici aſi ʒ. j. cum aquato oui fiat empl. in vtroque vteri ſitu. R. gallarum, libani, acacia, aluminis, terræ ſigil. añ. ʒ. j. cum ſimo aſini fiat peſſulus, vel ſimum diſſoluatur cum aqua plant. & bolo armenia, & fiat empl. publi. De aſſumendis ſpectata ſunt ſy. myrtinus, ſyr. è roſis ſiccis, de agreſta, de portulaca, myrobal. rha uſtum, micleta, pilulæ de bdellio. Triphera minor, diaolibanum, philonium, perſicum, ſcobs dentis equi fluuiatilis pota, ilico, vt aiunt, ſupprimi fluorem, ſiſtunt etiam vinacei nuclei triti, & cum ouo ſorbili poti mane. Aliud. R. florum cucurbitæ, & nucamentorum, iuglandis añ. ʒ. j. fiat puluis. Cōcoregius dat ʒ. j. cum ouo ſorbili.

Amuleta. Iaspis, Alb. lapis corneolus, Ser. & lapid. R. ſis ſuſpēdere iubet mammis ſacculos cineris ranæ maioris plenos.

De menſium ſuppreſſione. CAP. XXXI.

SI animal menſtruale animal mulier ſit, nulla ſtrāgulata, abolita ve menſium purgatio, præter eam quæ ætatis ratione accidit, naturalis dici poteſt.

Cauſa ſupprimuntur mēſes vel vitio totius corporis, vel propter principem aliquam partem propria paſſione affectam, aut propter vterum priuata ægritudine vexatum, aut vitio ſanguinis, quo venæ

Cor: Diaphragma: Caput: Cerebrum: Spina: cum omnia Sen
Organa: Venticulus: Coxendix: Inguma: Lumbi
Rectum Intestinum: Splen: Dorsum: Brachia: Crura:
Abdomen: Vesica: Iecur: Rentes: Meſenterium:
Omnibus his Vterus conſentit Partibus æquæ
H. Delerim S. M. fecit

eum ferentes ad vterum obstruuntur. Aut propter robur vasorum vteri, quæ non admittunt quod influit, vel quia sanguis ad alia loca delatus est.

Digno. quum menses fuerint occultati, dolor habebit imum vëtre, & onus quoddam incumbere videtur. Et lumbos laterumq; mollitudinem dolor afficit.

Præfag. si menstrua non fiant, morbi matricarij accidunt. Menstruis deficiëntibus sanguis è naribus fluens bonum. Ex menstruo diu retento vteri calefcunt, & reliquo corpori calorem transmittunt, venæ totius replentur, quãdoque claudicatio ex hoc inducitur, stranguria, coxendix, lumborum dolor, bubo in inguine, vteri procidentia, & puris per pudendum excretio, ex sanguine, scilicet in vtero putrefacto. Menses bimestres in vtero existētes, multi ad pulmonem procedunt. Alij ad stomachum, aut alias partes, quibusdã suppurati fiunt, vbi diu morã traxerint. Mensibus à partu suppressis vteri inflammantur. Menstrua sex mensibus retenta, medullam non habent. Tamen retentis quadriēnio quædam peperit 5. epi. Mulieres quorũ suppressa est à partu purgatio in febribus in extremũ mortis discrimen veniunt, primo epi. com. 3. Mulier extenuata ob suppressionem mensium quæ sana euasit, ter repetita sanguinis missione.

Metho. m. suppressionis causam abigere oportet,

tet, dein mēses prouocare, & ora aperire vasorum,
quæ pertingunt ad vterum. Si obstructio nascitur à
sanguinis copia, tenui victu, & multo labore mulier
vtatur. Illi vena poplitis, vel malleoli secetur, prope
tempus consueti circuitus, sed primum in altero
crure sanguis detrahendus, postero die eodem mo-
do ab altero vacuandus. Mulieribus quæ probè nō
purgantur, scarificatio tibiæ mirè auxiliatur, siue
scalpello fiat, siue per hyrudinum applicationem.

Ad obstructionem à crasso, lento, vel à pituita
extenuantia, & incidentia conueniunt, vt sunt se-
rapia ex duabus, & v. radicibus, ex adianto albo,
oxymel, syrupus è scilla, syr. ex marubio, cum aqua
artemisiæ, betonicæ, hyssopi, fœniculi, vel cū aqua
radicum hali, diacalamentum Gale. pollen nepitæ,
& pulegij ex melicrato potum tardantes mensium
purgationes ciunt. Humores apparatus deturbandi
sunt hiera simplici cum agarico tro. Vel cum pilu-
lis de serapino, aut antidoto hæmagogo, pilulæ è
myrrha. Aliud. ℞. aquę pimpinelę ℥. iij. croci grana
ij. zucchini 3. ij. fiat potio, quā sumat bis in die. pro-
uocant menses. Ad idem, aloës 3. iij. cum succo sa-
uinæ f. pil. xx. sumat iij. alternis diebus immediatè
ante prædium. Castoreū prouocat mēses, etiam in
senibus, vt ait Aggreg. ℞. castorei ʒ. j. f. pil. iij. sumat
mane instantibus mensibus. Ad idem, borracis,
cassiae lignæ añ. 3. j. cum aqua adianti fiat potio,
quam

quam bibat in neomeniis, vel circa statum fluxus terminum. Vulvas purgat nucamentum nucis iuglandis cum vino potum ad 3. s. sunt etiam qui propinant cum decocto faseleorum potandum.

De pessulis, & suffumigationibus, menses tardantes ciunt. Ceruina medulla inuoluta sindone munda, & imposita. Alius ex pul. aristolochiæ rot. subactæ cum melle, imponitur, pressus ex triphera magna sine opio, cum oleo muscatelino. Menses etiam elicit succus radicum cyclamini imo ventris illitus. Item suffitus ex tro. de myrrha. Ratio victus salubris est incidens, & attenuans, folia erigerontis ^{*} concisa cum oleribus comedere vtilissimum.

^{*}
senecionis.

*De deprauata mensum excretionem, fluxuq;
muliebri.*

CAP. XXXII.

Vlux fluor totius corporis recrementi est destillatio, quæ talem speciem representat, qualis est humor in corpore superans. Indeque ducuntur differentiæ.

Digno. eruptio rubra sanguinis faniem declarat, alba pituitam, pallida amaram bilem. Loci continuè madent humoribus, qui si cū dolore emanant, vterum esse exulceratum indicant. Si mammarum papillæ crocæ fuerint, & rubrum circa easdē croceum sit, morbosum vas, id est, vterus.

Præfag. Mulier purgatione indiget, quæ menses
deco

decolores habet. Menstrua alba puellis etiam eueniunt, & magis si cibo vtuntur humidiori: hæc incrementum impediunt corporis, & puellam extenuant: profluuium album natu grandiores potius foemellas quàm nouellas molestat. Alba fluxio fit, si mulier laxis sit carnibus, & pituitosa. Alba fluxio declinantes, rubra verò ætate vigentes ferè committatur, vtraque si suis ætatibus contigerit, facile curatur, sin alienis, difficulter. In omni defluxu os vteri aperitur, ac veluti relaxatur. In fluxu muliebri conuulsio, & animi defectus malum. Vxor Boëti à candido fluxu vno mense à Galeno sanata.

Metho.m. In omni mensium fluxu deprauato propius vteri morbus primò curandus, mox caco-chymia purgāda. Sæpius sufficit ad curationem ex toto corpore facta purgatio, vt ait Oribasius. Interdum intacto vtero, sed vniuerso corpori remediis adhibitis sanatur: sed de vtero oportet ratisper esse sollicitum, ne quæ confluant prompte recipiat. Gal. in vxore Boëti vnctiones astrictorias pudendis adferre iussit, & siccare non modò vteri regiones, sed & totum corpus. Itaque humorem qui in vterum vergit per aluum declinat hydragogo, & per vrinā diureticis. Deinde superfluam totius humiditatem per cutem dissipat, corpus melle cocto illinire, & linteis pefricare faciens. Victus quoque rationem instituit ex potione paucissima, & esu auium mon-

To. I I I I.

I

tana

tanarum, pisciumq; saxatiliū. Alba profluua san-
 nat esus cardunceli cum nepita loco acetarij, ante
 pastum. Cōfert nardum, & rus, elec. hypocystidis,
 Monta. elect. de scoria ferri, Alm. vel Clem. ℞.
 muccaginis gūmi arabici, & tragacanthæ extractæ
 ex aqua ros. ℥. iij. succi plant. ℥. iij. sacchari rosati
 solidi q. s. misce, sumat per os, & iniice per menta-
 crytem. ℞. ossium crurum capi, faucium lucij adu-
 storū añ. 3. ij. ambræ, cytini, antheræ, coralli vtriūsq;
 añ. 3. j. rasuræ eboris, margaritarum añ. 3. j. se. myrti
 3. s. zucchari rosati solidi ℥. iij. fiat pul. sumat 3. j.
 cum succo vel decocto portulacæ. Ad idem ℞. ci-
 neris putaminum oui, cornus cerui, succini, se. ane-
 thi añ. 3. ij. f. puluis, sumat ex aqua chalybata. Ebur
 daturum lacte ex semine lactucæ extracto ex aqua
 chalybata. Dio. portulaca cōmāducata, p̄sidio est
 itē balauustum rubri fructus, & flos, equisetū maxi-
 mē sistit rubrum fluorem ex aqua, aut vino potum,
 hypocistis, samius aster, lemnia sphragis, coagulum
 hœdi, leporis.

Vrinam mouent, & ciunt aqua cui asarū, & apiū
 sit incoctum pota, succus granorum vesicariæ in
 vmbra siccatus, & potus ex vino albo. De hydra-
 gogis sunt sy. rosatus laxatiuus, syr. è floribus persi-
 corum. Apozema nostrum quod recipit corticum
 myrobal. omnium añ. 3. j. soldanæ ℥. s. liqui. rasē ℥.
 s. passularum ℥. j. se. anisi 3. j. s. in aqua suff. fiat de-
 coct

coctio colata, dosiſ ʒ. v. plus minus, ſecundū ægro-
tātis vires. Aliud fiſeleos, ameos, hyſopi añ. ʒ. j. cor-
ricum mādragore ʒ. s. agni caſti ʒ. ij. caſſiæ lignæ,
peoniæ añ. ʒ. s. macropiperis, piperis albi añ. ʒ. j. s.
in lib. x. vel xj. aquæ ad conſumptionem tertiæ par-
tis, adde zuccharum, aut mel, vt colata dulceſcat,
ſumat omni mane ʒ. v. vel ſex, hydragoga etiam
ſunt elaterium, pilulæ de elaterio N. vel noſtræ quæ
recipiūt aloës ʒ. j. maſtichæ ʒ. s. corticis rad. cucu-
ſylueſtris ʒ. j. s. cum ſyr. de cortice citri formetur
pil. huc refer peſſulos Aeginetæ, Myrep. & N. Ale-
xandrini.

De ſterilitate.

CAP. XXXIII.

M Vliebris infœcunditas eſt actio vteri of-
fenſa cōceptionis, ſcilicet abolitio. Vte-
rus enim ſemen genitale ad ſe trahit, vt
Oribasio placet, attractum continet, &
contentū cōcipit. Vnde cōceptio eſt propria vteri
actio, motus videlicet vteri, quo paulatim in ſe
ipſum cōtrahitur, & obuoluitur ſemini, vt vndiqua-
que ipſum amplectatur ad fœtū perficiendū. Itaq; ſi
rectū ſui, & obliqui index ſit, & regula, vt vult Ariſt.,
liquet quòd infœcūditas omnis accidit propterea
quod vterus ſemen non cōcipit, vel quòd iā appre-
henſum corrūpit. Atq; huc vniuerſæ cū externæ tū
internę ſterilitatis cauſæ ſunt referēdæ. De externis

I 2 sunt

sunt saltus à coitu, vt in Musoërgo, & illa medicamēta, quę quia sterilitatē afferunt, & conceptū adimunt, atoria, ecbolia, & phthoria dicuntur. Itē sterilitatē faciunt radix xiphij, & filix vtraque, viris autem hederæ nigræ candidiores corymbi poti. Climēnos, caprifolium, fœminis hederæ, corymbi, & asplenion. Arcet conceptus picis cedria genitalibus antē coitum illita, succus salicis vel populi vel git potus. Os de corde cerui brachio suspensum nō finit concipere, Pandect. Idem efficit ossiculū quod in vulua asinæ est, gestatum à muliere, si vera dicit Constantinus, vana puto quæ de mula, & burdone scribunt Sextus, & Rasis. Iam verò vterus geniturā non suscipit, vel propter membranam quæ superexcreuit in eius osculo, vel ob lēSIONem in eius stomacho. Non retinet si os eius sit à pudendo omnino auersum, vel parum distortum, vel conclusum, vel hians, vel durum, præterea geniturā immissam, & contentam corrumpit ob menses strangulatos, & si quid ex ipsis in eo remanet, semen etiam perdit pus, quod ab vteri vlcere, vel tuberculis nascitur. Multæ genituram etiam cōtinentes, prægnantes nō fiunt, vteri stomacho præter naturā hiantē. Mulier præter naturam pinguis vel crassēfacta non concipit. Quæ frigidum, & spissum vterum habet, non concipit, ob angusta vasorum ora, quæ ad vterum pertingūt. In vuluis etiam præhumidis extinguit

guitur genitura. At in siccis, & calidis corrumpitur defectu alimenti.

Digno. petūtur à totius corporis temperamento: nam steriles sunt mulieres viragines, & viri fœminares. alteris menstrua desunt, alteris semen exile frigidumq; est, semina infœcunda sunt quæ tenuia, fœcunda verò quæ grandinis speciem referunt. Semen infœcundum est vsq; ad 21. annum. Et prodeunt nonnulli à primo ortu impuberes infœcundiq;. Mulieres similiter. A pube, & pudendi sinu glabris vel hirsutis, à veneris appetentia, cita, tarda, intēsa, remissa. A feminis in coitu emissione festinata vel lenta. A feminis cōsistentia quātitate, & qualitate, à menstruis ac aliis excrementis. A dolore, duricie ac tumoribus vteri, quorū aliqua etiā visu, & tactu deprehendi possunt. Quæ menstruis carent steriles magna ex parte: verū fieri potest, vt aliquæ sine eorum profluuiio concipiant, videlicet quibus tātum humoris colligitur, quantum his quæ purgantur, restare solet.

Prælag. gignendi facultas tollitur his, qui à varicibus tenentur. Secundum aures venæ sunt, quæ sectæ sterilem reddunt. Abundans equitatio tollit luxuriam, quoniam inde vasa spermatis conteruntur, & tepefiunt. Tamen qui equitant assiduè euadunt libidinosiores. 4. probl. Mulier plorans in coitu, non concipit. 9. cont. Mula ideo sterilis, quia

matricem habet obliquā, vt putat Orus. De mula quę gemellos peperit, meminit Arist. 6. de nat. ani. de muliere sexagenaria, & de alia octogenaria quę concepit virtute pessuli, mentionem facit Myr. solent feri partus vel ob id esse gratiores, quod præterea nihil speratur.

Meth. m. necessario oportet vterum curare, siue is afficiatur idiopathia, siue sympathia.

Remedia, succus saluix potus facit concipere. R. seseli ʒ. s. rasurę eboris ʒ. j. sacchari ʒ. x. f. puluis, puluis vteri leporis exsiccatus potus à purgatione mensium facit concipere. Vel assiduę mulier vterum leporis frixum comedat, vnguanturq; genitalia eius, & viri ex sanguine leporis ante congressum. Vel ex fimo leporis cum seuo bubulo. Cinis vuluę leporis bibendus cum vino datur. Myrep. lac equinum à muliere potum, cuius sit lac ignorante, si à potu statim coeat, concipiet, vt scribit Rasis, qui etiam laudat emplastrum de vulpe, & pessulum ex felle vulpis: eius etiam testes triti, & poti benefaciunt. De his quę ad applicantur est balneū aquę dulcis in quo sint elixata, artemisia, matricaria, anethum, folia canapis, syl. añ. m. j. & à balneo illinatur vterus oleo momordicę: mirabile est vt ait Sardus. Iuuat etiam conceptum epithema ex libano, & vino pectini calidum admotū. Bistorta quoq; cum pulueribus aromaticis confert conceptioni quia

quia vim vteri retentiuam confirmat. pessulus è ladanio puro conferre videtur in omni causa: quia vterum roborat. Clysma vteri quod cõfert ad conceptionem. ℞. galbani puri ℥.vj. lactis caprini lib.ij. bulliāt simul, & iniiciatur per metranchytū. Aliud. ℞. hyperici, meliloti, rad. peoniæ, vel seminis eius añ. ℥.j. myrrhæ, carpobalsami, gallarum, balaustia añ. ℥.s. tusa bulliant in lib.ij. aquæ coelestis ad consumpt. medietatis, infusum vterum exsiccat, roborat, semenq; retinere facit. huc refer clysma vteri, ex Actio.

Amuleta. lapis in cerui vulua, ventriculo, vel corde inuentus, facit cõcipere, Constan. Ossa cordis cerui sinistro brachio adalligata cõceptionem iuuant, arcana vi, Aet.

Vt mas concipiatur, si dextrum testem exertum hircus habeat, marem generat, si verò sinistram foeminam. 6. epi. quod non probat Aristoteles. 4. de g. animalium, sed Hippocrati astipulatur Galenus 2. de sem. Mulier dormiens super latus dextrū vix pariet foeminam. Adipe anseris, & terebinthina loci perungantur per biduum, tertio die viro iungatur, qui sinistro teste ligato venere vtatur. Latæ cotyledones foemellas gignere videntur, parua, & conclusæ masculos, quas coquito vna cum salē, & cumino, in aqua, & tepidam sorbendam exhibeto. Mercurialis mas à purgatione pota, eiusq; folia pi-

I 4 sta,

sta, genitalibus admota, mares gigni facit, Dio. teste, cui subscribit Plin. inquit, ut mas gignatur facit succus mercurialis potus. Radix scolimi in cibo, confert aliquid, ut mares gignantur. Satyrion mares gignit, & arsenago non. Gallinaceorum testes subinde à cōceptu edat mulier, mares in vtero fieri dicuntur. Mares gigni facit testiculus leporis à purgatione menstrua potus. Idem præstat pulvis vuluæ leporis à viro, & muliere ex vino potus, quæ si sola mulier biberet, conciperet hermaphroditum, si aphricano Constantino credimus libro de animalibus. farina penis cerui crudi, & pota confert. Al. B. Cratægonon genitalem vim ita roborat, ut diu præsumptum mares figurare prodatur. Mares etiam facit aristolochia longa vuluæ apposita. Si edas testes duos hædi assos, & coëas eo die, masculum generabis, si verò vnum tantum comedas puer nascetur cum teste vno, ut prodit Rases.

Ad liberos generandos pulchros, docet Galen. lib. de theriaca ad Pisonem. Ad pulchros, & bonos, docet Plin. De herbis quæ ad animum, & mores faciunt mentionem facit Theophrastus 9. de histo. plant. Ingeniosi procreantur, si prægnans frequens frequenter edat cotonea. Ad mares generandos vir dextro pede fascia candida vincto cum muliere coeat, si verò sinistrum pedem colorata fascia ligauerit, fræmellam generabit: est enim magnus consen

sensus pedum cum testiculis, vt refert Aristoteles, qui etiam inquit, quod omne animal carens pedibus, caret testiculis, satyrij ac serapidis radix solida, salaces facit, & masculis generandis prodest, flaccidior verò contrarium efficit, vt tradit Aet.

Proles quod ad ætatē attinet, optima est, quum vigent parentes. Quoad tempora præstantior est, quæ hyemis initio gignitur. Deterrima quæ æstate: prima seminis emissio, aut infœcūda, aut si fœcunda imbecilliora generat, & pauciora. Aptus ad masculinam conceptionem dies mensis decimus. 16. 20. Ad fœmineam decimus quartus, ad vtranque nonus. Nuptiis verò aptus est quartus, vt credidit Hesiodus, lib. cui titulus opera, & dies.

De fœcunditate, & conceptione. CAP. XXXIIII.

QVanquam in excrementis quæ à naturæ modo recesserunt, calor vitale principiū habens contineatur, vt conspectē visitur de scarabæis in fimo equino vel asinino natis, Gal. tamen de vi formativa fatetur se dubitare, forsan propter summum eius artificium, quod videtur vires naturæ transcendere, ideo eam vocat artem, & sapientiam summam, verum ob eam quā nati continent parentum similitudinem, cogitur ad animam vegetabilem quæ semini inest hanc referre. Est autem semen mixtio genituræ maris, quæ

architectatur, & fabricat, & sanguinis menstrui;
sicq; genitura vtranque partem continet materia-
lem, & efficientē, ex Aristotelis sentētia. Rediturq;
foecundum ab ipsissima causa quæ format foetum,
quæ est calor non cœlestis, nec extrinsecus adue-
niens, sed insitus semini, huius caloris natura nō est
cœlestis, sed cœlesti proportionalis: quia genera-
trix, & minime peremptrix, siue proportionē re-
spondens elemento stellarum, vt loquitur Aristot.
estq; virtus naturalis, & non animalis, quoniam na-
tura secundum Galenum, & Simplicium ab anima
differt.

Conceptio autem fit, vel incipientibus, vel ces-
santibus menstruis, alio tempore nunquam, si cre-
dimus Hippo. Gal. Sorano, post muliebria prom-
ptius concipiunt. 6. epi. At totum conceptus arti-
ficiū in quatuor tempora distributum est. In pri-
mo quidem tempore forma seminis præualet, vt
apparuit de effluxione sex dierum in Musoërgo. In
altero tempore carnosā substantia conceptus fa-
cta est. In tertio tria principia manifestē videntur,
reliquæ verò partes vmbrailem quādam designa-
tionē ostendunt. Postremo tempore manus, & pe-
des sunt articulati, & nō amplius foetus, sed infans
conceptus nominatur. Istis reclamationem quod scriptū
est lib. de carnibus qui vitā hominis septē dierum
esse affirmat: nā genitura, inquit, postquā in vterum
per

peruenit in septē diebus, habet quæcunq; corpus habere debet, idq; probare cōtēdit ex vi septenarij quæ his repugnāt, quæ de Musoërgo scripsit lib. de nat. foet. ob id librū de carnibus spurīū esse autumo.

Dignost. fœcunditas seminis in aqua probatur, fœcundum enim in imum descendit. Mulierum fœcūditas probatur suffitu, illituq; vt colores oculis impositi saluam perficiant oris: nam nisi hoc ita fiant, meatus corporis per quos excremētum descēdit, confusos, obseptos, & obcæcatos esse significatur. Itaq; Hipp. pessulū pręscribit ex trita allij spicula, cuius odor si in os venerit, cōcipiet: sin minus nō concipiet. Lac fœminæ puerū lactātis, & butyrum ieiuna sorbeat, si nauseabit concipiet, sin minus nō, vel tritū anesum dormitura cum aqua potet, si circa vmbilicum pruriat, cōcipiet: sin minus, nō cōcipiet. Paruę melius concipiunt quā magnæ. Macilentę quā crassę. Candidę quā rubrę. Nigrę quā liuidę quæ venas patētes habent, quā quæ non, & quæ mammas turgidas habent, quā quæ paruas. Insuper nosse oportet, quod quæ miscentur in generatione, debent quandam habere naturæ conuenientiam, nam quorum natura à se mutuo, magno distat interuallo, licet coëant aliquando, non tamen generare quicquam possunt. Itaque non mediocris ars est, vt Gal. inquit qua viros, & fœminas temperamento inter se cōuenien-

tes,

*illituq;
hæc.*

tes, cōiungere scias, nempe vtero sicciori familiare humidius semen est, humidiori siccius, calidiori frigidius, frigidiori calidius. Quamobrē biliosi cū pituitosis, & atrabiles cū sanguineis decenter cōlociantur. Nec amor inter picrocholū, & sanguineū firmus est, multominus inter vtrūq; picrocholum. Neq; inter picrocholū & melancholicū stabilis est, sed de his Ficinus, in conuiuio de amore Platonis.

**
rigor.* Conceptionis signa, semen vtrunque marinum, & scēmineum commiscetur, & à coitu non exit. Quum conceperint, confestim horrent, calefiunt, dentibus infrendent, omnesq; articuli conuelluntur, corpusq; totum ac vuluam tremor, ac torpor inuadit, quod illis accidit quæ puræ biliosæ sunt, & nō humidæ crassæ, aut mucosæ. A cōceptu mucosæ morosæ fiunt, malos cibos appetunt. Stomachus corq; vexatur. spuunt. Si cessant purgationes, neq; febris neq; vigor superueniat, & fastidia incidunt, iudicā ipsam in vtero habere. Si velis noscere an cōceperit, dormiture aquā mulsam potu da, & si alui tormina patietur, cōcepit. Prægnatiū oculi retracts, & caui, liuidiusq; eorū album est, lentiginosa maculosaq; facies, forsan quia fœtus optimum sanguinē trahit, & vitiosissimus in venis relinquitur. A cōceptu decimo die dolores capitis, oculorū vertigines, tenebræq; fastidiū in cibis, redūdatio stomachi, indices sunt hominis inchoati. Indiciū concep-

ptus,

ptus, quum statim à coitu locus siccescit, paucis con-
tingit, vt melius habeant, quum vterum gerunt,
sed præcipuè tunc fastidiunt, tædioq; fatiscunt, cū
foetui capillus oriri incipit.

De numero natorum qui nascituri sunt.

CAP.

XXXV.

Numeri suscipiendorum deinceps libero-
rum præsagium, sumitur ab vmbilico in-
fantis primogeniti: nā quot nodos vm-
bolicus habuerit, totidem deinceps libe-
ros puerperam parituram prænuntiat, quod prodi-
dit Albumasar, & Salycetus, hoc verax fuit indicatiū
in prole Reginæ matris Christianissimæ.

Mas ne, an fœmella in vtero. CAP. XXXVI.

Signa ducuntur à foetus situ, & motu. Ma-
res quia in dextris, ideo nigri. Mas fœmi-
na citius cōcrefcit, formatur, moueturq;
in vtero. Mares foetus circa 40. diem
dextro potius latere mouentur, fœminæ verò sini-
stro, circiter diem 90. Mas trimestri, fœmina qua-
drimestri spatio mouetur. Mobiliores sunt mares
in vtero, quàm fœminæ. Contingit tamen aliquan-
do, licet rarum sit, vt concepta fœmina sit mare
robustior, & multis, & validis motibus moueatur.
Mas quàm fœmina citius concrefcit, & mouetur:
quia

quia calidior, foemina citius adolescit, ob corporis mollitudinem, sed prius incrementum in ipsa finitur, propter imbecillitatem facultatis naturalis. Calidior masculus ex venarum magnitudine, & colore iudicatur. Dextrae omnes partes sinistris, ob hepatis situm calidiores, & valentiores. Mares plurimi in dextra vteri parte concipiuntur: quia ad hanc per renes sanguinem repurgatum, ad sinistram vero immundum, & serosum, descendere intuemur. Et decem est in calidiore calidiorem foetum coalescere.

A tempore conceptionis, flatibus enim aquiloniis magis quam austrinis, mares generantur, si coitus matutinus fuerit, mas erit.

A parentum aetate, & crassi, & victus ratione, si quidem nouella, & senescens aetas magis quam florens, foeminas generat. humidiora etiam corpora, seminaque humida foeminam potius gignunt, Aquae crudae, & frigidae aut sterilitatem, aut partum foemineum faciunt. Vbi asperiores vocem reddere quis incepit, si testis dexter sinistro magis in tumorem eleuetur, seu magis extra promineat, masculum generabit, si vero sinister foeminam.

A matris colore, oculis & mammis, papillis, ventre, pulsu, motu, atque decubitu. Si marem concepit, bene colorata est, si foeminam male colorata. Illic est partus qua maior fuerit mamma, & maior oculus, & clarior. Si papillae superiora spectent, marem gestat:

gestat: si inferiora, foeminam. Lac crassum masculi, aquosum verò foeminæ nota est. Venter rotundus tensus, durus masculi nota est, contra foeminæ indicium venter longus, minus & tensus & durus.

De natorum ad parentes similitudinem.

CAP.

XXXVII.

Similitudo speciei ex subiecta materia nascitur, hinc est quod ex animalium diuersi generis cōcursu gignitur, ad foeminæ quam ad maris speciem propius accedit: nam ex oue & hirco ouis gignitur pilis longis, & duris confita. Contra ex capra, & ariete, capra fit pilis mollioribus. Eadem proportio retinebitur si canis, & vulpes, aut asinus, & equa coëant, quod argumento est copiosiore materiam plus à foemina, quàm à mare conferri. Sexus similitudo ex seminis temperatura dependet, iuxta illud: mares quia in dextris ideo nigri. Similitudo ex effigie causa eius robur est facultatis conformatricis quæ in semine est opifex, vel vehemens compræhensio, & firma grauidarum cogitatio. Id esse verum multi euētus docuerunt. Interdum ex albis parentibus Aethiops nascitur. Inde ars orta ad pulchros liberos generandum. Itaque in malacia foetui nota imprimitur desiderati vel fastiditi cibi. Sed Columella inquit, quod in omni genere quadrupedum spe

species maris diligenter exquiritur: quoniam frequenter patri similior est progenies, quàm matri. Alibi tamen nihil ait dubium est quin ipsa natura sobolē matri similem esse voluerit, vnde poëta, Sic canibus catulos similes, sic matribus hœdos. paternæ notæ plerunque natis inhærent, sed vt canit Phocylides, Dissimiles gignunt stuprata cubicula natos. Illi quos *Τειόχης* vocant, esse solent libidinis indomitæ, quod verum esse scimus, in quodam monacho.

Notæ embryonis sani vel egrotantis quod Marcellus pecus vocat. CAP. XXXVIII.

IMbecillum foetum arguit repletio quæ prægnantis vires prægrauat, eiusq; timor & diffidentia, si mammæ extenuantur. Si graciles repente fiant, abortit. Si altera mamma gracilis fiat geminos habenti, alterum abortit. Mammæ solidæ foetum significant saniorē. Si lac multum è mammis effluat, foetū imbecillem indicat. Si purgationes eant, impossibile est foetum esse sanum. Si aluus plurimum profluat, periculum est ne abortiat.

De partu immaturo, siue de abortu, & effusione. CAP. XXXIX.

IN locellis infantē Aristoteles embryon vocat. Abortio autem seu abortus est conceptus cor

ptus corruptio, quæ intra 40. diem incidit. Quæ verò intra 7. diem fit, effluxio vocatur. Causam Censorinus explicat libro De natali die. Aliis abortium dicitur, qui natus est eo tempore, quo nullo modo viuere potest. Sic de abortu legitur ante 30. diem factò, apud Hippo. Itē abortus decimo mēse factus 5. epi. forsan quia partus emortuus non sit tempestiuè ortus.

Causæ, abortiuæ externæ. saltus vt in Musoërgo, sternutasse in coitu abortiuum, etiam abortus causa lucernarum odor, hyems australis & pluuia, verum autem aquilonium, & siccum, sanguinis missio. De internis sunt ventris fluor tenesmus, febris, cotylidones pituita pleni. Morbus ventris, vteri, lumborum. Alimenti defectus est causa exitus foetus, in partu etiam naturali, partus fit ex naturæ comodo, contra abortus fit, non naturæ sponte, sed violenter incidit, ex vteri morfu, nimia mole, vel pondere.

Digno. essentia, & causarum haud obscura.

Prælag. præter naturam tenues abortiunt, priusquam crassescant. Abortiunt etiam quibus acetabula vteri plena mucoris sunt. In grauidæ vtero erysipelas letale. Morbus acutus in vtero gerente letalis, quoniam si vires minus valent, necesse est ipsam alimento, vel foetum inedia confici, nisi foeta succulenta sit, quæ breui morbo quàm minimum

To. II. III.

K

tenui

tenui victu lædatur. Quare in victu foetarum quum
 vtrique discrimen immineat, indicationi potius
 quæ à morbo est, inferuire expedit, vt vult Gal. Vt
 plurimum labores partus tertio, quinto, septimo,
 nono, quarto, sexto, octauo mensibus fiunt, foetus
 trimestris, & quadrimestris omnium maximè inu-
 riis resistit, citiusq; ac alij seruantur. Itaque prægnā-
 tes magis sanantur à morbis acutis, & minus sunt
 obnoxia abortus in tertio, & quarto mense, quàm
 in aliquo aliorum, huic quoque sententiæ cum Ga-
 leno astipulatur Manardus: proinde vtero gerentes
 sunt medicandæ, si materia turgēt, quarto mense
 vsque ad septimū, iuniora verò tempora, & senio-
 ra vereri oportet. Contemplādum in grauidis qui-
 bus mensibus menstrua erumpant: nam primo, &
 secundo conceptionis mense, nihil mali verendū,
 si verò deinceps tertium circuitū seruauerint per
 menses, malum, quia foetus non esse sanum signi-
 ficat, foetus qui maturius quàm septimo mēse pro-
 deat, nullo modo vitalis, sed magna ex parte infir-
 mior. Mēse octauo natus nullus vnquam vixit, sci-
 licet in Græcia, alioqui viuere, & adolescere in Ae-
 gypto possunt, vt asserit Aristoteles 7. de natu. ani.
 Iam quidem, & in Italia octimestres vitales sunt, te-
 ste Plinio. In vndecimo mense partus etiam legiti-
 mē fit, maximè ad eius initia, sed minime sub finē,
 vt sentit Hippo. Magis lædit abortus quàm partus.

Ofci

Oscitatio in enixu lætalis.

Ad abortia declinandum vtendum est prophylactice, quæ circa causas morbificas abolēdas versatur. Insuper de remediis numerantur cæratum Graduens, cæratum Quirici, & vnguētum Comitissæ. Item aliud quod accipit thuris mastichæ añ. ʒ. j. cum cera pura, & oleo omphacino vel rosaceo fiat vng. roborat illitum vterum & cotylidones, vsus diamargariti vtriusque cōfert, succus cancri fluuiialis pisti potus opitulatur, si credimus Gord. Ne nati in infantia pereant, eruntq; vitales si prægna assiduè oua testudinū edat, quod prodit Card.

Phylateria vtero gerens lapidem lazuli suspensum ferat, vel vngulam vrsi ad callum ligatam. Nicolus. Actites sinistro brachio alligatus vel appensus, foetus in lubricis vuluis coërcet. Iaspis subuirdis collo suspēsus efficacissime foetus detinet. Aet. & Marcellus, & Sextus. Idem præstat lapis in pyraastro natus pensilis, si gestetur vel maluæ agrestis radix appensa, sideritidis appensu etiam foetus custodiuntur. Gale. Sardonium lapis ventri deligatus foetum detinet.

De conceptu non vero, seu de mola. CAP. XL.

Myla, id est, mola est caro informis, & otiosa in vtero. Inanima, ferri ictum, & aciem re-

K 2

spu

spuens, mouetur sistitq; menses, vt ait Plin.

Causa. Quum plurima menstrua intus co-
acta non multam genituram morbosamq; conuol-
uunt, conceptus non verus fit. Mola crassa genitu-
ra retenta creatur, ex Hippocratis sententia, cui
subscribere videtur Arist. 4. de g. ani. Cum, inquit,
humore concoctu difficili conceptus consistit, tunc
gignitur mola: vnde non per calorem fit, sed potius
propter caloris debilitatem: causa itaque duriciæ
cruditas est. Carnosa fit propter defectum poten-
tiæ formatricis in spermate, & hoc accidit ob cor-
ruptionem membri vel materiæ, vt loquitur Auer.
3. collec. Et si verò fieri non possit, vt mas per se,
vel sola foemina, ex se ipsa animal perfectè generet,
tamen plerunque rudē quandam, & inchoatā mo-
lem producit, quod de mola vteri, & gallinarū ouis
subuentaneis cōpertum habemus. Mulierem ne-
mo vnquam vidit sine viro molam concepisse. 1 4.
de vsu p. At diuersum sentit Auicen. quod scilicet
mola carnosā citra sperma viri ex spermate mulie-
ris, & sanguine menstruo generatur: nam calor im-
modicus cogit, ac in carnis speciē transmutat. Cui
astipulatur Plin. inquiens, molas gigni putant, vbi
mulier non ex mare, sed ex seipsa cōcepit. præterea
mola duplex est, vna ex sanguine, & humoribus in
vtero corruptis, altera ex flatu, in concauo vuluæ
spatio concepto: etenim cōtingit interdum quòd
natu

natura carnosam digerat, & conuertat in humiditatem, aut ventum, vt scribit Auer.

Digno. Venter sicut pręgnantis completur, nihil in vtero mouetur, nec lac in mammis gignitur, licet illę vel earũ papillę turgescant. Ipse noui medicum ætate probatum, qui ad abolitionem molę intentus fœtum in locellis contentum excutit.

Pręsag. mola omnis, & pauci, & multi temporis vix curatur, humerosa difficilius quã flatuosa: carnosola difficillimè. In quibusdam mola in hyderum transit, ob hepatis refrigerationem. Duos ac sepius tres annos durat. quod si vna caro sit, ea fœmina peribit, si verò plures carnes pudēdis prorumpant, sanguis ve multus, & carnosus modicè defluat, seruabitur, si minus, profluuio eo correpta peribit. Totā vita durat, aliàs lætalis, aliàs vnā senescēs, aliquādo sanatur dysenteria. Accidit solis mulieribus. Simile quiddam & viris in ventre gignitur, quod vocat scyron Plin. apud quem Alcippe elephantum peperit, Achile serpentem, Alia mulier hippocentaurum.

Meth m. Quicunque tumores toto genere pręter naturam sunt, hi sui ablationem indicant, molam non curato, aut certè cum pręditione, vt consulit Hippo. primum totum corpus fouere iubet, dein acrem clysterem per sedē adhibere, quò sanguis multus erumpat, & quod compactum est in

vtero, commoueatur, postea vterum acribus colluere, & subditiciis sollicitare oportet, ac ficyā affigere, potuiq; dare quæ menses moueant. Item victus ratione tractanda est, quo citius excutiat. Remedia require apud Gani. T. P. Arnaldum, & Mansorem, & cap. sequenti.

De partu difficili. CAP. XLI.

PArtus naturalis fit ex naturæ commodo. Cuius differentia petuntur à nascentis figura, & à tempore in quo infans nascitur, est autē naturalis foetus figura, quum manus foemoribus porrectæ sunt, & caput ad os vuluæ recta dirigitur. Vel vbi in pedes conuersus est, nusquam inclinans. Aliæ omnes præter has, à natura abhorret. Itaque labores partus per circuitus fiunt, vt in prælibatis dictum est: nam à conceptione foetus formatio fit 45. diebus iuxta carmen Aegidij.

Sex in lacte dies, tres sunt in sanguine terni.

Bissen carnem, ter seni membra figurant.

Dies igitur ab hora conceptionis ad diē vsq; formationis duplicati, diē motus indicant, qui fit scilicet in tertio mēse. Dies autem motus triplicati nascendi tempus ostendunt. Vt si foetus formatus sit 45. die mouetur 90. editur nono mēse. Estq; hoc tempus vsitatissimum, præsertim in maribus: nam istos

ist os ocyus, scemellas verò tardius edi par est. Hipp. tamen legitimum pariendi tempus, & maximè generale decimum mensem aliquando statuit. Sanè à tempore variæ sunt partus differentia, vt semestris apud Auic. 9. de animalibus, septimestris, octimestris, nonimestris, decimestris, duodecimestris, apud Hippo. Mulier quædam mēsis 14. partum tulit, teste Plinio. Equidem noui pincernam Christianissimi Henrici Regis, qui mense quinto natus erat, qui etiamnum viuit in ætate consentiæ. fœtus vt fortior fuerit, & mater debilior, celerius perficitur.

Nam causæ exitus fœtus sunt robur eius, & magnitudo in comparatione ad vterum, paucitas alimentī, & humiditas cum calore. hinc patescit quod septimestris spontaneus nouimestri ac decimestri fortior esse debet. Decimestres omnino excludit ab hereditate Varro in satyra. Lex ciuilis post x. mensem à morte patris, natum non admittit ad legitimam hæreditatem, sed Aristoteles nō solum decimestres, verū & vndecimestres recipit.

Causa, vitium parturiētis, si irascitur, si zelotypia laboret, vel aliis affectibus, si meatum plus iusto angustiores habet, aut pinguiorem, aut minime amplam habeat vuluam comparatione partus. At fœtus vitium est, si inusitata magnitudinis, si imbecillus, vel mortuus, vel monstruosus, vel si plures. Ob

secundas si non auellantur ob crassitiem, aut propter subtilitatem abrumpatur, priusquam opus sit, humore enim euacuato infans præ siccitate ægrè mouetur. Ab externis difficultas oritur, aut à frigore, quòd vuluam densauerit, aut calore, qui vires dissoluerit, aut ex quodam fortuito accidente.

Prælag. quæ paulò ante partum concumbunt facilius pariunt, vt ait Aristo. Quæ parientes in lumbis dolorē habent, vix pariunt, quæ aluo, quā ocysimè, quæ imo ventre, difficulter pariunt. Gallus auspiciū parientibus, est enim lucis nūcius, & latonæ carus, quòd ei parienti adstiterit, vt commemorat Aelianus.

Remedia. puluis borracis ex vino potus super omnia valet, in partu difficili, vt loquitur Io. de S. Amando. Ad idem, & secundam eiiciēdam laudatur puluis tro. galliæ moschatae potus, à Durio. ℞. corticum vtriusque cassiæ añ. 3. s. cinamomi, croci añ. 3. j. aquæ artemisię ℥. iiii. fiat potio. datur tepida. si verò addatur borracis ℥. s. educet, & foetum, & secundas, vt ait Grad. vel ℞. cinamomi doronici, corticis vtriusque cassiæ añ. 3. s. croci ℥. j. cū aqua rutæ, & betonicæ fiat potio. Aliud. myrihæ, castorei, styracis añ. 3. j. s. cinamomi, sauinæ añ. 3. s. cōfice cum melle, ex vino sumitur, partum viuum, & emortuum eiicit, teste Al. B. ℞. muccaginis, fœnugræci, & sem. lini añ. 3. j. sem. althææ ℥. s. olei de li-
lio

lio, adipis gallinæ añ. 3. vj. croci momentum, ceræ q. s. fiat linimentū ad pudenda. Secundæ contentæ in vtero ex sternutatione disrumpuntur, vteri os aperiunt enchatismata vel suffitus ex decocto maluæ, althææ, acanthæ, artemisiæ, vfnæ, fœniculi, & pessus ex adipe gallinæ, anseris, anatis cum oleo liiaceo, bdellio, & myrrha.

Amuleta. Aëtites si pariendi tempore à brachio ad femur transferatur, prægnans facilius pariet. Varig. Si prægnans parere non potest, hyoscyami radix sinistro fœmori alligato, à partu aufer, Myrep. pennæ vulturis, pedum plantis ligatæ partum facilem reddunt T. P.

De torminibus à partu.

CAP. XLII.

EXhibeantur duo vel tria cochlearia olei amygdalarum dulcium recens facti cum saccharo vel serapio, adianti albi. Vel R. corticis vtriusque cassiæ, cinamomi, capil. ven. sem. anisi, passularum añ. 3. ij. fiat puluis, datur ex vino albo, à Manlio. Ad idem pul. diacimini 3. j. candi 3. j. datur ex vino albo. Aliud. sem. dauci pisti 3. j. ex vino albo tepido bibatur. Vel R. pul. diamargariti Auic. aromatici rosati, & diacimini añ. 3. j. cum saccharo fiant 2. hombi. sumat. Si verò dolor perseveret, dare oportet 3. j. phylonii cum iusculo gallinæ vel capi. Vngatur venter oleo ane-

K S thi

thino calido, & contegatur lana succida. Vel ℞. adipis anatis, sampſuchi añ. ℥.iiij. & myrrhē ℥.j. butyri rec. ceræ añ. ℥.iiij. adipis anferis, medullæ ceruinæ, terebinthinæ, corticis caſſiæ, mellis añ. ℥.iiij. aloës ℥. & fiat vng. huc refer opiatam Guai. & epithema Salyceti. vel ℞. farinæ florum chamæ ſœnugræci, ſem. lini, cumini, fabarum añ. ℥.j. butyri rec. adipis gallinæ añ. ℥.j. cum oleo ſambucino fiat cataplaſma. Aliud. lutea ouorū cocta, & dura numero ſex, cumini puluerati ℥.iiij. cum oleo lilino, & anethino miſta ventri admoueantur.

Ad ventris rugas.

CAP. XLIII.

Rugas declinat vng. ex ſucco radicū lilij albi, cum melle albo, & cera ad ignē compositum. Confert etiam pinguedo recens, & actu calida, illita nouem diebus, vel meſenterio veruecis vel capræ, aut hœdi calido ventrem contegere, benefacit oleum nucis indicæ illitum. Idem pollet adeps Cygni illitus. ℞. adipis detracti è vulua balenę ℥.vj. in fictili liquato, & cum puluere cornus ceruini fiat vng. quo vëter illinatur. Aqua ex albumine ouorum extillata, & illata. Ad rhagadas ventris, vberum, & ſœmorum cinis teſtudinis cum albo oui, vel lacte aſinino adline.

Vt

Vt à partu fiat virginalis astrictio.

CAP.

XLIIII.

AD mentiendam virginitatē balnea aluminosa, & astringentia opitulantur. Item pessi ex succo sem. rumicis acidi, & virentis. Vel ex gallis in aqua maceratis, dein ficcatis & lana exceptis. Semen oxylapati tritum in vteri sinu imponitur, vel gallā in aceto maceratam, & postea ficcata, pulueratam super sinum ablutum conspergitur subinde. A forma pedis dignoscitur vulua muliebris, vt ait M. Scot. & eius longitudinem medij pedis mēsuram esse autumat.

Virginitatis indicia.

CAP. XLV.

DVcuntur ex narium epistomiis, si credimus Scoto, & Indagine. Itē ex ceruice, apud Edof. suffitu lapidis gagatis, Plin. & lapid. potu carabæ, Alb. suffitu lapati, & mictione super maluam viridē, Vitalis, apud quem est aqua, quæ virginitatē arguit. Si quis gagatis frustula cum aqua biberit, si carnis senserit maculas, extemplo emingit, neque cohibere urinā potest. At si virgo biberit, non cogitur meiere, Monst. Vxorū castitatem prodit magnes capiti mulieris dormiētis suppositus. Cor nycticoracis. Ellychnum ammoniaco illitum. Alb. Raz. Myrep.

De

De nymp̃ha.

CAP. XLVI.

Est caruncula quæ bifariam excreuit inter alas sinus muliebris in pudendo, sed aliquando ad tantam magnitudinẽ ineptam concrefcit, vt sub morbo comprehendatur, curationemq; exigat.

Præſagia, ob hanc partẽ quasdam mulieres arri- gere in virorum modo, & in coitum prorumpere refert Alſaharauius, & Auic.

Metho m. nymp̃ham quòd multò promineat Aegyptij in virginibus excidere cõſueuerunt. haud diſpariliter caudatio ab Aegineta curatur.

De vteri ſtrangulatu.

CAP. XLVII.

Vteri ſuffocationis tres ſunt differentiæ, prima cum ſenſu, & motu, rationeq; integra, ſed cum animi defectione eſt, ac difficili ſpiratione. Altera ſine ſenſu, & motu, cum obſcuro paruoq; pulſu, & nõnunquam cum inſenſili ſpiratione. Tertia in qua cū his crura, & brachia contrahuntur.

Cauſa. ob retenta menſtrua, cohibitumq; ſemen euenit. Retenta enim deprauantur. Inde vterus refrigeratur, contrahiturq; ad ſuperiora, vel in latus, ficq; cor, cerebrum, & hepar, per arterias neruos, & venas in conſenſum trahit, à quibus præfata oriuntur

tur symptomata. Sed vitio semini maior quam menstrualis est vis ad noxam vniuerso corpori inferendam. An vterus neruosus? sciendum quod tria sunt partium simularium genera, ex sanguine, & sinu carētia, ex ovis copula, ex cerebro, & dorsi medulla neruus, & tonus, ex musculis tēdo prodeunt. At ex nullo istorum neruos multos suscipit vterus. Qui tamen neruosus dicitur, quoniam latissimè distendi, & in breuissimum spatium contrahi cernitur, sic vesica, & colis, & vteri cornua dicuntur neruosa. Alioquin cauernosum genitalis colem appellant, verum inter omnes corporis partes, vteri plurimas, & grandissimas venas habent.

Prælag. vteri suffocatio iuxta circuitum interdum mouetur, & singulis accessionibus præceps periculum affert.

Metho. m. Reuellere oportet euaporationem à principibus membris, eaq; roborare, simul ac euacuare menses, & sperma elicere, proinde in paroxysmo, partium infernarum frictiones conueniunt, & ligaturæ artuum, quæ dolorem inferunt. Sicyæ fœmoribus affixæ vtilis sunt, phlebotomia quoq; ex saphea, vel ex malleolis. Interim fœtida naso admoventur, & circa vterum odorata illinuntur, & suffiuntur: namq; vterus naturaliter odores fœtidos refugit, & iocundis lætatur, vt ait Serap. opitulatur etiam pessis emollientes, & aperientes cum rebus
odo

odoratis, Metrenchytae, & sternutatio.

Remedia. R. olei nardini, & de lilio añ. 3. j. in quibus dissolue moschi vel ambari gra. iij. fiat nascale, vt vocant, obstetrix vtero imponat cum frictione, sicq; sperma corruptum eiicietur cum menstruis. Curat strangulatum, & insaniam ex vtero. aqua cerasorum pota saluberrima est. Puluis crysalli ex vino potus subito tollit vteri suffocationē. Idem præstat sem. dauci 3. j. pista, & ex vino pota. Item nucamenti iuglandis puluerati 3. j. ex vino potus. R. galbani, assæ foetide añ. 3. j. cū oxymellite fiant pilulæ, dantur salubriter duæ, instante paroxysmo. Valet ad precautionē emplastrum ex galbano, ex aceto solutum super aluta extensum, & super vmbilico gestatum. De amuletis, radix peoniæ appensa confert, etiam omnibus mulieribus vterariis, id est, quæ ob frequentes vteri affectus ægrotant.

De vterino furore.

CAP. XLVIII.

Contingit ab ardenti vteri dyscrasia, cerebro ac toto corpori cōmunicata, quæ sequitur magna ex parte deprauati seminis redundantiam. Vterus frigidis alterandus, vt diacodio : nam aceto, & solani succo admistum, & impositum ardorem extinguit. Item supposita quæ genituram eliciunt, & contrahunt, benefaciunt, vt nitrum, & cardamomum cærato assum

assumptum, & impositum, vel ruta, & castoreum cum myrtino cerato. Item ad vteri maniam confert pessus ex succo plantaginis, & portulacæ, præterea caput irrigationibus, & oxyrhodino roborandum, ne facile recipiat vapores.

De vteri procidentia.

CAP. XLIX.

SI à causa interna contingit, humor est plurimus quo laxantur appendices. Vterus prolapsus foetido odore retrahitur, & grato allicitur, & sicya magna affixa umbilico attrahitur. Mulier hydragogis purganda est, dein vtatur ieiuna electario de nucibus: curat enim superfluam humiditatem, & fluxum antiquum, refertur ad Christoforum de honestis. Aliud. R. succi cytoniorum, & myrti añ. 3. ij. coralli rub. boliarmeniac añ. 3. j. misce, sumat ieiuno stomacho cochlear vnum, consilio Fauen. qui etiam vterum impellere iubet digitis ex mixtura olei rosati omphacini, & olei mast. illitis, & mox aspergere puluere sequenti, calicis glandium, balauftiæ, malicorei, myrti añ. 3. j. thuris, mastichæ, acaciæ, hypocistidis añ. 3. ij. fiat puluis. R. galliæ moschatæ M. 3. j. imponatur cerato, vt fundo ventriculi hæreat. R. crispulæ seu abrotani fœminæ m. j. contusa cum olco à semine lini, pessulo imponatur. Ouum putridum contusum emplastri modo vuluæ impositum illico vterum in locum

cum suum impellit, teste Nicolo.

De vteri vlcere.

CAP. I.

Est solutio continui cum pure, pus autem est genus ad sordem, & saniem.

Causa. fiunt vlcera in vteris puerperiis purgamentis putrefactis, vlcus ex mordenti fluxione. Item ex tuberculis suppuratis. Ex partu etiam, & abortu nonnunquam vterus exulceratur.

Prælag. diligenter citoq; curanda sunt: quia in loco sunt tenero, multaq; cum eo communicant, si magna non sint, curata celeriter sanescunt.

Metho. m. huiusmodi vlcera, item vesicæ intestini sedis penisq; eadem genere medicamenta requirunt, nempe cicatricem inducētia, instrumenta quoque quibus infunduntur, desiderant, mentrenchytas symphonem rectum, & clysterem.

Auxilia. ℞. aquæ fontis lib. ij. hordei non decoricati ℥. iij. mellis rosati ℥. iiij. bulliant ad consumptionem tertiæ partis, colatum per syringam iniicitur tepidum quater in die. Aliud. lactis ℥. iiij. rosacei ℥. ij. tutiæ præparatæ ℥. s. aloës 3. ij. fiat vng. in mortario plumbi, cuius portio dissoluatur in aqua hordei. Aliud vng. de tutia cōmunis ℥. ij. lactis ouini ℥. viij. misce. fiat collyrium. Aliud. lactis ouini ℥. vj. mellis rosati ℥. j. sumat mane. ℞. succi apij ℥. ij. myrrhæ

myrrhæ 3. s. hydromellis lib. s. fiat clyisma, deter-
gendo mire subuenit. Aliud. fit ex succo vel deco-
cto cynoglossæ. Infusum ex lacte chalybato opti-
mum est. Ad maligna vlcera, fiat collyrium ex aqua
hordei, plantaginis vel solatri cum mercurio præ-
cipitato. Vel cū succo cynoglossæ, & plant. cum vi-
no granatorum, & modico licio ad ignem inspis-
sata. Aliud. sapæ 3. iiii. lixiuij debilis 3. iij. fiat colly-
rium. Aliud. R. vng. apostolorū, & ægyptiaci añ. 3.
j. misce, infusum salubre est. Oleum quoq; momor-
dicæ infusum sanat, si vera dicit Sardus. Postremò
vbi probè detersum emundatumq; fuerit, benefa-
ciet aqua aluminosa, ex qua fiat lotio, vel balneum
de centaurea, fel terræ nuncupata, post vsum isto-
rum suffitus noster ex minio ad cicatricem ducit.
Item ad vlcus vteri, decocti passarū lib. j. mellis ro-
sati 3. iij. f. clyster. R. sang. drag. 3. j. cum succo plāt.
iniiciatur. R. tutiæ præpa. 3. j. cum vitello oui fiat
pessulus. R. croci, camphoræ, lithargy. baccarum,
lauri cum albo oui, & rosati. f. pessulus, valet ad vul-
uæ pruritum, & priapismum, purgat putredinem,
& saniem erosionemq;.

De arthetia, arthriticâ &c.

CAP. LI.

Aρθῆτις est dolor non vnus tantum arti-
culi, sed multorum simul. Et si omnia nō
possunt simul dolere, vt ait Hipp. 2. epi.

To. iiii.

L

in

in omnibus articulis non est arthritis, ut putat Gal.
 10. *ἢ τὸ π* Est inflammatio articulis accidēs, quæ
 magnū dolorem locis patiētibus adfert. In qua ta-
 mennerui, & chordæ non inflāmantur: sed dolent
 tantū: quia simul cū articulationibus, quæ fluxione
 implentur, & ligamentis, quæ flexuris circuniacēt,
 extenduntur. Oportet, inquit Aristo. si aliqua ani-
 malis particula moueatur, quiescere aliquam. Et
 propter hoc iuncturæ in animalibus sunt. Diffe-
 rētiæ, arthritis, chiragra, schiasis, genugra, podagra.

Causa omnium eadem est, sed gemina, vna est
 fluxio ad articulationes, citra quam haud euenit
 hæc passio. Nam qui nihil colligunt superuacui, his
 manēt imbecillæ partes semper in tuto, ut Gal. ait.
 Arthritis ex vehementi coryza. 25. contin. Causa
 externa, equitatio assidua, motus vehemēs à cibo,
 balneum, otium immodicum, assiduus gallinarū,
 cotoneorum, & pomorum esus, legumina, crepala,
 venus. In summa arthritis est dea *μισόπτωχος*, id est,
 o dio habens pauperes, quod sit Bacchi, & Veneris
θυγάτης, seu filia. Altera causa est partium imbecil-
 litas: nam quæcunque articulosis contingunt circa
 articulos, imbecillitas eorum causa est. Arthritici
 vniuersos articulos imbecilles habent: nā citra im-
 becillitatem non fiet passio isthæc. Quoniā mem-
 bra fortia, quod in ipsis redundat, ad infirma dele-
 gāt, & hæc rursus ad infirmiora trāsmittunt, donec
 in

in partem decumbat, quæ vim excretricem vicinis omnibus imbecilliorum obtinet, & perinde ex se propellere recrementum nequeat. Ex quo patescit quod in corporis particulis sit idē, quod in ea mala republica quam Aristo. vocat *ὀλιγαρχία*, in qua scilicet, qui plus possunt, minus potentes opprimunt. Liquet etiā quod partes infirmiores omniū primæ excrementiciis morbis corripuntur, iuxta dictum Celsi, quoties offensum corpus est, vitiosa pars maximè sentit, hoc est, imbecillis. Est autē imbecillitas naturæ robori contraria, prouenitq; ob dyscrasiam vel propter meatuum ametriam. Vocantq; partem imbecillam quæ natura est intemperantior, vel quæ ex præcedēti aliquo morbo intemperie contraxerit, vel quæ in præsentī tempore in hanc sit producta. Membrum facilè recipit fluxionem ob raritatem suā, aut viarum amplitudinē, aut situm inferiorem, vt sentit Serap.

Digno. Quando nulla ex causis euidentibus præcedente, membrum confestim patitur inflammationem, ea quæ hanc passionem generat causa, fluxio vocatur, ipsa verò passio dispositio fluxionis. Facilè reperibiles sunt tristatium humorum differentia: nam coloribus symptomatis, experientia pharmacorum quæ offeruntur, præcedenti diætā, anni tempore, aëris constitutione, regionis situ, laborantis ætate, & temperatura, habitudine, indi-

cantur, fluxio ex pluribus constans humoribus cognitu, curatuq; difficilior existit. Propter fluxionis diuersitatem ne cognosci quidē planē, nedum ad vnguem curari potest, vt censet Trall. Notandum quod artuum dolor qui ex siccitate efficitur, vel ex simplici qualitate, arthritica non est.

Prælag. Articularius morbus est hæreditarius, quoniam sperma est secundum complexionē generantis, vt loquitur Auic. In infantibus, & pueris vitæ breuitatē significat: quia in hac ætate omnes naturales actiones maximē firmæ esse debent. Senes autem, & conualescentes huic malo sunt obnoxij: quia malè cōcoquūt. Arthris orta post colici doloris curationem: nam roborata intestina cōsuetas interdum superfluitates non suscipiunt, quare expelluntur ad iuncturas. Ipse vidi articulorum vitia ex diarrhœa ante sufficientem corporis purgationem adstricta. Arthriticis, & podagricis febricitantibus maxima ex balneo vtilitas. i i. ther. Articularius morbus insanabilis est, vt putat Aretæus, sed fallitur: quia in principio (vt inquit) nullus causam legitimam explicat.

Metho. m. In inflammationibus, quarum causa est fluxio, oportet principio curationis optima fieri: nam si errata contingunt, difficulter sanabiles faciunt dispositiones. vt si nulla de toto corpore prouidentia habeatur, etsi calefiat, aut humectetur
etiam

etiam membrum. Igitur totum corpus euacuare congruis euacuationibus conuenit, & partem inflammata[m] perfundere, & illinire his, quæ influentis humoris repellendi vim habet, & quod in affecto loco continetur inanire, roburq; ac virtutem affectis partibus inferere.

Remedia, si Aegrotans multo sanguine abundet, fortiter euacuabis, nō solum semel, sed iterum atq; iterum & pluries detractio[n]e paulatim repetita. Etiam in omnibus diei horis venam secare consuevit Aet. modò ex ventriculo cibus ad intestina fuerit dilapsus: verum si fluxionem ocysimè reuellere expedit, epaphæresis non videtur ex usu, sanguinis missio inter initia statim facta, sæpe annuam, nonnunquam perpetuam valetudinem præstat, vt ait Celsus. constat satis quod venæ secandæ electio, ex laborantis parte indicatur. Apparantia in causa calida sunt sy. rosatus simplex vel è rosis siccis, sy. myrtinus, de iuiubis, de granatis, de pyris, syr. de succo citri, de succo rhamni vel oxyacathæ: diluuntur cū duplo aquarum oxalidis, portulacæ, plantaginis, solani. infrigidant, & incrassant eoq; fluxum cohibet.

Ab horum usu foeliciter purgat electarium de succo ros. elec. rosatum M. apozema quod recipit corticum myrobala. citrarum ℥.j. polypodij, senæ añ. 3.j. hermodacty. albi 3.ij. se. intybi 3.ij. rad. dulcis 3.ij. passul. 3.s. f. decoctio colata ad lib. s. & huius

L 3 dec

decocti ℥.iiij.ſy. roſati laxatiui ℥.ij.ſ. potio. huc refer
pilulas de hermodactylis minores, & pilulas Maſo-
ris quæ accipiunt aloës 3. j. dactridij grana v. roſarū.
rub. piſtarum 3. ſ. hermodactyli albi 3. ſ. for-
mentur pil. Die ſequenti purgationem Aeger ſu-
mat ſequentem bolum per v. horas ante prædium.
℞. theriacæ rec. 3. j. conſeruæ roſ. 3. ſ.

De topicis remediis, quæ ſubinde mutare con-
uenit, prius quàm excaſſiant, vt docet Scribonius,
opiferæ ſunt irrigationes ex roſaceo, cū aceto ve-
teri vel ex ſucco plumbi cum ſucco plantaginis.
Vel ex roſaceo cum betæ ſucco. Valet ſplenium
imbutum muccagine tragachantæ, extracta cum
ſucco mercurialis. Ad vehementem dolorem opi-
tatur illitio ex aqua endiuia, aceto, & ceruſa. ℞.
roſacei, olei violati añ. ℥. j. croci 3. ſ. camphoræ
gra. ij. lutea ouorum tria. fiat linimētum. Benefacit
& cataplaſma ex molle panis macerato in lacte
bubulo additis vitellis, & roſaceo. Medetur item
muccago ſe. pſylli cum hordei farina, & roſaceo
impoſita, pauco etiam aceto ad penetrationē ad-
dito. Imponitur, & ſapa cum roſaceo. Aliud quod
cruciatus maximos mitigat, braſſicæ coctæ, & cō-
tritæ facis aceti lutea ouorum bina, roſacei q. ſ.
miſce. Ad bilis pallidæ fluxum repellēs, & anody-
num fiat malagma ex muccagine ſe. lini, ſcœnugræ-
ci ſem. pſyllij cum puluere roſarum ſiccarum. Inter

mem

membrum mandans, & partem affectam, agglutinatoria opifera sunt, ex bolo armenia, terra sigil. cum rosaceo, & aceto, vel cum liquore oui conleuato, deinde affuso succo omphacis vel plant. huiusmodi præsidia influxum arcent: quia intrænant, incraffant, opilant, roburq; partium confirmant. Ad idem illitio fiat ex acacia, hypocistide, lycio, & menitha. Intercipitur etiam fluxio per sicyas.

Contrarius in morbo victus: sit ergo refrigerans, sed non humectans, quoniam humiditas auget fluxiones. Eos ergo enutrire oportet cibus acidis, & austeris, vti sunt mala, pyra, sorba, mespila, vinum rhoite, castaneæ, caro bubula, pedes hœdi, veruecis elixi. In biliosa enim inedia lædit: quia bilem reddit acriorem. At vbi extremi dolores excruciant, tenuis victus est ex vsu. Certè vitanda sunt, quæ plurimum nutriunt, & quæ flauam, aut pallidâ bilem generant, ira quoque, & iracundia. In sanguinea ab omni cibo, & motu, & à vino abstinendum.

In pituitosa arthritide, fluxio per ea auertitur, quæ materiâ diminuunt, siue per vomitū, siue per deiectionem, sed deiectio tutior est: si enim in ventriculum pituita violenter attracta non euacuetur, periculum inducit. Et sola purgatio sæpe sufficit ad affectionum fluidarum curationē. Apparatur materia ex melle rosato colato, diluto aquis betonicæ, saluiæ, absinthij, hydromellite, syr. de cortice citri,

L 4

sy. de

fyr. de agrimonia. purgatur verò syrupo de turbit Rasis, vel nostro de agarico, vel puluere turbit quod recipit turbit 3.j. non debet multum conterri ne adhæreat vètriculo, hermodacty. 3. s. zinzib. anisi añ. 3.j. zucchini 3.j. s. fumat per se, vel ex vino albo. vel 8. hermo. 3. v. maioranæ sicce, sacchari añ. 3. x. f. puluis, fumat 3. iij. Istis licet addere dacridium, si vna cum pituita cōfluat aliquid bilis, vt ferè fit. Terebinthinæ 3. ij. ex ovo sorbili deuoratæ dolores iuncturarū sanant, inueteratos iuuant. huc pertinent pilulæ de hermod. maiores M. de myrobal. & arthritice Nicolai diacartamū. A purgatione fumat 3. j. theriaces rec. per sex horas ante prandiū.

De localibus conferunt repulsoria, quæ simul leuiter calfaciant, vt ait Aetius: ergo quædam sine frigore repellunt, vt testatur Celsus, & Aurelianus. fofus frequens ex aceto acerrimo, in quo sint elixata origanum, faturegia, calamintha dolorem mitigat, & aliud renasci rheuma inhibet. Barbascus angustiora folia habens, tritus & impositus, dolorē intra paucas horas ita tollit, vt facultatem ambulandi restituat. Radix artemisiæ præmansa, & cōmesta intolerabiles podagræ dolores cū omni celeritate coërcet. Eadem herba cum oleo subacta, & imposita neruorum dolorem, & tumorem mirificè sanare, dicit N. Alex. Cinis brassicæ ex axungia leuamentum præstat, sed mirè lenit si recēs est, vetus,

tus, falsa ocyus discutit, & dissipat dolorem, & tumorem. Muccago se. fenugræci ex posca extracta per elixationem, & adiecto postea melle, recocta, efficax est, si triduo hæreat. Anodyna sunt malagma cum sapa, & fursure, vel farina hordei ad ignem commista. Ad idem valet cataplasma ex lomento fabarum cum rosaceo, & oleo chamæmilæ, butyro rec. adipe suilo, ad ignem commistum, in fine addantur lutea duorum ouorum, croci ʒ. j. Aurea anglici dolores lenit superposita.

Victus ratio tenuis, salubris: nam inedia, & fames ex accidenti corpora purgat, famem verò natura pituitosi facilè tolerant. Itaque humidis corporibus fames conuenit, corpora enim siccant.

De chiragra, & podagra. CAP. LII.

Illa est vitium articulorum, inflammatio scilicet, in manibus, quæadmodum podagra in pedibus, sunt ex genere arthritidis, & præcedunt, vt plurimum morbum articulare. Podagra vehemētior est omnibus qui in articulis gignuntur doloribus, longissimusq;, & liberatu difficillimus. Vere, & autumnomagna ex parte mouetur. In verè quidē ex copia, in autumnom verò ex qualitate humoris. Vt plurimū accidit paruos pedes habentibus, vt ait Zoar. podagra senes ad mortem comitatur. Puer podagra

L 5 non

non laborat ante vsum venereorum. Si quis puer podagra corripitur, vna & genuū articuli manuūq; intumescunt. Eunuchi podagra non laborant. Neque mulier nisi menstrua defecerint ante, fluxio tenuis substantię tempore breuiori dissoluitur. Crassa verò vel tenax lōgiori. Podagricis aliquādo oscheū longiscit, laxata scilicet scorti cute. hinc fit rhacosis, cui spuma cochlearum illita testibus, medetur.

Metho. m. vtraque curatur auersione per sanguinis missionem, in chiragra quidem si vtraque manus afficitur, ex vtraque saphæa, vel resaratis hæmorrhoidibus. In podagra verò confossa vtriusque cubiti inter interna vena, si vterque pes atrocitate doloris afficitur. Mox repellentibus vtendum quæ fluxionem cohibent, deinde serapiis, quæ materiā intranāt, & cōcoquunt. Ab his cathartici vtendū quæ cacochymiā deturbare queant, de quibus in præcedētibus plenè mentionē fecimus. Anodyna negligenda non sunt, nec quæ discutiunt in declinatione omittēda. Iuxta illud Gal. in principio inflammationis vim repulsoriam esse validiorē oportet, in augmento hæc imminuēda, quæ digerit virtus augenda est, in vigore pares inuicem esse conuenit facultates, nisi vehemens dolor pharmacum leniens requirat. At in declinatione vim digerendi augebis. Discutiunt autem ceratum ex muccagine scēnugræci, & lini cum oleo lilino, & cera facto,
em

empl. diachylum ireatum. Sanguis leporis adhuc calens illitus, podagricos perfectè sanat. Kirano teste, Pompeius podager merfit in triticum sese, supra genua, leuatusq; est, siccatis pedibus mirabili modo, vis tanta est siccandi vt cados plenos siccet, vt refert Plin. Podagricorum doloribus confert si quid aliud sarcophagus humores extenuando, sed & acetum acerrimum dolore, & sensu priuat, euocat enim quod intus est, attenuat, & dissoluit, ideoq; strenuè siccet, vt inquit Card.

De narcoticis.

CAP. LIII.

Podagricos dolores, & tumores frigida aqua largè effusa leuat, & extenuat, soluitq; dolorem: nam modicus torpor dolorē soluit. Agrippa à podagra vehemētissima euasit demersis in acetum calidum cruribus. Ad omnem podagram, torpedo viua vel nigra subdita pedibus tollit dolorē, & in futurum remediat, si credimus Largo. Oleum de turpena est mirabile epiplasma, seu mitigatorium, si illinatur. Idem præstat, & præseruat oleum de torpedine viua. Podagricis, & doloribus omnibus optimum remedium fit ex aceto cum melle, & lolij farina ad ignem decocta vsque ad crassitudinem, & imponitur cataplasma ex mica panis cum lacte, & succo papaueris solani, & croco. Illitus ex butyro cum
man

mandragora mitigat dolorē podagræ. Succus hyoscyami plātæ pedis adhibitus, tumores podagricos calidos, & frigidos dispergit, doloresq; mitigat N. Alex. Malagma ex radicibus cicutæ elixatis, & per setacium traiectis. Aliud ex radice alterci afflata sub cineribus, & cribrata cum oleo chamæmeli. Sed prolixo tempore adhærere narcotica non sinas, & statim stupefactiuo ablato pars affecta oleo lilino, vel chamæmilino calido foveatur.

Amuleta. podagram sanant pedes ranæ ligati in corio cerui, & super podagrici pedes positi. Ad idē crus, & corium cauillæ vulturis pedibus ægris ad alligantur, pes item testudinis dexter supra ægri pedem dextrum, & sinister super sinistrū, applicatur. Ad chiragram similiter, dextra testudinis manus ad dextram affectam imponitur, & sinistra ad sinistrā. Calcaneus aquilæ ligatus super ægri pedem à tali affectione liberat. Magnes item, ligatus sanat. Ex Rasio. Nerui vulturis talliq; leporis adalligantur. Cutis phocæ si pedibus substernatur. Magnes, aut Aetites gestatus, ex Trall.

De ischiade coxendicum morbo. CAP. LIIII.

I Schias ex genere arthritidis est, quæ oritur ex humoris redundantia, quæ affectam occupat coarticulationem, qua expleta in omnem partem circum sitæ
ner

neruosa particulae tenduntur, & ex his dolor oritur. Inruens humor aliquando sanguineus est, ut plurimum verò pituitosus, aut ex pituitoso, & bilioso mistus, aut etiā sanguine cum ipsis permisto. Interdum etiam ex humore crudo efficitur. Causa externa equitatio, libro de aëre & aqua.

Digno. differentiae affligentium humorum facile deprehendi possunt, ut in praecedentibus explicuimus.

Prælag. coxendicis dolore enectus. s. epi. Dysenteria coxëdicum morbum corrigit, Aet. Ischias ob equitationē accidit, libro de aëre, aquis, &c. Quandoque in suppurationem transit, quem transitum in Calceario Viēnæ vidimus, & curauimus. Ischias rarò fit è sanguinis multitudine, & curatur citissimè secta vena iuxta talos. hocce remedio Lugduni confestim sanauimus Do. Canapeum regali ordinis equitem, centumq; nobilium antesignanum. Mucres superueniunt à coxendice molestatis 6. apho. à diuturna vexatis si excidit coxa, his crus tabescit, & claudicant si nō vrantur, inibi 60. Coxam excidere, id est, caput fœmoris. Si coxæ articulus in exteriorem partem prolabitur, minus impedit gressum, quàm si in partem anteriorem. Qui habitiores sunt, his articuli ægriùs excidunt, ac reponuntur, quoniam carnis copia vndiq; constringuntur. Cōtra his qui emarcescunt, relaxatur cutis
eius

cuius carnis, quæ commissuram complectitur, parumq; prohibet quominus articulus excidat, & reuertatur, ferè enim circa articulos mucci redundat magis in gracili, quàm in pleno. Nam caro graciliù qui arte non fuerint rectè extenuati, muccosa magis est, quàm eorum qui pleni sunt: quia caro non statim siccescit, sicut in illis qui arte rectè sunt extenuati, sed liquatur, & madetior efficitur, vt in his apparet qui fame, seu anorexia, seu obsidione, seu luctu, seu mœrore alimenti non satis fumentes extenuati sunt, & mœrorem Græci poëtæ μελεδ'ωνία, ideo dicunt, quasi membra edat, deuoretq;. At graciles natura, vel qui arte rectè extenuati sunt, quum sint temperamenti siccioris, non habent carnem muccosam, sed musculos optinent robustiores, qui commissuram coerceant.

Metho. m. eadem medendi ratione qua articularis morbus, curatur. Nisi quod schiasis repellentia non admittit. Circa coxæ iuncturam, inquit Galen. repellentibus vti non debemus: quum enim in alto sita sit, humor ex ambientibus locis ad ipsam impellitur repulsoriis, atque ibi retinetur, sed materia ex alto ad superficiem coxendicis trahenda est. Mitigatoriis igitur in principio vtendum est ad coxendicem (in quibus Aetius addit papaueris calyces) non item acribus. Acria enim localia ante corporis totius euacuationem nocent, non solum quia

quia attrahunt, sed etiam quòd materiam coniunctam digerunt, ac fermè assant, vnde condensatur, inspissatur, viscosaq; fit, haud dispariliter in dolore humeri non esse repellendum mōnet Nicōlus, ne materia in thoracem confluat in corde, & pulmones. Rursus ait ischiadis curatio difficilior est reliquis arthritidum generum curationibus, propter iuncturæ altitudinem, difficilis etiam est gonagræ sanatio, postea humeri. Ischiæ dolor musica curatur, teste Theophrasto, & Gellio: quia vis animalis per conceptū à loco passio aueritur: qua de re plene scripsimus cap. de dolore. In coxendice à sanguine orta primū cubiti vena secanda, ob plethoram vel reuulsionis causā, deinde interna iuxta talos sita, aut quæ iuxta poplitē est deriuationis gratia, Gal. inquit, memini me i'chiadas vno die facta ex crure euacuatione, curasse. Licet ratio dictitet sectionē venæ coxendicis, & sapheæ iuuamentum non absimile præstare, experiētia tamen comprobatum est, longè efficaciorē esse vtilitatem incisionis venæ coxendicis in dolore coxendicum. Et id fortè propter eius rectitudinem prouenit, vt retur Auic. In defluxibus ad coxam venas quæ post aures sunt secare conuenit. 6. epi Quum morbus incipit, vtranq; venam quæ secundum aures secat, Hippo. libro de aëre, aqua. &c. Si fluxio sit à cacochymia purgāda, purgatione succo accommodata.

ta. Vomitus ischiadicis commodi, amplius quàm per ventrem euacuatio: quia retrahit humores infra repetentes.

Remedia. & decoctum ex raphano ad lib. s. syr. acetati simplicis vel oxymellitis 3. ij. misce pro vomitorio. Purgatio per clysterem simplicem primum admouenda, & die sequenti per acriorem, qualis fit ex decocto radicum cucumeris syl. in tenues partes concisæ, & addito melle infunditur, & citra omnem mordacitatem euacuat, fortiores fiunt ex decocto centaurei minoris, qui biliosa, & crassa extrahunt. Et quum adeò vehemèter operatur, vt cruenta euacuet, tunc plus proderit, vt ait Gal. sed podici fomentum apponere oportet, quo diutius infusum contineatur.

Cur clysmi acres, & qui cruenta educunt ischiadicis conferunt? An quia venæ intestinorum continuitatē habent cum venis mesenterij, & hæ cum venis coxendicis propter affinitatem?

Materia frigida, & crudus humor apparantur pro pomatibus, vti sunt aqua mulsa, mel rosatum, oxymel, sy. de betonica, sy. de iua N. sy. de stœcade, diluantur aquis saluiæ, & agrimonix. Postea cōcocta materia expurganda, per syr. de agrimonia, qui recipit agrimonix, matricariæ, primulæ veris, anthis añ. m. j. saluiæ, nepitæ, mentastri añ. m. s. sem. peonix, & radicis eius añ. 3. ij. maioranæ, fœniculi añ. m.

añ. m. s. cinamomi, nucis moschatæ, cucubæ añ. 3.
 j. s. agarici tro. ʒ. ij. hermod. alborum ʒ. j. aquæ fal-
 uix, & fœniculi añ. lib. ij. s. bulliant ad tertias, & cū
 saccharo, & melle fiat syrupus longus, dosis ʒ. v.
 plus minus secundum ægri vires. Purgant etiam
 fœliciter pilulæ ex hermodacty. maiores, ex colo-
 cynthide, aggregatiuæ M. pilulæ de benedicta N.
 facilius affectio destruitur, si assiduæ præsidiorum
 permutationes fiant, vt ait Aetius.

De topicis mitigatoriis in principio vtendū est,
 quæ nec refrigerēt multum, nec fortiter calfaciant:
 exacerbātur enim per ipsa fluxiones, caliditate ni-
 mium plus attrahente ipsas, quàm impediēte. Pa-
 paueris calices in aqua mulsæ coquito, quibus re-
 iectis cum farina hordei mulsæ eidem incocta fiat
 cataplasma. Optimum est malagma ex fœnugræco
 in posca cum melle cocto. Aliud. excellens fit ex
 cribratura radicum symphyti cum manna thuris,
 & ouorū albo, & luteo, & adipe suillo veteris. Irri-
 gatio ischiadica fit ex decocto corticis, radicis vl-
 mi. Itē ex oleis anodynīs, & calidis, vt nepitæ: nam
 materia valenter foras ex profunda cotyle trahen-
 da est, ob id admouetur. Inspergimen lenitiuum do-
 loris. R. picis aridæ ʒ. j. sulfuris ʒ. j. terito & misceto,
 ac lota coxa ex vino calido dum locus adhuc ca-
 let inspergito, & charta contegito, & donec sua
 sponte decidat finito. huic morbo etiā dicata sunt

To. IIII.

M

em

empl. cæroneum N. empl. de ebulo fornarij, vng. & empl. Tornamiræ. Dialthea cum adipe anseris illita. ℞. empl. diachyli, empl. de meliloto añ. ℥. ij. empla. relati ad Andromachum ℥. j. misce. Aliud. terebinthine, ceræ nouæ, picis albæ añ. ℥. ij. liquatis adde mastichæ, thuris, myrrhæ añ. ℥. j. gummi, tragacanthæ añ. ℥. j. f. empl. Aliud. illine mel supra coxā, mox semen nasturcij pulueratū insperge, locumq; tege aluta. ℞. rosacei lib. .s. lutea ouorū x. conqua-
tentur in sartagine super cineres calidos vsque ad spissitudinem. adde croci ℥. ij. statim dolorē sedat. Aliud. rosacei ℥. iiij. olei de costo, & è mandragora añ. ℥. j. .s. serapini, opopanacis, resinæ añ. ℥. j. .s. cere q. f. fiat vng. molle. Aliud, sulfuris puluerati ℥. j. cum pice, & oleo nardino fiat empl. huc pertinent sinapismi, & phœnigmus, id est, cutem rubefaciens. Ad atrophiam confert oleum ex pice extillatum, & illitum. Cauterium calidum vel frigidum in syluestri parte sub genu per palmū antiquas schiasas sanat. fieri potest ex calce viua cum sapone molli, vel ex radice iberidis recenti tusa cum axungia veteri, & per quatuor horas si patiens perferre queat.

Amuleta, Ad coxendicē radix cyclamini collo appensa confert, Myrep.

In summa schiasis curari debet hoc ordine: primum materiæ communes à viis ductuum vacuandæ sunt, proprias verò diminuere cathartici, & auertere

tere oportet, ne in causam transeant coniunctam. Residuum conuenit, & concoquere, & abeuacuare, vrinas ciere, & sudores prouocare, postremo membri mittentis dyscrasiam corrigere, & partem affectam confirmare vtile est, ne illa facile recipiat superuacanea.

Victus ratio, tempore exacerbationis forbilis sit, & modica, per interualla solidior, & impinguans, & reparandis viribus magis accommodata. Nam carnis incremento præ omnibus ischiadici opus habent. Aluo constricta premuntur, & aggrauantur articuli, sed nõ assidue profluat, id enim imbecilles reddit. Et quod cum purgationis impetu à toto corpore attractum est, id ipsum vicinas partes replet. Tibiæ sono ad incolumitatē restituisse plures Bœoticorū ischiade laborantes Ismeneas Thebanus dicitur. vide Philelphi conuiuia, & Gillij accessionem, apud Aelianum.

De gonagra seu gonyalgia. CAP. LV.

GEnuum grauitas purgari inferius oportere significat: nam pro motu noxiorum humorum oportet euacuationes facere. Genuū dolores qui inueterauerint, vix citra vstionē finiūtur, vt ait Celsus. Genuum morbi sunt gonyalgia, rheumatismi, tofi. Genuū dolores fiunt ab orobo, si eo vescamur. Ad genuū dolores,

M 2

illos

illos emendat emplastrū de fimo capræ cum posca compositum. x. S. vel quod recipit farinæ hordei ℥.iiij. fimi capræ ℥.j. s. cum oxymellite fiat. Vel ℞. farinæ fabarum furfuris, pisti, florū chamæmeli añ. ℥.j. fimi caprini añ. ℥.ij. bulliant in q. s. poscæ, & sape vsque ad spissitudinem: in fine adde olei anethi & chamæl. fiat empl. dolorem genu antiquum, & tumores sanat, à purgatione cacochymia.

Ad iuncturarum tophos empl. de caseo veteri & acri soluto in cruris suilli decocto x. S. Empl. Zachariæ apud M. ceratū Cermisonis. Aliud Aetij, granū cnidium desquamatū internum cum myrrha, & aceto terito ac illinito, vsq; ad excessum mirabile est.

De præcautione morbi articularis. CAP. LVI.

PRophylactice pars artis est, quæ instantem morbum declinat, vnde arthriticis, calculosis, cæterisq; corporibus consulit qui medium statum optinent, inter ea, quæ exactam sanitatem habent, & quæ iam ægrotant. huius est morbificam causam in corpore existentem, nondum tamen morbum facientem abolere, proinde Tral. Quibus, inquit, articulorum dolor certis temporibus reuertitur, hi ante id tempus rheumatismum prohibere debent, prohibentur autem phlebotomia, aut purgatione in vere facta.

¶ *Et*a. Nullum omnino morbum sentiet, qui prohibe-
bit ne in cruditate incidat, siue ea boni siue mali
succì cibis succedat. Prouidebit autem si cibis qui
carent succi vitio, viasq; non impediunt, frugali-
ter ordinateq; vtatur, & exercēdi corporis, animiq;
curam habeat.

Arthritici carnosì, crassi, & pingues extenuantia
requirunt, quæ gracilibus sunt inimicissima. Nam
ea non modò totum corpus, sed etiam pedes, inte-
rim verò manus in grauissimum statum siccando
perducunt, vnde diuretica non nisi in obesis, & in
pituitosa arthritide conueniunt.

An ad præcautionem vti liceat catharticis, quæ
à iuncturis attrahant? Moses 9. apho. cōcedit tan-
quam salubria, Graduensìs vetat. In præcautionem
non conueniunt hermodactyli, secundum Rasim.
Celsò placet purgatio ex lacte asinæ. Al. B. dicit
quosdam liberatos fuisse potu lactis asinini, vel feri
captini. Alij foeliciter purgātur decocto polypodij
cum aniso x. diebus. Ipse soleo ad præcautionem
præscribere clysmum mollem, & bolum cassiæ ni-
græ, vel syrupum rosaceum ex nouem infusionibus
cum decocto corticum myrobalanorū, citrarum,
indarum, chebularum, deinde apparare materiam
oportet, & coctam expurgare pilulis mastichinis,
fortiores sunt pilulæ Mansoris, vel Chariocostinon
quod accipit hermo. dacridij añ. 3. j. cinamomi, ga-

M 3 ry.

ry. costi añ. 3. s. zinzib. 3. s. trita & cribrata exci-
piuntur serapio ex melle, & vino albo confecto,
dosis à 3. duabus ad 3. s. refertur ad passion. & iuæ
pulueratæ 3. ij. cum terebinthina f. pilulæ ad vsum
frequenter. Non vidi, inquit Rasis, medicamen ad
podagram vtilius oleo granorum vesicariæ sumpto
in potu cum modico oleo amygd. dulc. & saccharo.
Theriace vniuersis articularibus morbis auxilio
est. Viperarum esus omnibus arthriticis plurimum
cōmoditatis affert, exigit enim per cutem omnia
redundantia excremēta siue calida siue frigida fue-
rint, quæ morbi sunt causā. Nisi eorū corpus per in-
sensibilem, & obscuram trāspirationem, aut sudo-
res naturales euacuetur, valde cōfert vsus antidoti
ex cinere cancrorum Aetij. Ossa combusta admo-
dum digerentem, & exsiccantem vim obtinent, &
maximè humana, epilepsiam, & arthritim pota fa-
nant. 11. S. Aetius commendat ceruina, & bubula.
Aliud. & tali fuilli combusti 3. ij. pul. herbæ ainge,
id est, iuæ 3. j. liquir. 3. iij. fiat puluis, sumat 3. ij. per
horam ante prandium. Conseruæ satyrionis vsus
præseruat à gutta, vt ait Valescus.

Sal in oleo contritum, & articulis cum frictione
impactum ad declinandum podagram magnificè
adiuuat: nam frictione pori aperiuntur, sale super-
fluitates consumuntur, oleo dolores mitigantur, sal
bulitum cum oleo, & supra positum nervos cōfor-
tat.

rat. Idem præstat aqua marina: nam piscatorū corpora videntur cornea, vrina etiam podagricis medetur, argumento fullonum qui ea nunquam tentatur, ex Plinio, & Rasio. Lotio ex vrina muli opitulatur, mulus enim resistit podagræ ex natura sua, sponsia ex aceto cum sale madefacta locis affectis circumposita à fluxione immunes reddit. Cautes laudantur in curatione: ergo & in præcautione bene faciunt, si præsentium, & futurorum vna cōmunisq; medēdi ratio sit, vt innuit Hipp. 2. apho. 29. & Gal. lib. de phlebo.

Victus ratio exercendi corporis, & animi ac bene semper cōcoquendi cibi, curam habere docet, pessima omnis valida à cibis motio. Equitatio podagricis, ischiadicis, & cui genua dolent, inimicissimum. Illis officit suspensio pedum, & ira. Venus omnes articulari morbo obnoxios lēdit. Austri dissoluunt, & corpora humectant. Aquilones si dolor aliquis obsederit, dolorem augent. Vere articulorum dolores, autumno coxendicum.

Si ex phocæ, leonis, lupi, aut vulpis corio elaborato calceos quis gestet, pedes non dolebit, Gal. Valerianus, prodest in duplici calceo pellem caninam habere. Scribonius. fibrinos calceos seu ex pelle fibri castoris' ve vtiles esse aiunt Plin. & Al. B.

Qui pane hordeaceo vtuntur morbo pedum tentari negant. legumina comesta infirmant crura.

qui orobum comedunt genuum dolores patiuntur. 2. & 6. epi. poma neruos lædunt, Dio. & mala punica secundum Trall. pyra bona sunt podagræ, sed alij fructus nocent. 12. cont. brassicæ esus salubris, apud Plin. sed Trall. non admittit, licet vsum bubulæ carnis cōcedat. Vetustæ gallinæ insalubres, Arnal. Vinum ieiunis potum neruosam substantiā promptissimè offendit. Quidam vino neglecto, & annuo aquæ potu vsu, eo cruciatu toto vitæ spatio curati sunt, vt asserit Celsus, sola vini abstinentia per vniuersum vitæ tempus à podagra sanguinea vindicat, testib. Trall. Aeg. Aetio.

De dorsi lumborumq; dolore. CAP. LVII.

Lumbago vitium est, debilitas vè lumborum, vnde elumbi dicuntur ac delumbati, qui præ lumborū debilitate vel dolore sese non possunt erigere. perdix, inquit Plin. astu delumbem sese simulat. In lumbis spōdylorum moles est memorabilis, hac parte, interna vena caua, ac magna arteria eis incumbunt.

Causa externa, aër admodum refrigerans: nam dorsi partes sunt paratiores ad suscipiendam & sentiendam frigiditatem. Venus immodica, labor in leuando, vel onera baiulādo, vel percussio quæ delumbare vel lumbos perfringere potest, lumbi imbecillantur lumbare strictè, aut zona. Ex multis
etiam

etiam causis internis fieri potest, nempe à sanguinis copia in vena chyli, & hunc venæ sectio soluit, ab humore acri neruos, & musculos pungēti, à pura bile, à pura pituita, à defluente humore solo, sed magna ex parte crasso, ac flatuoso spiritu associato, à vitio renum per consensum.

Digno. petenda sunt ex ægrotantis narratione, ex habitu, & corporis crassi, atque ex præcedenti victus ratione. Multæ in lumbis sunt partes. Dolor fit in cōcatenationibus spondilium dorsi, & quandoque in collo. Affecta dorsali medulla sensus torporis erit. Ex vertebriis accipiunt officiū suum manus, vnde si dolor fuerit in cubito, significatur spinalem esse affectionem ex constipatione, punctione, aut ex alio quouis morbo, incisa autem vena in brachio soluit dolorem: quia causas abscindit.

Prælag. lumbis dolentibus, stomachi dolores accedentes, signa sunt eruptionis sanguinis hæmorrhoidarum.

Ex copia in venis aceruata dolor lumborum, & stomachi fit, vnde varicibus superuenientibus soluntur nonnulli affectus pertinētes ad lumborum regionē. Ex lumborum recursione oculi peruersio mala. Qui cum febre circa lumbos, & inferas sedes fiunt dolores, si septum transversum relictis inferis sedibus attigerint, letales admodum sunt. Lumborum dolor perseverans tympaniam inducit. Lum-

borum dolor significat purgationem debere fieri per inferius. Lumborum dolore superueniente, quibus ilia suspensa sunt obmurmurantia, his alui humectantur.

Metho. m. curatur per causarum sublationem. Quicunque dolores ex dorso ad cubitum descendunt, venæ sectio soluit. Et secundum quod humores repunt, oportet facere euacuationes per loca opportuna. Si verò ex cacochymia nascitur dolor, illa purgatione accommodata curanda, per chologoga, phlegmagoga, melanogoga, vel per ea quæ flatus digerunt. Dolor à causa frigida de ambulatione, & exercitatione sæpe finitur. Itē humor frigidus concoqui debet melle rosato, oxymellite, vel syrupo agrimonie, cum duplo aquarum betonicæ, saluiæ, primulæ veris. Mox purgandus est pilulis foetidis hiera, colocynthidis, pilulis de dēde, de opopanaxo, de euphorbio, catapotiiis de agarico, vel agarico tro. Olea illinuntur de lilio, anethinum, chamæmelinum, vulpinum, hyperici, oleum de croco, & pyrethro, dialthea, & vng. Agrip. prodest spinam confricare, mox inungere. fricatio sicca prohibet periodos si ante duas horas paroxysmi fiat. Veterē spinæ dolorem sanat rhododendrum impositum, aut opoponacis succus, bdelliū, facopenium, inula, ammoniacū, castoreum, & euphorbium. Anodynum, lutea ouorum quinque, opij 3. ij. micæ panis

in

in lacte ouino maceratae, lib. 8. cum oleo chamae.
 & lilino, fiat cataplasma, lana succida dolores sedat.
 in occasione calida succus cucurbitae cum rosaceo
 confricatur, succus radicis arundinis cum aceto mixtus
 ungitur. R. vitrum purum, & leuigato diligenter, &
 in corium veteris vtricoli coniiice, & calefacito ad
 carbones, deinde insperge circa lumbos puluerem.
 & vtere diebus septem. Lumborum dolori, & im-
 becillitati prodest veneris raritas, leporini testes
 similiter deuorantur, dolor ex renum vitio, aut dorsi
 renem abdicat.

Hic obiter notandum quod in lumbis carnalis
 delectatio continetur, vnde Psal. 37. lumbi mei im-
 plet sunt illusionibus. Sicque per lumbos in sacris lu-
 xuria designatur. Accinge sicut vir lumbos, id est,
 sicut fortis restringe luxuriam, & lumbos carnis succin-
 gere, Lucae. 12. est luxuriam refrenare. Et lumbos
 uentris succingere, 1. Petri, est luxuriam a cogitatio-
 ne arcere. Certè lumbi imbecilles fiunt stricto cin-
 torio quod renibus iungitur. Auri lamina supra re-
 nes, & lumbos detenta sanat nephriticos, & lum-
 borum dolorem.

Luxum ut excantes, arundinem viridem praehe-
 re mediam, diffinde, & duo homines teneant ad
 oxendices. Reliqua vana, & superstitiosa sunt,
 quae ad luxum scribit Cato libro de re rustica. c. 57.

F I N I S.

INDEX RERVM

MEMORABILIVM QVÆ

HOC VOLVMI NE

CONTINENTVR.



A

| | | | |
|------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|
| <i>Angina & Synanche.</i> | | <i>Aures humectæ.</i> | 171 |
| | 219 | <i>Auris dolor & vlcera</i> | |
| <i>Ani vitia.</i> | 475 | | 170 |
| <i>Aphonia.</i> | 208 | <i>Auris inflāmatio.</i> | 169 |
| <i>Apoplexia quæ & stu-</i> | | <i>Auris meatus obstructi-</i> | |
| <i>por, attonitus, & apo-</i> | | | 173 |
| <i>plexis, & syderatio di-</i> | | <i>Auris surditas, & tin-</i> | |
| <i>citur.</i> | 59 | <i>nitus.</i> | 172 |
| <i>Apositia siue inappeten-</i> | | <i>Auris vlcus.</i> | 170 |
| <i>tia.</i> | 327 | <i>Aurium affectus, & o-</i> | |
| <i>Appendix de appetētia</i> | | <i>mnis auditus offensa.</i> | |
| <i>ex Galeno.</i> | 337 | | 165 |
| <i>Appendix de narium</i> | | <i>Aurium vermes.</i> | 174 |
| <i>malis.</i> | 195 | <i>Axillæ tragosæ seu hir-</i> | |
| <i>Appetentia vehemens</i> | | <i>cosæ.</i> | 179 |
| <i>inexplebilis de fames.</i> | | | |
| | 330 | | |
| <i>Arquatus, regius de</i> | | <i>Batrachium.</i> | 202 |
| <i>morbis.</i> | 364 | <i>Bulima, quæ & coenar-</i> | |
| <i>Articulus morbi præ-</i> | | <i>gia dicitur.</i> | 332 |
| <i>cautio.</i> | 548 | | |

B

C

inde

INDEX.

| | | |
|--------------------------|--------------------------|-----|
| inde cachecti, & co- | Colicus dolor. | 433 |
| chectici. 379 | Conceptus non verus, seu | |
| calculi renum prophyla- | de mola. 515 | |
| ctice. 413 | Condylomata. 476 | |
| ancer in māmilla. 305 | Cophosis, & surditas. | |
| apitis dolor à futuris. | 171 | |
| 52 | Cordis affectus præter | |
| apitis dolor cum rheu- | naturam. 279 | |
| mate. 53 | Cordis palpitatio. 289 | |
| ardiaca passio. 320 | D | |
| arus seu carosis. 103 | Delirium. 74 | |
| atalepsis, quæ & apho | Dentium affectus. 211 | |
| nia, anaudiaq; dicitur. | Dentium dolor. 213 | |
| 105 | Diabetes. 419 | |
| atochus seu cathoce. | Diarrhœa. 449 | |
| 105 | Dolor. 35 | |
| ephalea. 38 | Dorsi & lumborum do- | |
| ephalalgia sanguinea. | lor. 552 | |
| 45 | Dysenteria siue tormino | |
| ephalalgia biliosa. 46 | sus fluxus. 454 | |
| ephalalgia pituitosa. 47 | E | |
| ephalalgia ab atro hu- | Embryonis notæ sani vel | |
| more. 49 | ægotatis, quod Mar | |
| holera morbus. 309 | cellus pecus vocat. | |
| iborum dissipatio. 335 | 512 | |
| œliaca, et dyscœlia, in- | Empyema. 264 | |
| de cœliaci. 445 | Ephialta, seu incubo. 57 | |
| | Epi | |

I N D E X.

| | | | |
|----------------------------------|-----|----------------------------------|----------|
| <i>Epilepsia.</i> | 62 | <i>mus.</i> | 383 |
| <i>Epiphora & lacrymæ.</i> | | I | |
| 153 | | | |
| <i>Eruclatio.</i> | 348 | <i>Illapsa in aurem</i> | 173 |
| <i>Exolutio, lypothymia,</i> | | <i>Immoderata mensium</i> | |
| <i>& syncope, inde synco</i> | | <i>purgatio.</i> | 491 |
| <i>pati.</i> | 280 | <i>Insomnia molesta.</i> | 110 |
| F | | <i>Iocinoris affectus.</i> | 359 |
| <i>Fœcunditas & conce-</i> | 373 | <i>Iocinoris inflammatio</i> | |
| <i>ptio.</i> | 505 | <i>Iocinoris scirrhus.</i> | 376 |
| G | | <i>Ischuria.</i> | 427 |
| <i>Gargaris affectus.</i> | 205 | L | |
| <i>Gingiuarū affectus.</i> | 218 | <i>Labiorum vitia.</i> | 203 |
| <i>Gonagra.</i> | 547 | <i>Lactis abundantia.</i> | 300 |
| <i>Gonorrhœa.</i> | 482 | <i>Laesa cibi appetētia.</i> | 326 |
| <i>Grassonia.</i> | 180 | <i>Lætitiā quæ dant, &</i> | |
| <i>Gula seu meri affectus.</i> | | <i>gaudiū cumulant.</i> | 298 |
| 315 | | <i>Letargus.</i> | 97 |
| H | | <i>Lienis affectus.</i> | 386 |
| <i>Hæmoptysis inde hæmo-</i> | | <i>Lienis dolor à causa fri-</i> | |
| <i>ptyfici.</i> | 269 | <i>gida.</i> | 399. 399 |
| <i>Hæmorrhagia.</i> | 181 | <i>Lienis inflāmatio.</i> | 387 |
| <i>Hæmorrhoides.</i> | 469 | <i>Lienis obstructio.</i> | 399 |
| <i>Hemicrania.</i> | 52 | <i>Lienosi & splenici.</i> | 402 |
| <i>Hepatis obstructio.</i> | 370 | <i>Lienteria.</i> | 447 |
| <i>Hepatis imbecillitas.</i> | 360 | <i>Linguae mala pustula.</i> | |
| <i>Hydropisis, seu hydropis-</i> | 202 | | |
| | | Lin | |

INDEX.

| | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|-----|
| Linguae reliqua mala. | 175 | Narium tetri odores. | |
| 202 | | | |
| Linguae resoluta. | 201 | 178 | |
| Linguae & oris affectus. | | Natorum ad parentes si- | |
| 197 | | militudo. | 511 |
| Lumbrici, & vermina- | | Naturalis cibi appeten- | |
| tio. | 463 | tia. | 323 |
| M | | Naturalis mensium pur- | |
| Malacia, siue corrupta | | gatio. | 488 |
| appetentia. | 335 | Nausea. | 341 |
| Mammæ excrescentes. | | Nephritis. | 407 |
| 302 | | Nervorum affectus. | 111 |
| Mammillarum affe- | | Nervorū resolutio. | 126 |
| ctus. | 299 | Numerus natorum qui | |
| Mania. | 76 | nascituri sunt. | 509 |
| Mas'ne, an foemella in | | Nympha. | 524 |
| utero, | 509 | O | |
| Melancholia. | 81 | Oblivio, seu oblita me- | |
| Mēsum deprauata ex- | | moria. | 93 |
| cretio, fluxusq; mulie- | | Oculi vnguis. | 163 |
| bris. | 496 | Oculi vlcus. | 163 |
| Mensium suppressio. | | Oculi fistula. | 163 |
| 493 | | Oculi albugo. | 164 |
| Morbus pilaris. | 304 | Oculorum macula. | 162 |
| N | | quæ ad Oculos & vi- | |
| Narium passiones, & | | sum pertinent. | 135 |
| omnis olfactus noxa. | | Onirogmos. | 484 |
| | | Oph | |

I N D E X.

| | | | |
|-------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| <i>Ophthalmia.</i> | 148 | <i>pellunt.</i> | 146 |
| <i>Oris distortio.</i> | 117 | <i>Renum vlcera.</i> | 414 |
| <i>Oris fœdus habitus.</i> | 179 | <i>Respiratio naturalis, &</i> | |
| <i>Oris partium inflamma-</i> | | <i>transpiratio.</i> | 225 |
| <i>tio.</i> | 204 | <i>Respiratiōis offensa.</i> | 228 |
| <i>Oscitatio.</i> | 116 | <i>Rheumatismus.</i> | 186 |

P

| | |
|---------------------------------|-----------------------|
| <i>Palpitatio.</i> | 115 |
| <i>Pandiculatio.</i> | 116 |
| <i>Partus difficilis.</i> | 518 |
| <i>Partus immaturus, siue</i> | |
| <i>abortus, & effluxio.</i> | |
| 512 | <i>Paralysis.</i> 126 |
| <i>Peripneumonia, vnde</i> | |
| <i>pneumonici, & pul-</i> | |
| <i>monarij.</i> | 261 |
| <i>Phrenitis seu phrenesis.</i> | |
| 69 | |
| <i>Phthisis seu tabes.</i> | 274 |
| <i>Pleuritis seu costalis.</i> | |
| 243 | |
| <i>Pudendi vlcus.</i> | 487 |

R

Remedia quæ oculis con-
ferunt, quæ item clari-
tatem afferunt, & ob-
scuritatē hebetudinēq;

S

| | |
|-----------------------------------|-----|
| <i>Saliva redundans.</i> | 204 |
| <i>Sanguinis ex vesica eru-</i> | |
| <i>ptio.</i> | 422 |
| <i>Satyriasmus, & pria-</i> | |
| <i>pismus.</i> | 480 |
| <i>Singultus.</i> | 349 |
| <i>Sitis curiosa, seu de lesa</i> | |
| <i>potus appetentia.</i> | 338 |
| <i>Soporosi affectus.</i> | 101 |
| <i>Spasmus.</i> | 121 |
| <i>Sterilitas.</i> | 499 |
| <i>Sternutatio.</i> | 184 |
| <i>Stranguria.</i> | 422 |
| <i>Stultitia.</i> | 90 |
| <i>Suffusio.</i> | 155 |

T

| | |
|-------------------------------|-----|
| <i>Tactus symptomatis.</i> | 23 |
| <i>Tenismus.</i> | 462 |
| <i>Testiculorum affectus.</i> | |
| 486 | |

Thr

INDEX.

| | | | |
|-----------------------------------|-----|------------------------------------|-----|
| <i>Thrombosis.</i> | 301 | <i>partu fiat.</i> | 523 |
| <i>Tormina à partu.</i> | 521 | <i>Virginitatis indicia.</i> | 523 |
| <i>Tremor.</i> | 113 | <i>Virilitatis lesio, seu par-</i> | |
| <i>Tussis & tussicula.</i> | 238 | <i>tium quæ generatione</i> | |
| | V | <i>dicatæ sunt, langor.</i> | |
| <i>Ventris rugæ.</i> | 522 | | 478 |
| <i>Ventriculi dolor.</i> | 356 | <i>Visum quæ offendant.</i> | |
| <i>Ventriculi inflammatio.</i> | 141 | | |
| | 358 | <i>Vocis & sermonis offen-</i> | |
| <i>Vētriculi supinitas.</i> | 354 | <i>sa.</i> | 197 |
| <i>Vertigo, scotosis, scoto-</i> | | <i>Voluulus siue ileo, unde</i> | |
| <i>ma, scotodiniæve, &</i> | | <i>ileosi.</i> | 442 |
| <i>inde scotomatici verti-</i> | | <i>Vomitus.</i> | 342 |
| <i>ginosiq;.</i> | 53 | <i>Vrinæ fluxus.</i> | 433 |
| <i>Vesicæ lithiasis.</i> | 431 | <i>Vteri procidentia.</i> | 527 |
| <i>Vesicæ vlcera.</i> | 417 | <i>Vteri strāgulatus.</i> | 524 |
| <i>Vigilia & insomnia.</i> | 107 | <i>Vteri vlcus.</i> | 528 |
| | | <i>Vterinus furor.</i> | 526 |
| <i>Virginalis astrictio, ut à</i> | | | |

FINIS.

N

IOANNES BRUYEN-
NVS CAMPEGIVS HIE-

ronymo Montuo Medico Regio pru-
dentissimo simul ac crudi-
tissimo. S.



CRIPSIT ad me nuper Be-
nedictus Curtius consobrinus
meus, Hieronyme doctissime, te
nunc Lugduni agere: atque ab
hinc aliquot dies quaedam inge-
nij tui monimenta in lucem emisisse. Vix possem
explicare literis quanta voluptate me affecerit epi-
stola illa Curtiana: iam video te minime dubitare
de causis gaudij nostri: scis etenim, Hieronyme,
Philosophorum simul ac medicorum nostræ me-
morie omnium præstantissime, nihil homini gra-
tius iucundiusq; accedere posse quàm amicos
mente, corpore, ac fortunis prosperrimè valere.
Quod ego te ex illa Benedicti Curtij epistola in te
esse plenissimè intellexi: verùm (quod in te sum-
mopere admirandum existimo) maximè volupta-

me perfundit ingenij tui singularis constantia,
que præstat, ut tu inter tumultus aulicos vel po-
ius bellicos bonas literas non cesses adiuuare. Na-
uram mediusfidius nactus es, non à Musis, non ab
Apolline, sed ab optimo maximo opifice: cuius du-
tu immortalitatē apprehendisti. Quis quaeso du-
itet libris tot à te editis doctissimis æternam me-
moriā tibi non partam? Caterum ut tibi non-
nihil nostrarum rerum significem, iam tempus ap-
petit. Ego mi Hieronyme cum in me fortuna (ve-
us probè nouisti) debaccharetur, animum à studio
literarum haudquaquam abstraxi. Nam in hoc
plus consolationis me adeptum esse ingenuè fateor:
quā in principum, & magnatum (qui me hercu-
le non erant pauci) auxilio: præcipuè verò tran-
quillitatē animo meo adferebat, quòd ab omnibus
literulis hominibus (etiam aduersario nostro non
inimicis) spes omneis inijciebantur portum attingendi, in quo (Christo auspice) iam multos annos
quiete fruimur pacatissima. Sed quod tibi indica-
re volui, iam accipe: Ex illo tempore Auicennæ
Canones aggressus eram, ut videlicet eos in Lati-

N 2 NAM

nam linguam transferrem. Et profectò opus ad finem perduxissem, nisi ea tempestas malis auibus (vt aiunt) oborta animum auertisset. Quippe non sine graui labore, & longo id perficiendum erat: in quo poteram ego audacter spondere, Auicennam non minus utilitatis sua lectione potuisse legentibus adferre, quàm aut Oribasium, aut Paulum, aut Aetium Græcos medicos clarissimos video præstitisse, vt breuiter dicam: libellum de (orde, & facultatibus eius (vulgo de viribus Cordis inscribitur) conuerteram primum, & tuo nomini dicaueram: qui cum blattis, & tineis adhuc rixatur: quoniam cum per alias occupationes, tum per chalcographorum morositatem prodire in lucem non potuit: sunt & alia permulta, quæ hoc toto decennio apud Sequanos commentatus sum memoria exercendæ gratia, in quibus mentio de te creberrima fit: cui ego semper in philosophia ac medicina primas detuli. Quod tu candide (quæ tua est humanitas) interpretaberis. Ex animo enim proficiscuntur qui vana scribere non didicit. Hæc ad te scripsi familiariter, fretus tua benignitate, quæ

uæ nunquam in studiosos bonarum literarum
lausa fuit. Ago hic apud Montanos Lugdunenses
in Symphorianopoli, id quod te scire volui: nō quod
me magnum quid expectare debeas: sed ut tibi
ersuadeas te neminem sub sole habere (quan-
tuam permultos habeas summos amicos) qui te
magis colat, & obseruet quàm ego. Si per otium
iceat, aliquid literarum ad nos dare, non omittas
precor, & de valetudine D. Burgensis &
Goëurandi nos certiores reddere. Tu in-
terim bene valebis: & nos, ut soles,
ama. Ex Symphorianopoli
Augusti, XXVIII.
tumultuariè.

*


N 3


Priuilegij Sententia.


*Literis Regis cautum est Hieronymo Montuo,
Mirebelli Domino, Medicoq^{ue} Regis ordi-
nario, Nequis iniussu hanc Anasceuem mor-
borum ante decem annos primam editionem
consequentes, imprimat, ne ve vsq^{ue} iam impres-
sam vendat. Qui contrà fecerit, pœnis ex san-
ctione multabitur. Datum Fonsbellaquei,
Pridie Cal. Septem. M. D. LVI.*

ntia.

na Monna,
Rign udi-
cuen mor-
u iduuen
am impref-
ma ex fcy-
uolagui.







(D8-